

# 关中麦稈蝇的初步研究\*

刘绍友 孙益知  
(西北农学院)

**摘要** 麦稈蝇是小麦主要害虫之一，陕西关中地区每年发生4代。成虫盛发期在4月中下旬，5月下旬至6月中旬，7月中下旬，9月下旬至10月上旬，以幼虫在麦苗幼茎内越冬。寄主以小麦为主，大麦为次。每年秋苗期和春季拔节至孕穗期两次为害小麦。麦收后以落粒自生麦苗为夏季寄主。成虫羽化在早晨6—8时盛；羽化后取食补充性营养；苗期产卵在芽鞘上、拔节后在顶端第2、3叶基为多。幼虫在苗期和拔节期入侵率高，孕穗期为次，抽穗以后不能入侵，在不同生育期植株上，入侵后表现害状不同。麦稈蝇的为害程度与栽培条件关系密切：早播小麦秋苗期受害重，晚播小麦在春季受害重；合理灌水、密植受害轻；施肥充足、土壤肥沃、生长良好的小麦受害轻。成虫发生期是药剂防治的良好时期。*r 666* 粉剂、烟剂、液剂杀成虫均良好，*E 605* 既能杀成虫又具一定的杀卵能力。

麦稈蝇是陕西省小麦的重要害虫之一。1960、1961年全省普遍发生，关中部分地区猖獗成灾。为掌握麦稈蝇在关中地区的发生规律，找出小麦消灾保产的有效措施，作者于1960—1962年在武功、蒲城等地进行了研究。兹将研究初步结果报导如下，供有关方面参考。

## 一、分布及为害情况

关中地区为害小麦的主要害虫是綠麦稈蝇 (*Meromyza saltatrix* Linné)，其次是燕麦蝇 (*Oscinella pusilla* Meign.)。以上两种均属双翅目黃潛叶蝇科。本文以綠麦稈蝇作为研究材料。

根据近年来的调查，綠麦稈蝇在关中的武功、兴平、周至、眉县、咸阳、西安、长安、临潼、渭南、大荔、韓城、澄城、白水、銅川、富平、高陵、三原、涇阳、礼泉、乾县、隴县、彬县、长武、宝鸡、凤翔、岐山、扶风等县市均有为害。根据资料记载，陕西省的陝北、陝南地区也有发生。据文献记载国内还分布于內蒙、河北、山西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、云南、广东等省、区。

麦稈蝇的寄主主要是小麦，其次是大麦。以幼虫为害心叶、嫩茎、幼穗等部，造成“枯心苗”，“囊胎”，“白穗”等害状。小麦苗期受害其主茎分蘖减少，严重时造成死苗断壠；拔节以后受害，造成枯心、烂穗、白穗，使有效穗数减少而严重减产。

麦稈蝇以幼虫潜伏在麦茎内取食，不易被人发现。因此，常有人把它的害状和其他害虫（金針虫、薊馬等）、自然灾害（霜冻）等混淆起来。关中地区农民将不能抽穗的植株统称“鋼茬”。春季小麦不能正常抽穗，其原因虽是多方面的，但据作者在1960—1961年调查证明，麦稈蝇的为害是引起小麦不能抽穗的主要原因。如1961年共取样6,790株（包括主茎和分蘖），其中未抽穗的2,451株，经剖茎检查结果，受麦稈蝇为害的1,407株，占总

\* 本研究承周尧教授，路进生、汪世泽、魏建华等先生多方指导和帮助，本文写好后并经他们校阅。西北农学院植保系袁文焕、吕佩惠等同学曾参加部分工作，特此一并致谢。

“銅葦”數的 57%。

## 二、生活年史

根据 1960—1962 年室內飼養和田間系統觀察結果，綠麥稈蝇在关中地区一年发生四代。每年两次为害小麦，第一代幼虫为害拔节和孕穗的植株，第四代（越冬代）幼虫为害秋苗，并以此幼虫在小麦幼茎内越冬。夏季麦收后据王輔成研究，在落粒自生麦苗及細叶苔为主要夏季寄主，另外大麦、白茅、馬唐、狗尾草、綠毛鵝冠草、行仪芝、异穗苔、香附子等也是它的寄主植物。作者在两年的調查中也发现以上植物有枯心苗和白穗等害状，但除大麦外經飼養所得之成虫均非綠麥稈蝇，接种后亦不能成活。因此，夏季寄主經我們研究已肯定的仅是落粒自生麦苗。

各代发生时间很不整齐，在田間往往同时可見到四种虫态，甚至可找到上下世代的成虫。虽然如此，一年中仍可看出成虫发生有四个明显的高峯。1960—1961 年选择西北农学院試驗農場农作一站秋播小麦（大田）和春小麦（播期試驗地）田各一块，每隔五天扫描 100 网，所得結果見图 1。




图 1 麦稈蝇成虫消长(陕西武功, 1960—1961)

一年中經過系統調查和剖茎检查，各世代各虫期发生始末期見图 2。

## 三、生活习性

### (一) 成虫

1. 羽化 根据越冬代 50 头蛹和第一代 200 头蛹的觀察，当眼点变黑后，前者（温度 14—17℃）經 3—4 天、后者（温度 20—23℃）經 1—2 天即羽化。羽化时，先以黃色額囊頂破蛹壳，露出头部。随后借助于腹部的蠕动将胸部推出，这段時間需要 10—15 分鐘。然后足蹬蛹壳 3—5 分鐘全身即可露出。刚离开蛹壳的成虫額囊仍然外露，再經 20—30




图 2 麦稈蝇生活史图解(武功, 1960—1961)

●卵 — 幼虫 ⊕蛹 + 成虫

分钟开始展翅飞行，额囊亦缩入新月窝去。由开始羽化到飞行历时 1 小时左右。

一天内不同时刻的羽化数量差别甚大，大部在清晨 6—8 时羽化。据 1961 年对越冬代 37 头、第一代 197 头的蛹的调查，其羽化情况见表 1。

表 1 成虫羽化在一天中不同时刻的比较(武功)

世 代	羽 化 时 间	观察虫数	0.00—6.00		6.00—8.00		8.00—12.00		12.00—18.00		18.00—24.00	
			羽化数	羽化率 %	羽化数	羽化率 %	羽化数	羽化率 %	羽化数	羽化率 %	羽化数	羽化率 %
越冬代		37	4	10.8	27	73.0	3	7.1	1	2.7	2	5.4
第一代		197	20	10.2	135	68.7	18	9.1	8	4.1	16	9.1

2. 活动 成虫离开卵壳后，即在小麦植株或杂草上爬行和停息，半小时后就开始飞行。

成虫活动需相当光度和温度，以天气晴朗无风之日最活跃。阴天或微风时活动减弱。

遇下雨、大风和黑夜时，于植株下部叶背静伏不动。

成虫一天内的活动与大气温湿度关系极为密切。固定地块，从4月上旬至6月上旬每隔2天分别在6时、8时、10时、12时、14时、16时、18时、20时用扫虫网在麦株上半部扫描，每次100网统计成虫数量，并用阿斯曼干湿球温度计测定麦田温湿度。越冬代成虫在4月上旬以12—14时活动最盛。4月中下旬在8—10时和16—18时活动最盛。5月上旬以后一天内的活动时刻继续向早晚推移。经多次测定结果，活动最盛时的温度为18—22℃，相对湿度60—90%。

3. 趋性及补充性营养 成虫趋光性较强，在光线充足处行动活泼。成虫对糖蜜有较强的趋性，于田间常发现在果树、荞麦、苜蓿、草木樨、豌豆等花上停息，也发现吸食蚜虫蜜露。

作者曾在1961年和1962年以越冬代和第一代成虫进行了补充性营养的试验。方法是由田间采集来之蛹放在培养皿中待羽化后，将成虫成对放入栽有小麦之小花盆内饲养，罩上马灯罩，顶部盖上纱布。分别加苜蓿花、蚜虫、10%蔗糖液、10%葡萄糖液和蒸馏水等五种处理。观察成虫寿命和产卵量，其结果见表2。

表2 成虫不同营养下寿命和产卵量比较(武功)

世代	处理	供试虫数			寿命(日)			产卵量(粒)			
		♀	♂	合计	最短	最长	平均	最少	最多	总卵数	平均
越冬代	接种麦蚜	10	10	20	8	11	9.7	15	60	206	20.6
	葡萄糖液	13	13	26	8	43	29.0	8	93	532	40.9
	蔗糖液	14	14	28	8	84	31.5	11	84	496	29
	蒸馏水	10	10	20	6	19	10.0	6	38	120	12
第一代	苜蓿花	8	8	16	7	19	12.0	3	13	64	8
	葡萄糖液	10	10	20	11	81	32.0	7	51	310	31
	蔗糖液	10	10	20	10	92	28.0	9	62	331	33.1
	蒸馏水	10	10	20	5	16	11.2	1	12	42	4.2

4. 交尾产卵 成虫羽化后当天即有发现交尾的，但以24小时以后最盛。雌雄性成虫均有重复多次交尾现象。交尾时一般爬向麦株上部进行。重迭式。根据12对成虫的观察结果，每次交尾历时10—14.8—18分钟。

每天产卵时间以早晨6—8时最盛。卵散产。成虫产卵对植株部位、生长势、生育期及环境有明显的选择性。幼苗期一般产卵在芽鞘或叶片上；春季在小麦拔节后，靠近植株顶端的第2—3叶片上最多，统计结果见表3。

以一个叶片来看，在基部近叶舌处产卵最多。根据300粒卵的统计，叶基0—4毫米内占叶片总产卵数的98.7%。不同生育期的小麦，以拔节期产卵量最多。生长势弱、色黄绿、植株矮小的产卵多，地边比地中央的植株产卵多。

## (二) 卵

卵近梭形，初产时白色不透明。近孵化时变为淡黄色。孵化时由顶端突起的孵化孔

表 3 植株不同部位产卵数量比較(武功)

卵 部 位 数 时 间 和 项 目	调 查 卵 数	着 卵 部 位*				叶 片 总 卵 数	茎 秆 和 叶 鞘 数	
		旗 叶	第 二 叶	第 三 叶	第 四 叶			
1961年	卵 数	766	27	358	217	29	631	135
	比 率 %	—	3.5	46.7	28.3	3.8	82.4	17.6
1962年	卵 数	300	12	128	117	9	266	34
	比 率 %	—	4	42.67	39	3	88.67	11.33

\* 叶序由植株顶端往下计。

鉆出。根据第一代和第二代各 100 粒卵的觀察，卵期第一代 5—8 天，平均 7.2 天；第二代 3—6 天，平均 5 天。

### (三) 幼虫

幼虫孵化后即向叶舌处爬去，用口钩伸縮来寻找入侵点。苗期由心叶入侵，拔节后多半由叶鞘与茎秆之縫隙侵入。刚孵化的幼虫接种到拔节期小麦顶部第二叶基，觀察 20 头幼虫入侵所需時間为 12—175 分鐘，平均 1 小时左右。幼虫入侵率与相对湿度、植株生育阶段关系密切。室内将刚孵化的幼虫放在由饱和盐溶液所控制的不同湿度下，每处理 10 头幼虫其活动能力觀察結果：在相对湿度 35—40% 条件下，經 30—60 分鐘即失去活动能力。50% 的相对湿度下，活動時間保持 150—180 分鐘。100% 相对湿度下，活動時間保持 180—240 分鐘。在苗期和拔节期幼虫入侵率高。

幼虫在不同小麦生育期的植株上入侵，为害后所造成的害状不同，大致可归纳为以下四种类型：

1. 苗期和拔节初期入侵，切断心叶、破坏生长点造成枯心苗。待心叶干枯时幼虫往下鉆，繼續为害幼茎。在苗期，幼虫有轉株为害現象，一幼虫最多可为害 4 个幼茎。
2. 拔节后期和孕穗前期入侵，在幼穗基部取食后造成螺旋形切口。切断了幼穗生长的养分和水分的来源，因而麦穗不能抽出。幼虫就在此幼穗上取食，其排泄物呈锯末状使麦穗腐烂，这种害状关中地区常称之为“囊胎”或“鋼茬”。
3. 孕穗后期入侵，在为害过程中麦穗开始抽出，但幼虫繼續取食切断穗节基部，穗部得不到养分和水分而造成白穗。
4. 有些幼虫直接入侵穗部子房取食，使一部分小穗干枯。

### (四) 蛹

老熟幼虫沿叶鞘縫隙鉆出，在叶鞘的最外层边缘处准备化蛹。化蛹时通常头向上、背靠茎、腹向外。前蛹期 1—2 天。第一代刚化的蛹浅綠色，三天后色变深，八天后蛹壳稍带黃褐色并呈現橙黄色的眼点。第十天眼点变黑，并可見到翅芽、口器及足等构造。再經過 1—2 天即可羽化。

## 四、发生与栽培条件的关系

在不同的栽培条件下，小麦的分蘖力和植株密度、生育期、植株高度、茎秆粗細以及組

織堅韌程度等状况有明显的差异。这些条件直接关系着麦秆蝇的食物因子和栖居环境的适宜程度，影响着麦秆蝇的活动、繁殖和为害。經三年中的研究証明，小麦的播期、灌水、植株密度、品种、土壤肥力等条件与麦秆蝇的发生甚密切。

### （一）与播期和小麦生育阶段的关系

麦秆蝇的为害輕重与小麦播种期关系最密切。冬小麦被害的規律是播期越早的秋苗受害越重，在春季則輕。播期越晚的秋苗受害越輕，春季則重。

1960年11月18日在武功头道塬的不同品种、播期試驗地調查秋苗受害率，各品种調查200株，結果見表4。

表4 不同小麦播期秋苗受害株率比較(1960, 武功)

播种期 (日/月)	品 种	南 大 2419	6028	612	碧 玛 1 号
20/IX		43.5	40.0	54.0	36.0
25/IX		33.0	35.0	35.5	26.5
30/IX		30.5	26.5	37.5	25.1
5/X		24.5	29.5	34.0	20.1
10/X		11.5	8.0	13.5	12.5
15/X		1.5	6.5	2.5	3.0
20/X		0.5	2.0	0	0

1960年11月底和12月初分別在武功、扶风、蒲城等地，調查了不同播期的54块麦田，其秋苗平均受害率見图3。




图3 1960年不同地区不同播期秋苗受害情况

从表4和图3可以看出，关中冬麦区，凡九月播种的小麦，秋苗受害最严重。十月上中旬播种的受害較輕；十月下旬以后播种的受害极輕，甚至完全避免受害。以上受害程度

差别的原因，在于麦苗出土时间与第三代成虫盛发期是否相吻合。第三代成虫产卵盛期，在九月下旬至十月上旬，末期在十月中旬。当九月播种的小麦出土时，正在第三代成虫产卵盛期，因此受害严重。十月下旬以后播种的小麦，待麦苗出土时，成虫产卵期已过，因此在秋苗期极少受害。

1961年5月17日在西北农学院农作二站不同播期试验地，调查冬小麦在春季受害情况，品种为6028，各处理均调查800株，结果见表5。

表5 不同播期小麦在春季受害比较

播种期 (日/月)	小麦生育期	受害株数	受害率(%)
30/X	乳熟期	44	5.5
4/XI	灌浆期	176	16.6
9/XI	始灌浆	233	22.4
14/XI	扬花	276	34.5

早播的冬小麦在春季受害轻，主要是因为植株生长发育快，抽穗早而整齐，当越冬代成虫在4月中下旬盛发时小麦已近抽穗，不适于成虫产卵和幼虫入侵为害。相反的晚播麦田，生育期推迟，组织较幼嫩，适于成虫产卵和幼虫为害，因此晚播小麦受害严重。

小麦不同播期引起受害程度的差异，与成虫的迁移习性、产卵选择性和幼虫入侵率有密切的关系。

1. 成虫的迁移习性 1960年春调查中，发现在4月初，成虫首先出现在早播麦田，以后在晚播麦田密度很大。1961年自3月下旬至5月中旬，固定正茬和回茬麦田各一块，每五天调查一次，其结果见图4。




图4 越冬代成虫在正、回茬麦田中的消长  
——正茬小麦成虫密度；——回茬小麦成虫密度

另外在武功头道塬，选择了相邻的正茬和回茬麦田各一块，麦田的环境西边和南边为棉田，北边是水渠，系统调查结果：回茬麦田在4月6日成虫发生初期时，离早播麦田越近的密度大，距离100米以外的无成虫发现。4月17日和26日调查不同距离的成虫密度就无显著差别，说明正茬麦田的成虫是逐渐向晚播麦田迁移的，见表6。

2. 成虫产卵对小麦植株生育期的选择 1961年4月21日，在武功头道塬选择6028品种，五点取样法各块田取500株，调查不同生育期小麦上着卵株率，结果见表7。

3. 幼虫在不同生育阶段植株上的入侵率 1961年春季盆栽小麦接种和大田定株观

察，幼虫孵化后在不同生育期的植株上入侵率不同，观察结果见表 8。

表 6 回茬小麦离正茬小麦不同距离成虫消长

距离(米) 日/月	0—20	20—50	50—100	100—150	>150
6/IV	8	6	3	0	0
12/IV	84	91	77.3	6	0
17/IV	108	99	37	19	23
26/IV	26	74	39	47	35

表 7 成虫产卵与小麦生育期的关系

生育期及着卵 茬口	生长好		生长差	
	生育期	着卵株率(%)	生育期	着卵株率(%)
正 茬	抽穗期	0	孕穗后期	4.0
回 茬	孕穗期	25	拔节期	39.0
回 茬	拔节期	40	拔节期	58.2

表 8 幼虫在不同生育期小麦上的入侵率

生育期	接种卵数	接种部位	入侵数	入侵率%
三叶期(盆栽)	100	心 叶	97	97
拔节期	200	顶部第二叶基	167	83.5
孕穗期	150	同 上	74	49
抽穗期	100	旗 叶 基	0	0

## (二) 与灌水条件的关系

灌水适当，可促进小麦生长发育，减轻麦秆蝇的为害。相反的，灌水时期和方法不当，会抑制小麦的生长发育，麦田小气候等发生变化，造成麦秆蝇为害的有利条件。不同灌溉方式和灌溉时期的小麦受害率见表 9。

从 18 块不同灌溉方式和时期的麦田比较，资料证明，冬灌比春灌受害轻；早冬灌比晚冬灌受害轻；适时春灌比过早、过晚春灌受害轻；小水畦灌比大田漫灌受害轻。不同冬灌时间所引起小麦受害程度的差别见表 10。

表 9 不同灌溉方式与麦秆蝇为害的关系

调查地点 东张生产队	灌水方式	着卵株率(%)	受害株率(%)
	大水漫灌	34	33.6
	沟水畦灌	8	6.4

表 10 不同冬灌时期与麦秆蝇为害的关系\*

调查日期 (日/月)	冬灌时间	调查株数	受害株数	受害株率(%)
29/V	1960年11月9日	500	20	4.0
29/V	12月25日	500	47	9.4
29/V	1961年1月4日	500	33	6.6
29/V	2月9日	500	78	15.6
29/V	不灌水(对照)	500	35	7.0

\* 播种期 1960 年 10 月 29 日，品种 6028。

### (三) 与植株密度的关系

合理密植可以促进小麦生长发育的整齐度,有效穗数增加,与麦秆蝇的产卵、为害有密切的关系,并且春季较秋苗期明显。1961年春季在武功头道塬固定三块不同密度的麦田,分别在4月19日、4月25日、5月19日调查成虫密度、着卵株率及小麦受害情况,结果见表11。

表 11 不同植株密度与麦秆蝇发生的关系

播 种 量 (斤/亩)	植 株 密 度		成 虫 密 度		着 卵 株 率		被 害 株 率	
	株/米 <sup>2</sup>	每亩株数 (万)	头/100网	密度比较 (%)	着卵株数	着卵株率 (%)	被害株数	被害株率 (%)
20	547	37	33	29.5	51	9.3	28	5.1
18	331	22	76	67.8	73	22.05	52	9.4
15	273	18	112	100	121	44.3	94	34.4

不同植株密度引起为害率的差异,作者经三年的调查,认为主要有以下两个原因:

(1) 合理的密植可以促进小麦生长发育的整齐度,有效分蘖的比率增加。根据我们调查,每亩37万株的无效分蘖仅占7—9%,而每亩18万株的无效分蘖占23—27%。由于合理密植的植株生长发育整齐健壮,着卵株率低,有些虽产了卵其入侵率低,因此受害轻。

(2) 植株密度影响田间小气候,特别是光照度的强弱。当温湿度适合于麦秆蝇时,光线起主导作用。根据很多资料证明,麦秆蝇在稀植光线充足的地方产卵株率高;同一块麦田,地边比地中心受害重。

但是,光线条件是否对麦秆蝇为害适合,还受湿度条件影响,当田间湿度过低时,受害规律却为相反。1961年和1962年春季调查结果见表12。

表 12 不同植株密度和湿度下受害情况比较

时 间	植 株 密 度 (株/米 <sup>2</sup> )		温 度 (℃)	相对湿度 (%)	光 度 (Lx)	成 虫 数 (头/100网)	受 害 情 况	
	密	稀					受 害 株 数	受 害 株 率(%)
1961	密	547	19.3	67.5	—	33	28	5.1
	稀	273	20.2	63.0	—	112	94	34.4
1962	密		22.2	57.2	16917.5	13.1	16	3.4
	稀		21.0	52.2	19770.7	6.5	5	2.3

### (四) 与小麦品种的关系

根据三年中的调查,关中地区未发现完全不受麦秆蝇为害的品种。但是,不同品种间的受害程度却有明显的差别。品种间的抗虫性在冬前表现不甚明显,春季表现十分显著。1961年5月中旬在武功姚安生产队品种试验地调查,每小区2分地,重复三次,每品种调查1,000株,其结果见图5。

春小麦的不同品种,受害程度亦有明显的差异。1961年5月下旬在西北农学院试验农场品种试验地调查,每品种各100株,结果见表13。

不同小麦品种间抗虫性的机制尚须进一步探讨。我们从白水国营农场所品种比较试验




图 5 不同小麦品种受害率比较

表 13 春小麦不同品种受害情况比較

品种名称	生育期	平均株高	着卵株率(%)	受害株率(%)
阿勃	拔节	34	41	16
甘肃96号	孕穗	55	31	10
安徽9号	孕穗	52	16	9
安徽1号	孕穗	54	13	6
阿夫	拔节	39	39	4
碧玉麦	孕穗	57	9	2
南大2419	拔节	54	37	4

中可以初步看出，主要表现在两方面：

1. 生育期的长短 凡生育期短（213—217天），特别是从拔节至抽穗期短，当越冬代成虫盛发时，这些品种接近抽穗，受害轻。如碧瑪1号、涇惠30号等品种，由拔节至抽穗只有15—18天，着卵株率只有9—13%。与此相反的612、陕农3号等品种，拔节至抽穗期长达20天以上，着卵株率达24%。

2. 凡茎秆坚细、叶片狭窄、茸毛多的品种如蒲选1号等，着卵株率为9.5%。陕农13号不具以上形态特征，其着卵株率达21%。

### （五）与土壤肥力和施肥的关系

土壤肥沃的麦田出苗健壮、分蘖力强，在秋苗期如果遭受为害，因生长迅速可以减轻损失。例如蒲城县八福生产队同一块麦田，南北两段播期和其他条件相同，秋苗期受害均很严重。但因北段只施基肥6,000斤，而南段施基肥12,000斤。由于南段肥力充足，分蘖力很强，受害显著减轻。土壤肥力的高低对麦秆蝇为害的影响，更显著的表现在春季，肥力充足的麦田，生长迅速、植株高大、抽穗整齐，麦秆蝇在这些麦田里产卵很少，受害较轻。1960年5月在扶风降帐公社调查，不同茬口的小麦受害情况见表14。

1961年5月在西北农学院试验农场和附近生产队调查不同施肥情况的麦田，品种均为6028，麦秆蝇的为害情况见表15。

总之，小麦不同栽培条件下植株受害程度的差别，主要是通过以下两方面的影响：一

表 14 不同茬口麦田与麦秆蝇发生的关系

茬 口		播 种 期	品 种	植 株 高 度 (厘米)	植 株 密 度 (株/米 <sup>2</sup> )	受 害 株 率 (%)
正 茬	苜 蓿	10月上旬	6028	85	400	2.0
	小 麦	10月上旬	6028	82	393	4.7
回 茬	玉 米	10月下旬	6028	63	518	
	棉 花	10月下旬	6028	61	429	52.3

表 15 不同施肥情况与麦秆蝇发生的关系

调 查 地 点		施 肥 情 况 (斤/亩)	植 株 高 度 (厘米)	受 害 株 率 (%)
头 道 塘	杜寨生产队	基肥: 土粪 6,000 斤	41.5	37.2
	农作一站	基肥: 屎肥 1,300 斤, 追肥: 人粪尿 200 斤, 化肥 17 斤	78	6.4
三 道 塘	穆家寨生产队	基肥: 土粪 6,000 斤, 追肥: 土粪 6,000 斤	70	19.7
	农作二站	基肥: 猪粪 500 斤, 追肥: 化肥 30 斤	77	12.2

方面是通过播种期、灌水、品种、施肥等措施引起生育阶段和生长状况的差别。凡促进小麦生长良好, 生育期提前的措施, 麦秆蝇为害就轻, 否则为害就重。另一方面是通过灌水和密植使田间小气候发生变化, 这主要是湿度和光照度的变化。凡使麦田湿度减低, 光照不足的环境, 麦秆蝇的为害就轻。

## 五、药剂防治的初步试验

### (一) 室内试验

分别进行对成虫和卵的杀伤力试验。用 6% γ 可湿性 666、1% γ 和 0.5% γ 666 粉剂、666 烟剂、E605 等不同浓度的药剂; 小花盆内移入小麦, 在小麦上喷药, 再在麦株上套上马灯罩, 然后将成虫接上去, 12 小时后检查药效。毒杀卵用 E605、DNOC 配制不同浓度的药液, 喷湿有卵的叶片, 检查其孵化率。

1. 666 烟剂 采用西农 A-48 型发烟剂。烟剂的配方是: 6% γ 可湿性 666 4 份, 火硝 3 份, 硝酸铵 2 份, 木炭粉 2 份。

放烟是在密闭的室内进行, 将发烟罐放在正中央的地面上, 离发烟罐各一米处设 4 个接烟点。每点放有成虫的小花盆和没有成虫的小花盆。分别接烟 20 分钟和 12 小时, 取出花盆检查药效。另外接烟 12 小时的花盆移出室外作残效期测定。

试验证明, 采用每立方米药量 0.2 克、0.5 克、1 克等三种, 接烟 20 分钟和 12 小时, 对成虫的杀伤力均达 100%。残效期测定(杀伤力在 50% 以上)药量 0.2 克/米<sup>3</sup>的 3 天, 0.5 克/米<sup>3</sup>为 7 天, 1 克/米<sup>3</sup>为 12 天。

2. γ 666 和 E605 对成虫的药效测定 在室外喷过药的植株, 套上马灯罩将成虫接种进去, 12 小时后检查死亡率。试验结果见表 16。

3. 杀卵试验 分别设 DNOC 500 倍、1,000 倍、5,000 倍、10,000 倍四种浓度。E605 5,000 倍、7,500 倍两种浓度, 对照喷水, 各处理供试卵数均 80 粒, 结果见表 17。

表16 不同药剂对成虫的效果测定

药剂名称	稀释倍数	供试虫数	死亡虫数	死亡率(%)
6%γ可湿性666	300	50	50	100
	500	40	40	100
	1000	44	37	83.7
	1500	30	14	46.7
γ666粉剂	1%γ666	40	40	100
	0.5%γ666	37	31	89.7
E605	2000	30	30	100
	5000	35	35	100
	10000	30	28	97.8
	15000	30	21	76.2
对照	自来水	50	2	4

表17 不同药剂浓度杀卵比较

药剂	稀释倍数	孵化情况		杀卵率(%)
		孵化数	死亡数	
E605	5,000	42	38	47.5
	7,500	75	5	6.25
DNOC	500	56	24	30.0
	1,000	69	11	13.0
	5,000	74	6	13.75
	10,000	78	2	2.5
对照	水	78	2	2.5

## (二) 大田药剂防治試驗

1. 666 烟剂 1961年4月15日在武功头道塬大田放烟試驗。用10×20厘米花盆作发烟罐，每罐装烟剂500克，罐間距离2米，作一字形排列。当时风向为东北风，风速0.9米/秒，每罐发烟时间13—15分钟。放烟12小时以后检查試驗結果，在放烟前，該麦田虫口密度50.7头/100网。放烟的0—150米的范围内，平均虫口密度为8.25头/100网。两侧未扩散到烟剂的同块麦田，虫口密度为60头/100网。防治效果达86.4%。

2. 大田噴药試驗 1961年4月在武功杜寨生产队回茬麦田作噴药試驗。用6%γ可湿性666、1%γ666粉剂、E605等三种药剂，划定小区重复两次。每小区面积一分地。噴药后24小时检查，6%γ可湿性666 200倍液成虫減退98.25%，300倍液成虫減退94.75%；1%γ666粉剂成虫減退93.7%；E605 5,000倍液、7,500倍液均減退100%，10,000倍液減退85.6%。

1961年4月在蒲城进行2.5%γ666粉剂飞机防治試驗，平均每亩用藥量1市斤。防治結果見表18。

## (三) 防治建議

根据麦秆蝇的生活习性和发生規律，防治它主要应通过改进栽培技术，創造对麦秆蝇

表 18 飞机喷撒 2.5% γ 666 粉效果检查

项 目 地 点	喷药前 虫口密度 (头/50网)	喷药后第一天		喷药后第二天		喷药后第三天		喷药后第四天	
		50网 虫数	减退 %	50网 虫数	减退 %	50网 虫数	减退 %	50网 虫数	减退 %
董 楼	34	10	70.5	—	—	5	85.3	3	91.9
	22	10	54.5	7	68.1	3	86.3	2	90.9
	30	—	—	2	93.3	—	—	—	—
	33	—	—	7	78.8	—	—	—	—
米 度	32	5	84.3	4	87.5	—	—	—	—
新 民	43	22	48.3	12	72.0	3	93.0	—	—
	19	4	78.9	8	57.6	0	100	—	—
甜水沟	15	2	86.6	2	86.6	—	—	—	—
	20	12	70	6	70	—	—	—	—

发生的不利条件：如适期播种、合理灌水、合理密植、选育抗虫品种、增施肥料培养地力、促进小麦生长发育的一系列措施，这样就可大大减轻麦秆蝇的为害。其次是加强预测预报，在成虫发生期用 1% γ 666 粉或 E605 5,000 倍液防治，就可控制麦秆蝇的为害。

### 参 考 文 献

- 黄其林 1938 武功农作物害虫之初步研究。西北农林 4: 4。  
 周明祥等 1960 麦秆蝇研究概况。昆虫学集刊 科学出版社 222—33 页。  
 周明祥等 1962 麦秆蝇的研究(I)发生规律。植物保护学报 1(3): 273—84。  
 王辅成 1959 绿麦秆蝇的研究。昆虫知识 8: 256—9。  
 П. Г. Чесноков 1956 Устойчивость зерновых культур к насекомым. 172—5.

**PRELIMINARY STUDIES ON THE WHEAT STEM FLY  
*MEROMYZA SALTATRIX* (LINN.) (DIPTERA;  
CHLOROPIDAE) IN THE CENTRAL  
PART OF SHENSI**

LIU SHAO-YOU AND SUN YI-CHI

(Northwestern College of Agriculture)

The wheat stem fly, *Meromyza saltatrix* (Linn.), is a serious pest in the wheat region and has four generations a year in the central part of Shensi. The adults emerge mostly in the second or third decade of April, from the third decade of May to the second decade of June, in the second or third decade of July and from the third decade of September to the first decade of October. It overwinters as larva in the stem of the young wheat plant. The most important host plant is wheat, while barley comes next. The larva injures wheat two times a year, the first time in late August and the second in spring when the wheat plant is in the period of shooting and earing. It passes summer in plants grown from scattered seeds after harvest. Most of the adults emerge about 6—8 o'clock in the morning. They take some supplementary food after emergence. The eggs are laid chiefly on the plumule sheath during the early period and then on the basal portion of the second to third leaves from the tip. The percentage of injury by the larvae is higher during the young-plant period and the period of shooting of the stem than the period of earing. They cannot attack those plants, the ears of which have already appeared. The plant shows different signs of injury at different stages of development. The degree of injury caused by the wheat stem fly depends closely on the conditions of cultivation. Wheat sown early suffers more seriously during the young-plant period, while wheat sown late suffers more during spring. Proper irrigation and close planting lessen the injury. Varieties with shorter periods of growth and development, thinner stems and narrower leaf blades and those more hairy and waxy are only slightly injured. Wheat plants in well-manured fields or fields of high fertility and plants growing in good condition are also slightly injured. The adult stage is the best period for control. The powders, aerosol and suspension fluids of BHC are all very effective against the adults. Parathion (E-605) kills not only the adults but also to a certain extent the eggs.