进军深海科学前沿——我国参与大洋钻探的进展

翦知湔

同济大学海洋与地球科学学院, 海洋地质国家重点实验室, 上海 200092

E-mail: jian@tongji.edu.cn

1 进入国际深海基础研究前沿

1968 年美国“格罗玛·挑战者”深海钻探船首航墨西哥湾, 开启了划时代的深海钻探计划(DSDP, 1968~1983年). 50 年来, 深海钻探计划历经国际大洋钻探计划(ODP, 1985~2003 年)、综合大洋钻探计划(IODP, 2003~2013年)和当前的国际大洋发现计划(IODP, 2013~2023 年), 成为地球科学领域迄今规模最大、影响最深的国际大科学计划, 导致了地球科学一次又一次的重大突破, 始终站在国际学术前沿.

由于“文革”和科技投入不足的原因, 我国迟至 1998 年才以参与成员身份(年付 50 万美元)加入 ODP, 开启了中国大洋钻探 20 年的发展历程. 2003 年, 我国继续以参与成员身份(会费增加到年付 100 万美元)加入综合大洋钻探计划. 2013 年, 习近平总书记亲自批准, 我国以全额会员身份加入国际大洋发现计划, 并大幅度提高资助强度, 除了每年支付 300 万美元会费, 还以匹配经费的形式资助 IODP 的航次. 在新 IODP 运行的前 5 年(2014~2018 年), 中国为 IODP 提供了 3300 万美元的资助, 成为仅次于美国、日本和欧洲联合体的第四大资助方. 20 年来, 先后有来自教育部、中国科学院、自然资源部等所属的 30 多家单位的 130 余位科学家参加了以南海和菲律宾海为重点的西太平洋以及大西洋、印度洋和南大洋等海域的 60 个大洋钻探航次. 尤其是, 1999 年春成功实施了由我国科学家建议、设计和主持的南海 ODP 第 184 航次, 实现了中国深海钻探“零”的突破. 近 10 年 IODP 的前 5 年内, 我国又实施了 3 个“补助性建议项目(complementary proposal project, CPP)”航次. 在科技部和国家自然科学基金委员会等的大力支持下, 南海大洋钻探研究 20 年长盛不衰, 取得了丰硕的研究成果, 使我国一举进入深海基础研究的国际前沿, 引领我国深海科学发展的方向.

2018 年是中国参加大洋钻探 20 周年, 又适逢国际大洋钻探 50 周年, 特撰文总结 20 年来中国 IODP 的科学成就, 并展望未来, 以期激励更多青年学者投身大洋钻探的宏伟事业, 为建设海洋强国做出贡献.

2 南海 4 次大洋钻探的主要科学收获

中国参加国际大洋钻探主要收获来自实现以我国为

翦知湔 同济大学海洋与地球科学学院院长、教授, 现任国际过去全球变化计划 PAGES 执委、中国 IODP 专家咨询委员会副主任. 主要从事海洋地质学的教学与科研.

主的 4 个 ODP-IODP 航次: 1999 年以“东亚古季风”为主题的 ODP 第 184 航次, 由汪品先和 Warren Prell 为首席科学家; 2014 年以“南海海底扩张”为主题的 IODP 第 349 航次, 由李春峰和林间为首席科学家; 2017 年以“南海裂谷破裂”为主题的 IODP 第 367 和 368 航次, 分别由孙珍和 Joann Stock, 以及翦知湔和 Hans Christian Larsen 担任首席科学家. 如果算上 2018 年 11 月 15 日~12 月 8 日正在实施的 IODP 第 368X 航次(主题是“重返南海北部 U1503 站”), 近 20 年来在我国科学家设计和主持下实现了“4+1”次南海大洋钻探, 钻探深海 18 个站位, 其中 12 处水深超过 3000 m, 取回岩芯近万米, 其中 7 处钻进了岩浆岩基底(图 1). 南海的大洋钻探使我国科学界提出了自己的新认识, 在气候演变和海盆形成方面向套用大西洋模式的流行观点提出挑战, 使南海成为全球深海研究程度最高的边缘海, 并且确立了我国在南海深海科学研究中的国际主导权.

2.1 气候演变热带驱动: 大洋碳储库的偏心率长周期

南海大洋钻探建立了西太平洋区最佳深海沉积剖面. 1999 年在南海实施的大洋钻探 ODP 第 184 航次取得了西太平洋三千多年以来的沉积记录, 其中 ODP 1143 和 1146 站近 5 Ma 以来的有孔虫碳同位素变化显示了非常规律的 40~50 万年周期性^[1,2]. 将南海 5 Ma 以来有孔虫 $\delta^{13}\text{C}$ 与各大洋以及地中海的 $\delta^{13}\text{C}$ 记录对比, 发现在上新世 $\delta^{13}\text{C}$ 最大值严格对应于偏心率的最小值, 呈现出稳定的 40 万年长周期, 然而自 1.6 Ma 开始, 大洋 $\delta^{13}\text{C}$ 最大值与偏心率最小值的对应关系发生错位, 大洋 $\delta^{13}\text{C}$ 展示了 50 万年长

图 1 南海 4 次大洋钻探的科学主题和站位

Figure 1 Scientific themes and sites of the four ocean drilling expeditions in the South China Sea

周期^[3](图 2)。碳循环的偏心率长周期变化更具有穿时性,普遍存在于新生代甚至中生代的海洋和气候记录中,尤其是在中中新世^[4]和渐新世^[5],因此被喻为地球气候系统的“心跳”节律。为此,我国学者提出大洋碳储库 40 万年长偏心率周期的“溶解有机碳假说”,认为大洋营养盐的供应通过“生物泵”和“微生物泵”的消长,控制着溶解有机碳和颗粒有机碳的比例,进而造成海水 $\delta^{13}\text{C}$ 的长周期变化;但是冰盖迅速增长导致大洋碳储库改组,就可能破坏周期变化的韵律^[3]。然而,从偏心率到海水营养盐供应变化之间,仍然缺一个环节,这就是全球季风所体现的水文循环。水循环变化在海洋地质记录中的体现是化学风化强度引起的元素丰度变化。南海近 5 Ma 来的记录,展示了季风降水造成风化作用的 40 万年轨道周期,而这正是大洋碳循环长周期的驱动力^[6]。

国际流行的气候演变理论,主要强调高纬区,尤其是北大西洋北部海区的控制,而忽视低纬海区。南海大洋钻探的研究提出了气候演变的冰盖驱动和热带驱动的“双重驱动”假说^[7],并将气候演变热带驱动落实在“全球季风”演变的新概念上,提出了全球季风为标志的水循环假说,和以微生物碳泵为基础的溶解有机碳假说,使得低纬全球季风演

变与冰盖消长一样,已成为国际过去全球变化(PAGES)的新命题。这是对气候演变的米兰科维奇理论的一种新认识,有助于对地球环境长期变化趋势的科学预测。

2.2 西太平洋地质演变: 南海构造成因的新认识

中国的地球动力学与宏观演变,历来重视西边(印度碰撞),忽视东边因素(太平洋板块),因而突破点也在太平洋方向。尤其是,地球上 75% 的边缘海分布于西太平洋,其形成过程必然改变全球的宏观地质格局。其中,南海由于其纬度低以及处于太平洋和特提斯海之间的地理位置,而且上接青藏高原,具有沉积速率高、地层保存好的优越条件,是开展西太平洋边缘海形成过程研究的理想海域。自 20 世纪以来,在西太平洋与构造有关的大洋钻探航次多达 20 余个,广泛分布在菲律宾海、日本海和南海等海域。但是,日本海大洋钻探的 3.5 个航次中有 3 个是 20 世纪 80 年代以前的,且只有 3 处钻入基底。相比之下,南海是西太平洋大洋钻探材料最丰富的边缘海,近 20 年已经执行 4 次大洋钻探,从海底扩张上溯到裂谷过程,从海盆的残留中脊追踪到洋陆过渡带,为回答岩石圈由陆变海的地质学基本问题提供了宝贵岩芯材料。

过去对南海深部扩张历史的研究主要依赖于地球物理资料提供的间接证据^[8],为了获得深海盆岩石学的直接证据,大洋钻探是唯一办法。2014 年南海 IODP 第 349 航次成功在东部和西南次海盆获得了南海基底的新鲜洋壳玄武岩样品,通过同位素定年、地球化学分析等综合研究,确定了南海深海盆于 15~16 Ma 停止扩张的年龄,其中东部次海盆在 15 Ma 停止,而西南次海盆在 16 Ma 停止^[9],澄清了有关南海海盆扩张历史的争论。2017 年 IODP 第 367 和 368 航次首次建立起南海新生代甚至晚中生代以来完整的地层序列,揭示南海最早海侵发生在距今 40 Ma,南海大陆边缘在晚始新世的同张裂期已处于深水环境,发生复杂的沉积和深海火山活动,稍后期的岩浆活动已具有典型洋中脊玄武岩特征^[10](图 3)。这说明南海在裂谷期就有强烈的岩浆作用,明显不同于北大西洋伊必利亚-纽芬兰的世界典型^[11],揭示了南海不同于大洋模式的边缘海张裂机制。

40 年来关于南海成因的观点来自欧洲:法国人提出印度的碰撞使印支半岛向南突出,推出了南海,所以原因在北边^[12];英国人认为古南海向婆罗洲的俯冲,拉开了南海,原因在南边^[13]。大洋钻探的结果揭示了南海深海盆由东向西推进的记录。特别是,从菲律宾海到南海中央海盆、西南次海盆,海底扩张从东向西扩展,说明很可能南海的张裂来自西菲律宾海方向。因此,通过钻探,否定了南海地震剖面按照大西洋模式的解释,南海裂谷作用和海底扩张具有西太平洋边缘海的特色,南海应当为边缘海提供形成演化的地质模型。

图2 南海和全球过去5 Ma的海洋碳同位素记录^[3]。A~C, ODP 1143站, 南海: A, 底栖 $\delta^{18}\text{O}$; B, 底栖 $\delta^{13}\text{C}$; C, $\delta^{13}\text{C}$ 。D和E, 太平洋: D, ODP 807站的浮游 $\delta^{13}\text{C}$; E, ODP 846和849站的综合底栖 $\delta^{13}\text{C}$ 。F和G, 大西洋: F, ODP第154航次(926~929站)的综合底栖 $\delta^{13}\text{C}$; G, ODP 659站的底栖 $\delta^{13}\text{C}$ 。H, 地中海: 综合浮游 $\delta^{13}\text{C}$ 。黄色条表示 $\delta^{13}\text{C}_{\text{max}}$; 红色虚线表示在2.7、0.9和0.4 Ma的冰盖主要发育事件

Figure 2 Carbon isotopic records from the South China Sea and global ocean over the past 5 Ma^[3]. A~C, ODP Site 1143, South China Sea: A, benthic $\delta^{18}\text{O}$; B, benthic $\delta^{13}\text{C}$; C, $\delta^{13}\text{C}$. D~E, Pacific: D, planktonic $\delta^{13}\text{C}$ of ODP Site 807; E, stacked benthic $\delta^{13}\text{C}$ of ODP Sites 846 and 849. F~G, Atlantic: F, stacked benthic $\delta^{13}\text{C}$ of ODP Leg 154 (sites 926~929); G, benthic $\delta^{13}\text{C}$ of ODP Site 659. H, Mediterranean: Stacked planktonic $\delta^{13}\text{C}$. Yellow bars indicate $\delta^{13}\text{C}_{\text{max}}$; red dotted lines denote major events of ice-sheet development at 2.7, 0.9 and 0.4 Ma

3 促进我国地球系统研究的新局面

中国参与大洋钻探不仅为我国科学家参加三大洋和南北极的深海探索创造了条件, 而且使我国学术界进入深海研究的国际前沿, 与国际深海科学的各主要领域全面接轨。譬如, IODP第349航次在南海发现世界首例由碳酸盐质母岩浆向碱性玄武岩连续转化的现象^[14], 打开了揭秘深部碳循环的一扇新的窗户, 将大大推动有关深部碳对岩浆活动、地表环境的影响等相关研究。又如, 南海大洋钻探在南海水深3500 m以下站位的声学基底(玄武岩、蚀变玄

武岩或者砾岩)之上, 发现有渐新世至中新世的红褐色黏土沉积^[15], 与广布于苏禄海、苏拉威西海、菲律宾海在内的西太平洋洋壳玄武岩之上的红褐色黏土一致, 为重新认识大洋红层发育机理提供了新的证据。因此, 南海大洋钻探取自深海盆的岩芯, 首次为大洋岩石学和深海沉积学提供了宝贵材料, 使我国的深海研究从古海洋学拓展到大洋岩石圈的地球化学和地球物理研究等新领域, 我国的沉积学从陆地和近岸进入深海, 从而覆盖了深海地球科学的各主要领域, 扭转了长期以来海陆脱节、重陆轻海的偏向, 将我国陆地和太平洋地质连接起来, 促进了海陆结合的地

图3 南海 IODP 第 367~368 航次钻探结果否定了原来假设, 5 个站位的基底完全不同^[10,11]

Figure 3 The results of the IODP Expeditions 367~368 in the South China Sea have denied the original hypothesis, and the basements of the five sites are completely different^[10,11]

球系统研究新局面, 推进了我国地球科学整体的发展。

此外, 南海大洋钻探推进我国对南海深水油气勘探的理论认识, 为南海的油气勘探研究提供了对比的据点。深海油气勘探的地质判断, 大量依靠地震剖面等地球物理的间接证据, 而大洋钻探取得的岩芯, 为地震剖面的地质解释提供了直接的地层检验, 确立了区域地层的标准剖面。譬如, ODP 第 184 航次的 1148 站多年来已成为南海深水油气勘探的重要参数井。实际上, 油气勘探的地质研究着重在陆架和陆坡上部, 大洋钻探从深海盆取得的地质记录, 为南海资源勘探提供了不可替代的深部信息, 深化了对南海沉积盆地成因的认识, 揭示了油气和天然气水合物等的形成条件和变化规律。因此, 大洋钻探从基础研究角度为资源开发提供了无可替代的宝贵资料和认识。

4 中国大洋钻探的科学突破前景

随着陆地的资源枯竭和环境恶化, 深海海底和地球内部的重要性更加突出; 随着“全球变化”的深入, 地球表层和地球内部的相互交换也越来越成为地球和生命科学探索的前沿。可见, 国际学术界探索海底深部的势头方兴未艾, 地球表层和内部的连接也必将成为地球科学的下一个突破口。深海海底是地球表面最接近地球内部的地方, 到深海海底打钻是直接探索地球内部无可替代的手段。然而, 大洋钻探 50 年后, 世界大洋仍旧留下大片空白; 已经钻探的站位, 也往往只打到“头皮”, 许多古海洋学的目标, 因为沉积太厚、或可能有油气威胁, 未能实现。因此国际大洋钻探的科学前景不容质疑。

现在, 建设海洋强国已经成为我们的国策, 继续增强

在国际大洋钻探中的参与力度、逐步争取进入领导层, 已是我们不容争议的目标。2014 年中国 IODP 专家咨询委员会为我国拟订了“三步走”战略目标: 第一步实现 2~3 个我国为主的 CPP 航次; 第二步仿效欧洲, 争取成为 IODP 又一个“平台提供者”; 第三步: 建造世界第三代的大洋钻探船。2017 年 6 月 IODP 第 368 航次结束, “决心号”在上海举行靠港活动, 4 年里完成南海 3 个航次, 标志着第一步目标已经完成。当前的任务就是第二步, 内容包括自主组织实施“特定任务钻探平台(MSP)”航次, 建设全球第 4 个大洋钻探岩芯实验室, 以及主办新 10 年科学计划的国际研讨等。具体说, 准备选择南海南部的巽他陆架, 通过国际合作, 由我国出船执行大洋钻探航次, 研究几百万年来的海平面升降和热带雨林出没对陆地碳储库的影响^[16], 继续扩大我国在南海大洋钻探和基础研究上的主导权。

更重要的是, 进入 IODP 领导权不能只靠经费投入, 更要靠科技水平, 为此我国应该发起制定 2023 年后的国际大洋钻探新的科学计划。气候演变热带驱动和西太平洋地质演变的研究是我国在大洋钻探领域最具有国际竞争力的方面。将南海深海记录与现代深海过程的研究结合起来, 将揭示全球季风与气候演变热带驱动在全球气候变迁中的作用, 促进我国地球科学的古今结合、向跨圈层跨学科的方向发展。然而, 气候的热带驱动是一个有争议的、还没有成为学术界主流意识的命题。经过近 10 年的探索, 已经初步认识到“热带驱动”可能的突破点, 关键在于如何在地球表层穿越大气、海洋、生物和岩石圈探索不同时间尺度(构造尺度、轨道尺度、海洋尺度)上的水循环和碳循环及其相互关系。同时, 从全球的地幔循环着眼, 利用我

国的海洋与陆地结合的优势,将东亚-西太平洋表层过程与深部过程结合起来进行研究,阐明晚中生代东亚-西太平洋的构造特色,确定晚新生代西太平洋的转折事件,揭示西太平洋区的地球动力学格局,将有助于对当今的全球板块系统研究,为我国环境变化和资源前景的宏观评价提

供科学基础。

大洋钻探相当于国际深海科学的奥运会,其领导权的争夺反映了深海领域的国际地位之争。为此,我国迫切需要通过几年的努力,力争进入大洋钻探的国际领导核心,为建设“海洋强国”做出关键性的贡献。

推荐阅读文献

- 1 Wang P X, Tian J, Cheng X R, et al. Carbone reservoir changes preceded major ice-sheet expansion at the mid-Brunhes event. *Geology*, 2003, 31: 239–242
- 2 Clemens S C, Prell W L, Sun Y, et al. Southern Hemisphere forcing of Pliocene $\delta^{18}\text{O}$ and the evolution of Indo-Asian monsoons. *Paleoceanography*, 2008, 23, doi: 10.1029/2008PA001638
- 3 Wang P X, Li Q Y, Tian J, et al. Long-term cycles in the carbon reservoir of the Quaternary ocean: A perspective from the South China Sea. *Natl Sci Rev*, 2014, 1: 119–143
- 4 Holbourn A, Kuhnt W, Schulz M, et al. Impacts of orbital forcing and atmospheric carbon dioxide on Miocene ice-sheet expansion. *Nature*, 2005, 438: 483–487
- 5 Pälike H, Norris R D, Herrle J O, et al. The heartbeat of the Oligocene climate system. *Science*, 2006, 314: 1894–1898
- 6 Tian J, Xie X, Ma W, et al. X-ray fluorescence core scanning records of chemical weathering and monsoon evolution over the past 5 Myr in the southern South China Sea. *Paleoceanography*, 2011, 26: 1–17
- 7 Wang P X, Tian J, Lourens L J, et al. Obscuring of long eccentricity cyclicity in Pleistocene oceanic carbon isotope records. *Earth Planet Sci Lett*, 2010, 290: 319–330
- 8 Taylor B, Hayes D E. The tectonic evolution of the South China Sea Basin. In: Hayes D E, ed. *The Tectonic and Geologic Evolution of Southeast Asian Seas and Islands*. Am Geophys Union Geophys Monogr, 1980, 23: 89–104
- 9 Li C F, Xu X, Lin J, et al. Ages and magnetic structures of the South China Sea constrained by deep tow magnetic surveys and IODP Expedition 349. *Geochem Geophys Geosys*, 2015, 15: 4958–4983
- 10 Sun Z, Jian Z M, Stock J M, et al. South China Sea rifted margin. In: *Proceedings of the International Ocean Discovery Program*, 2018. <https://doi.org/10.14379/iodp.proc.367368.2018>
- 11 Larsen H C, Mohn G, Nirrengarten M, et al. Rapid transition from continental breakup to igneous oceanic crust in the South China Sea. *Nat Geosci*, 2018, 11: 782–789
- 12 Tapponnier P, Peltzer G, Le Dain A Y, et al. Propagating extrusion tectonics in Asia: New insights from simple experiments with plasticine. *Geology*, 1982, 10: 611–616
- 13 Hall R. Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific: Computer-based reconstructions, model and animations. *J Asian Earth Sci*, 2002, 20: 353–431
- 14 Zhang G L, Chen L H, Jackson M G, et al. Evolution of carbonated melt to alkali basalt in the South China Sea. *Nat Geosci*, 2017, 10: 229–235
- 15 Jian Z M, Larsen H C, Alvarez Zarikian C A, et al. Expedition 368 Preliminary Report: South China Sea Rifted Margin. College Station: International Ocean Discovery Program, 2018. <https://doi.org/10.14379/iodp.pr.368.2018>
- 16 Jian Z M, Dang H W. Reading the past, informing the future: Progress and prospective of the recent ocean drilling researches on climate and ocean change (in Chinese). *Adv Earth Sci*, 2017, 32: 1267–1276 [翦知潜, 党皓文. 解读过去、预告未来: IODP 气候与海洋变化钻探研究进展与展望. *地球科学进展*, 2018, 32: 1267–1276]

Summary for “进军深海科学前沿——我国参与大洋钻探的进展”

Towards the scientific frontier of deep-sea research—Progress of China’s participation in ocean drilling

Zhimin Jian

State Key Laboratory of Marine Geology, School of Ocean and Earth Science, Tongji University, Shanghai 200092, China
E-mail: jian@tongji.edu.cn

The International Ocean Discovery Program (IODP, 2013–2023) and its predecessors the Deep Sea Drilling Program (DSDP, 1968–1953), the Ocean Drilling Program (ODP, 1985–2003), and the Integrated Ocean Drilling Program (IODP, 2003–2013) are the largest and most influential international scientific program in the field of geoscience. China joined the ODP in 1998, and four ocean drilling expeditions have been carried out so far in the South China Sea (SCS): ODP Leg 184 in 1999 with the theme of “East Asian monsoon evolution”, IODP Expedition 349 in 2014 with the theme of “South China Sea seafloor spreading”, and IODP Expeditions 367–368 in 2017 with the theme of “South China Sea rifted margin”. There are 18 deep-sea drilling sites in the four expeditions to the SCS, 12 of which have water depths of more than 3000 m and 7 of which have penetrated the igneous basement, and nearly 10000 m of sediment and rock have been recovered in total. The results of ocean drilling in the SCS have put forward our own understandings on climate evolution and basin formation. (1) According to the discovery of long eccentricity cycle of ocean carbon reservoir, a double driving hypothesis of climate evolution by ice sheet and tropical processes had been proposed, making the evolution of low-latitude global monsoon, like the growth and decline of polar ice sheet, to become a new proposition of the International Past Global Change Study (PAGES). (2) The newly completed IDOP expeditions 367 and 368 in the SCS have recovered the complete record of the SCS evolution from land to deep-sea, particularly including the discovery of the marine Eocene in the northern SCS, displaying that the seafloor spreading of the SCS propagated from east to west and probably originated from the western Philippine Sea to the east. These findings challenged the traditional view of the North Atlantic. The SCS is not a mini Atlantic and promising to provide a geological model for the formation and evolution of the marginal sea. These new discoveries and new knowledge make the SCS to be the most intensively studied marginal sea in the world, and establish China’s dominance in the international deep-sea scientific researches of the SCS. At the same time, the ocean drilling in the SCS has greatly promoted the Chinese academic circle to integrate with the main fields of international deep-sea science, and enter a new phase of the land-sea combined earth system study. From the perspective of basic research, it provides irreplaceable valuable information and knowledge for oil and gas exploration, particularly in deep waters in the SCS. In addition, China’s participation in ocean drilling has also provided much needed opportunities for Chinese scientists to participate in the deep-sea exploration of the oceans including the Antarctic and Arctic oceans, and formed a high-level deep-sea scientific and technological research team, leading our deep-sea scientific research to the international frontiers. At present, China is in the critical period of building a powerful maritime country, and is striving to be a member of the international leadership in ocean drilling.

ocean drilling, South China Sea, climate evolution, basin formation, marginal sea, deep-sea research

doi: 10.1360/N972018-01159