双查尔酮 Rhuschalcone I 的合成

张应鹏* 陈宇涛 杨云裳 关 晓

(兰州理工大学石油化工学院, 有机与药物化学研究所 兰州 730050)

摘 要 针对 Rhuschalcone I 的结构特征, 将其切为 2 个合成片断: 化合物 **8** 和化合物 **10**, 然后将 2 个片断连接。以间苯二酚和对羟基苯甲醛为起始原料, 经选择性甲基化、碘代、甲氧甲基化、羟醛缩合、Ullmann 反应和脱保护等步骤, 完成了 Rhuschalcone I 的合成。关键中间体与最终产物的化学结构经 $^1\text{H NMR}$ 、 $^{13}\text{C NMR}$ 和 ESI-MS 等表征及分析予以确认。

关键词 Rhuschalcone I, Ullmann 反应, 全合成, 羟醛缩合

中图分类号: O625

文献标识码: A

文章编号: 1000-0518(2011)06-0652-05

DOI: 10.3724/SP.J.1095.2011.00427

查尔酮(1,3-二苯基丙烯酮), 是芳香醛酮发生交叉羟醛缩合的产物。以它为母体的化合物存在于甘草、红花等药用植物中, 是植物体内合成黄酮的前体, 有广泛的生物活性和重要的药理作用^[1-3]。双查尔酮属于查尔酮家族中的一员, 也具有多种生理和药理活性^[4-5]。

2',4'',2'''-三羟基-4',4'''-二甲氧基-4-O-5'''-双查尔酮(Rhuschalcone I, **1**)是2000年从广泛分布于南部非洲国家博兹瓦纳(Botswana)东部的灌木 *Rhus pyroides* 的嫩枝中得到的。它对常常侵入农场吞食农作物和植物的蟋蟀有拒食性^[6]。4,2',4'',2'''-四羟基-4'''-甲氧基-4'-O-5'''-双查尔酮(Rhuschalcone IV)则是2003年首次从 *Pyroides* 漆树的根部分离出的成分, 研究表明它有抗肿瘤和抗疟活性^[7]。

查阅文献, Rhuschalcone I 的合成还未见报道。本文以间苯二酚和对羟基苯甲醛为起始原料, 经选择性甲基化、碘代、甲氧甲基化、羟醛缩合、Ullmann 反应和脱保护等步骤合成了 Rhuschalcone I (**1**), 合成路线如 Scheme 1 所示。

Scheme 1 Synthesis route of the Rhuschalcone I (1)

1 实验部分

1.1 试剂和仪器

XRC-1 型显微熔点仪(上海精密仪器有限公司); Avance 400 型核磁共振仪(德国 Bruker 公司), TMS 为内标, CDCl_3 或 DMSO-d_6 作溶剂(Sigma-Aldrich 公司); Esquire 6000 型液质联用仪(德国 Bruker 公司)。

2,4-二羟基苯乙酮(3)参考文献[8]方法由间苯二酚和冰乙酸制备, mp 146 ~ 147 $^{\circ}\text{C}$ (文献值^[9] 147 ~ 148 $^{\circ}\text{C}$)。2-羟基-4-甲氧基苯乙酮(4)参考文献[10]方法由化合物 3 和硫酸二甲酯制备, mp 50 ~ 51 $^{\circ}\text{C}$ (文献值^[11] 50 $^{\circ}\text{C}$)。柱层析所用硅胶(青岛海洋化工厂)粒径 75 ~ 150 μm 。其它试剂为分析纯或化学纯, 用前未作进一步处理。

1.2 合成操作

2-羟基-4-甲氧基-5-碘苯乙酮(5): 在 50 mL 圆底烧瓶中加入 180 mg (1.1 mmol) 化合物 4、170 mg (1 mmol) 硝酸银和 20 mL 乙腈。搅拌溶解, 充 N_2 气保护, 迅速加入 279 mg (1.1 mmol) I_2 , 室温避光搅拌 8 h。过滤, 乙酸乙酯萃取, 依次用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸镁干燥。蒸去溶剂, 残余物用硅胶柱分离纯化, $V(\text{乙酸乙酯}):V(\text{石油醚}) = 1:13$ 洗脱。蒸去溶剂得到白色针状固体 222 mg, 产率 69%, mp 164 ~ 165 $^{\circ}\text{C}$ 。

对甲氧甲氧基苯甲醛(7): 参考文献[12-13]方法, 取对羟基苯甲醛进行羟基保护, 其中对羟基苯甲醛、 K_2CO_3 和氯甲基甲醚的摩尔比为 1:2:3.25。反应 2 h, 得无色晶体 7, 产率 94%, mp 125 ~ 126 $^{\circ}\text{C}$ 。

2-羟基-4-甲氧基-4'-甲氧甲氧基-5-碘查尔酮(**8**):参考文献[10,14]方法,将化合物**5**和化合物**7**按摩尔比1:1进行反应,得黄色晶体**8**,产率87%,mp 159~160℃。

2-甲氧甲氧基-4-甲氧基苯乙酮(**9**):参考文献[12-13]方法,将化合物**4**、 K_2CO_3 和MOMCl按摩尔比为1:2:3.25,反应2h,得浅黄色油状液体**9**,产率78%。

2-甲氧甲氧基-4-甲氧基-4'-羟基查尔酮(**10**):参考文献[10,14]方法,将化合物**6**和化合物**9**按摩尔比1:1进行反应,得黄色油状液体**10**,产率49%。

2'''-羟基-2',4''-二甲氧甲氧基-4,4'''-甲氧基-4-O-5'''-双查尔酮(**11**):参照文献[15]方法,在100 mL圆底烧瓶中加入440 mg(1 mmol)化合物**8**、314 mg(1 mmol)化合物**10**、19 mg(0.1 mmol)CuI、32 mg(0.1 mmol) $n-Bu_4NBr$ 、532 mg(2 mmol) $K_3PO_4 \cdot 3H_2O$,再加入DMF 35 mL。充 N_2 气保护,150℃搅拌回流22h。过滤,滤液用乙酸乙酯萃取,再依次用饱和 NH_4Cl 溶液和饱和食盐水洗涤。有机层用无水硫酸镁干燥,滤除干燥剂,蒸除溶剂,残余物用硅胶柱分离, $V(\text{乙酸乙酯}):V(\text{石油醚})=1:15$ 洗脱。蒸出溶剂得黄色固体**11** 501 mg,收率80%,mp 95~98℃。

2',4'',2'''-三羟基-4',4'''-二甲氧基-4-O-5'''-双查尔酮(**1**):参考文献[16]方法脱去化合物**11** 31.3 mg(1 mmol)的羟基保护基,得浅黄色固体**1** 23.1 mg,收率86%,mp 231~234℃(文献值^[6] 230~232℃)。

2 结果与讨论

2.1 化合物表征

化合物**5**: 1H NMR(400 MHz, $CDCl_3$), δ : 10.96(s, 1H, OH), 8.06(s, 1H, C6-H), 6.39(s, 1H, C3-H), 3.91(s, 3H, OCH_3), 2.56(s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR(100 MHz, $CDCl_3$), δ : 201.8(C=O), 165.2(C4), 163.7(C2), 135.4(C6), 115.9(C1), 99.9(C3), 75.0(C5), 56.7(OCH_3), 26.3(CH_3)。

化合物**7**: 1H NMR(400 MHz, $CDCl_3$), δ : 9.90(s, 1H, CHO), 7.84(d, $J=8.8$ Hz, 2H, C2-H, C6-H), 7.15(d, $J=8.8$ Hz, 2H, C3-H, C5-H), 5.25(s, 2H, CH_2), 3.50(s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR(100 MHz, $CDCl_3$), δ : 171.9(CHO), 161.6(C4), 132.3(C2, C6), 122.6(C1), 115.7(C3, C5), 94.0(CH_2), 56.3(OCH_3)。

化合物**8**: 1H NMR(400 MHz, $CDCl_3$), δ : 13.5(s, 1H, OH), 8.25(s, 1H, C6-H), 7.88(d, $J=15.2$ Hz, 1H, H_β), 7.64(dd, $J=8.8, 2.0$ Hz, 2H, C2'-H, C6'-H), 7.41(d, $J=15.2$ Hz, 1H, H_α), 7.1(d, $J=8.8$ Hz, 2H, C3'-H, C5'-H), 6.46(s, 1H, C3-H), 5.24(s, 2H, CH_2), 3.93(s, 3H, C4- OCH_3), 3.50(s, 3H, OCH_3); ^{13}C NMR(100 MHz, $CDCl_3$), δ : 191.0(C=O), 166.7(C4), 163.7(C2), 159.6(C4'), 145.1(C_β), 139.9(C6), 130.5(C2', C6'), 128.3(C1'), 117.6(C_α), 116.6(C3', C5'), 116.2(C1), 100.3(C3), 94.2(CH_2), 73.2(C5), 56.7(C4- OCH_3), 56.2(OCH_3); ESI-MS $m/z[M+H]^+$: 441。

化合物**9**: 1H NMR(400 MHz, $CDCl_3$), δ : 7.80(d, $J=9.2$ Hz, 1H, C6-H), 6.70(d, $J=2.4$ Hz, 1H, C3-H), 6.57(dd, $J=9.2, 2.4$ Hz, 1H, C5-H), 5.27(s, 2H, CH_2), 3.83(s, 3H, C4- OCH_3), 3.52(s, 3H, OCH_3), 2.60(s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR(100 MHz, $CDCl_3$), δ : 197.4(C=O), 164.1(C4), 158.4(C2), 132.2(C6), 121.4(C1), 106.6(C5), 100.6(C3), 94.2(CH_2), 56.2(C4- OCH_3), 55.3(OCH_3), 31.6(CH_3)。

化合物**10**: 1H NMR(400 MHz, $CDCl_3$), δ : 13.6(s, 1H, OH), 7.84(d, $J=8.8$ Hz, 1H, C6-H), 7.64(d, $J=16.4$ Hz, 1H, H_β), 7.52(d, $J=8.0$ Hz, 2H, C2'-H, C6'-H), 7.34(d, $J=16.4$ Hz, 1H, H_α), 6.90(d, $J=8.0$ Hz, 2H, C3'-H, C5'-H), 6.73(s, 1H, C3-H), 6.62(d, $J=8.8$ Hz, 1H, C5-H), 5.25(s, 2H, CH_2), 3.84(s, 3H, C4- OCH_3), 3.48(s, 3H, OCH_3); ^{13}C NMR(100 MHz, $CDCl_3$), δ : 191.8(C=O), 166.4(C4), 163.7(C2), 157.7(C4'), 144.6(C_β), 131.1(C6), 130.5(C2', C6'), 127(C1'), 124.1(C1), 117.0(C_α), 116.0(C3', C5'), 107.5(C5), 101.5(C3), 94.9(CH_2), 56.4(C4- OCH_3), 55.4(OCH_3); ESI-MS $m/z[M+H]^+$: 315。

化合物 **11**: $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3), δ : 9.78 (s, 1H, OH), 7.91 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H, C6'-H), 7.87 (d, $J = 17.2$ Hz, 2H, H β , H β'), 7.72 (dd, $J = 8.4, 2.4$ Hz, 2H, C2-H, C6-H), 7.52 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H, C2''-H, C6''-H), 7.43 (s, 1H, C6'''-H), 7.05 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H, C3-H, C5-H), 6.91 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H, C3''-H, C5''-H), 6.80 (s, 1H, C3'-H), 6.67 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H, C5'-H), 6.64 (d, $J = 17.2$ Hz, 2H, H α , H α'), 6.62 (s, 1H, C3'''-H), 5.38 (s, 2H, CH_2), 5.25 (s, 2H, CH_2), 3.84 (s, 3H, C4'''-OCH $_3$), 3.83 (s, 3H, C4'-OCH $_3$), 3.35 (s, 6H, OCH $_3$); ESI-MS m/z [M + Na] $^+$: 649。

化合物 **1**: $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3), δ : 13.55 (s, 1H, OH), 12.68 (s, 2H, OH), 7.89 (s, 1H, C6'''-H), 7.87 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H, C6'-H), 7.85 (d, $J = 16.4$ Hz, 2H, H β , H β'), 7.72 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H, C2-H, C6-H), 7.56 (d, $J = 16.4$ Hz, 2H, H α , H α'), 7.55 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H, C2''-H, C6''-H), 6.89 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H, C3-H, C5-H), 6.63 (s, 1H, C3'''-H), 6.62 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H, C5'-H), 6.61 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H, C3''-H, C5''-H), 6.49 (s, 1H, C3'-H), 3.85 (s, 6H, OCH $_3$); $^{13}\text{C NMR}$ (100 MHz, CDCl_3), δ : 207.0 (C=O), 166.8 (C2'), 166.2 (C4'), 164.5 (C2'''), 161.3 (C4''), 159.5 (C4'''), 158.9 (C4), 142.1 (C β , β'), 134.1 (C5'''), 130.7 (C2, C6, C6'), 130.5 (C2'', C6''), 128.7 (C1), 127.9 (C1''), 123.9 (C6'''), 118.5 (C α , α'), 116.4 (C3'', C5''), 115.7 (C3, C5), 114.0 (C1'), 113.2 (C1'''), 107.5 (C5'), 100.9 (C3'), 101.9 (C3'''), 55.6 (OMe); ESI-MS m/z [M + K] $^+$: 577。

2.2 化合物的合成方法

化合物 **3** 参考文献[8]方法制备; 化合物 **4** 参考文献[10]方法制备; 化合物 **8** 和化合物 **10** 均通过羟醛缩合得到, 羟基的存在会影响到羟醛缩合反应的进行, 羟基越多反应产率越低, 甚至不反应, 故在进行羟醛缩合反应前应对羟基进行保护, MOMCl 是一种良好的羟基保护基, 耐强碱, 在酸性条件下又容易脱去, 故采用 MOMCl 为羟基保护剂; 化合物 **11** 通过 Ullmann 反应得到, 采用新的催化剂系统 (CuI、 $^n\text{Bu}_4\text{NBr}$ 、 $\text{K}_3\text{PO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 取得了很好的收率, 并且在有少量水存在时也能反应, 反应易于操作; 然后脱保护基得到目标物 Rhuschalcone I (**1**), 经 $^1\text{H NMR}$ 、 $^{13}\text{C NMR}$ 和 ESI-MS 谱表征与天然物质 Rhuschalcone I [6]一致。

3 结论

本文以常见原料为起点, 经过 9 步反应完成了 Rhuschalcone I 的合成。该路线具有步骤较少, 反应条件温和, 操作简便等特点, 有良好的实际应用前景。

参 考 文 献

- [1] Tomas W, Barberan F A, Clifford M N. Flavanones, Chalcones and Dihydrochalcones-nature, Occurrence and Dietary Burden[J]. *J Sci Food Agric*, 2000, **80**:1073-1080.
- [2] ZENG Pingli, WANG Dong, FENG Fu. Advance in Studies of the Synthesis of Chalcone[J]. *Chem Prod Technol*, 2005, **12** (3):23-28 (in Chinese).
- [3] 曾平莉, 王东, 冯馥. 查尔酮的合成应用研究进展[J]. *化工生产与技术*, 2005, **12**(3):23-28.
- [3] Hsieh H K, Lee T H, Wang J P, et al. Synthesis and Anti-inflammatory Effect of Chalcones and Related Compound[J]. *Pharm Res*, 1998, **15**:39-46.
- [4] Li Y S, Matsunaga K, Kato R, et al. Verbenachalcone, a Novel Dimeric Dihydrochalcone with Potentiating Activity on Nerve Growth Factor-Action from Verbena Littoralis[J]. *J Nat Prod*, 2001, **64**(6):806-808.
- [5] Yeh L A, Padmanaban D, Ho P, et al. Effects of a Verbenachalcone Derivative on Neurite Outgrowth, Inhibition of Caspase Induction and Gene Expression[J]. *Bioorg Med Chem Lett*, 2005, **15**(4):1193-1196.
- [6] Masesane I B, Yeboah S O, Liebscher J, et al. A Bichalcone from the Twigs of Rhus Pyroides[J]. *Phytochemistry*, 2000, **53**:1005-1008.
- [7] Mdee L K, Yeboah S O, Abegaz B M. Rhuschalcones II ~ VI, Five New Bichalcones from the Root Bark of Rhus Pyroides [J]. *J Nat Prod*, 2003, **66**(5):599-604.
- [8] LV Yaping, HE Jinheng, YANG Zhongyu. Preparation of Intermediate 2,4-Dihydroxy Acetophenone with High Yield[J]. *J*

Zhejiang Univ Technol, 2002, **30**(2):109-111 (in Chinese).

吕亚萍, 何金恒, 杨忠愚. 高收率制备中间体 2,4-二羟基苯乙酮[J]. *浙江工业大学学报*, 2002, **30**(2):109-111.

- [9] Price P, Israelstam S S. Use of Cation-Exchange Resins in Organic Reactions II. C-Acylation of Phenols[J]. *J Org Chem*, 1964, **29**(2):2800-2802.
- [10] YANG Jinhui, MENG Lichong. First Total Synthesis of 2',4-Dihydroxy-4',6'-dimethoxydihydrochalcone[J]. *Chinese J Synth Chem*, 2007, **15**(6):740-743 (in Chinese).
- 杨金会, 孟丽聪. 2',4-二羟基-4',6'-二甲氧基-二氢查尔酮的首次全合成[J]. *合成化学*, 2007, **15**(6):740-743.
- [11] YU Mingxing, SHAO Zonglong, DAI Mei, et al. Synthesis 2-Hydroxy-4-Methoxy Acetophenone by Phase Transfer Catalyst [J]. *Anhui Chem Ind*, 1998, **24**(5):22-23 (in Chinese).
- 俞明兴, 邵宗龙, 戴玫, 等. 相转移催化合成 2-羟基-4-甲氧基苯乙酮[J]. *安徽化工*, 1998, **24**(5):22-23.
- [12] YANG Jinhui, LI Ying, XUE Jijun, et al. Studies on Flavans (II)——Total Synthesis of 4'-Hydroxy-5,7,3'-trimethoxyflavan and 5,4'-Dihydroxy-7,3'-dimethoxy Flavan [J]. *Chem J Chinese Univ*, 2002, **23**(2):234-237 (in Chinese).
- 杨金会, 李瀛, 薛吉军, 等. 黄烷类化合物研究(II)——(±)-4'-羟基-5,7,3'-三甲氧基黄烷和(±)-5,4'-二羟基-7,3'-二甲氧基黄烷的全合成[J]. *高等学校化学学报*, 2002, **23**(2):234-237
- [13] ZHANG Yingpeng, LI Ying, XUE Jijun, et al. Total Syntheses of (±)-3,5-Dihydroxy-7,4'-dimethoxy-dihydroflavonol and (±)-3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxy-dihydroflavonol [J]. *Chem J Chinese Univ*, 2004, **25**(2):292-293 (in Chinese).
- 张应鹏, 李瀛, 薛吉军, 等. (±)-3,5-二羟基-7,4'-二甲氧基二氢黄酮醇和(±)-3,5,7-三羟基-4'-甲氧基二氢黄酮醇的全合成[J]. *高等学校化学学报*, 2004, **25**(2):292-293.
- [14] XING Ye, XIE Zhengfeng, LIU Fangming. Synthesis and Crystal Structure of 1,5'-Benzothiazepine Derivatives Containing Pyrazole [J]. *Chem J Chinese Univ*, 2008, **29**(3):533-536 (in Chinese).
- 邢焯, 谢正峰, 刘方明. 含吡嗪基的 1,5-苯并硫氮杂革衍生物的合成及晶体结构[J]. *高等学校化学学报*, 2008, **29**(3):533-536.
- [15] Chang J W W, Chee S, Mak S, et al. Copper-catalyzed Ullmann Coupling under Ligand- and Additive-free Conditions. Part 1: *O*-Arylation of Phenols with Aryl Halides [J]. *Tetrahedron Lett*, 2008, **49**:2018-2022.
- [16] YANG Jinhui, ZHAO Yanmin, JI Congbin. First Total Synthesis of (±)-Abyssinoflavanone V [J]. *J Ningxia Univ*, 2008, **29**(6):154-156 (in Chinese).
- 杨金会, 赵艳敏, 计从斌. (±)-Abyssinoflavanone V 的首次全合成[J]. *宁夏大学学报*, 2008, **29**(6):154-156.

The Synthesis of Bichalcone Rhuschalcone I

ZHANG Yingpeng*, CHEN Yutao, YANG Yunshang, GUAN Xiao

(*Institute of Organic & Pharmaceutical Chemistry, School of Petrochemical Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050*)

Abstract Rhuschalcone I was adopted to two synthetic fragments, compound **8** and compound **10**, then the two fragments were combined together. Rhuschalcone I were first synthesized by selective methylation, iodination, methoxymethylation, aldol condensation, Ullmann reaction, deprotection from *m*-dihydroxybenzene and *p*-hydroxybenzaldehyde. The chemical structures of the key intermediate and the final target product were verified by ¹H NMR, ¹³C NMR and ESI-MS.

Keywords Rhuschalcone I, ullmann reaction, total synthesis, aldol condensation