带有限 L^p 函数的一个刻画及其应用

献给陆善镇教授 75 华诞

郭紫华*, 彭立中

北京大学数学科学学院, 北京 100871

E-mail: zihuaguo@math.pku.edu.cn, lzpeng@pku.edu.cn

收稿日期: 2013-09-21; 接受日期: 2013-11-22; * 通信作者

国家自然科学基金 (批准号: 11271023, 11371037 和 10990012) 资助项目

摘要 利用 Shannon-Nyquist 采样定理的思想, 本文给出带有限 L^p 函数类的一个刻画, 并且利用这个刻画得到 Schrödinger 方程的若干估计, 如 Strichartz 型和倒时空 Strichartz 估计等, 同时也给出若干已知估计的简单证明.

关键词 带有限函数 采样定理 Schrödinger 方程

MSC (2010) 主题分类 42B10, 42B35

1 引言

$L^p(\mathbb{R}^n)$ 函数类在现代分析中起着十分基础的作用, 它是指满足如下条件的函数全体: f 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 可测函数, 且使得

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} < \infty, \quad 1 \leq p < \infty,$$

以及 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 表示本性有界的函数全体. 令 $B_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}$, 本文考虑一类带有限 (即 Fourier 变换有紧支集) L^p 函数的刻画, 记为 $\mathcal{L}^p$, $1 \leq p \leq \infty$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n) &= \{f \in L^p(\mathbb{R}^n) : \text{supp } \hat{f} \subset B_2\}, \quad 1 \leq p < \infty, \\ \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n) &= \left\{ f \in L^\infty(\mathbb{R}^n) : \text{supp } \hat{f} \subset B_2, \lim_{|x| \rightarrow \infty} f = 0 \right\}, \end{aligned}$$

其中 $\hat{f}$ 表示 f 的 Fourier 变换:

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}f = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

对于 $f \notin L^1(\mathbb{R}^n)$, $\hat{f}$ 以及 $\hat{f}$ 的支集均是按缓增分布的意义来定义的. 值得注意的是, 由于 Fourier 变换具有紧支集, 所有的 $\mathcal{L}^p$ 函数事实上都是光滑的. 关于 Fourier 变换的分布理论, 参见文献 [1].

下面先来阐述本文得到的主要结果. 固定一个非负光滑且径向递减的函数 η 使其满足:

$$(1) \text{supp } \eta \subset \{\xi \in \mathbb{R}^n : |\xi| \leq 3\};$$

(2) $\eta(\xi) \equiv 1$, 若 $|\xi| \leq 2$.

定义 Fourier 乘子算子 $\Delta_0 f = \mathcal{F}^{-1}[f(\xi)\eta(\xi)]$. 假设 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且满足: 存在 $A > 0, \varepsilon > 0$, 使得

$$|\varphi(x)| \leq A(1 + |x|)^{-n-\varepsilon} \quad \text{且} \quad \eta \cdot \widehat{\varphi}^{-1} \text{ 光滑.} \quad (1.1)$$

一个典型的例子是 $\varphi = e^{-\frac{|x|^2}{2}}$. 本文的主要结果如下:

定理 1 设 φ 是给定的满足 (1.1) 的函数, $1 \leq p \leq \infty$, 且设 $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, 则存在一个序列 $\{c_l\} \in l^p(\mathbb{Z}^n)$ (且当 $p = \infty$ 时, $\lim_{|l| \rightarrow \infty} c_l = 0$) 使得 $f(x) = \Delta_0[\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l \varphi(x-l)]$, 在 L^p 中收敛. 进一步, 存在常数 $C > c > 0$ 与 f 无关, 使得 $c\|\{c_l\}\|_{l^p} \leq \|f\|_{L^p} \leq C\|\{c_l\}\|_{l^p}$.

定理 1 中的 $\{c_l\}$ 不是唯一的, 有无穷多种选取办法, 我们稍后将在证明中明确说明. 本文的动机主要是源自如下几个方面:

(1) 在调和分析与色散偏微分方程 (PDE) 的研究中, 频率分解 (如 Littlewood-Paley 二进制分解和单位分解) 是十分基本的工具. 利用频率分解结合某些对称性, 很多重要的估计和不等式可以归结为所考虑的函数为带有限的情形, 如 Strichartz 估计和光滑效应估计等.

(2) Shannon-Nyquist 采样定理. 关于带有限函数有一个著名的采样定理: 若 f 是带有限的, 则 f 可以被 f 在可数个点的取值重构, 只要采样点足够密. 定理 1 可以看成是采样定理的“推广”, 只是这时 c_l 不是简单的 f 在某些点的取值, 而是由 f 确定的值.

(3) 一些函数空间的离散刻画. 在时频分析领域, 对于函数空间有多种离散刻画, 如利用小波来刻画 Besov 空间和利用 Gabor 框架来刻画模空间等. 带有限的函数均属于这两种类型的空间, 定理 1 相当于给出了带有限情形下简单的刻画, 并利用平移和伸缩变换可以得到一般函数的刻画, 这在应用时通常能带来方便.

在第 3 节, 我们将利用定理 1 给出 Schrödinger 方程的若干估计.

2 主要结论

本节给出定理 1 的证明以及利用它得出若干推论. 证明的想法是借鉴于 Shannon-Nyquist 采样定理的证明, 即利用带有限的条件, 然后借助 Fourier 级数展开得到离散的表达式.

令 $Q = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^n$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的单位方块. 对 $k \in \mathbb{Z}^n$, 令 $Q_k = k + Q$ (即以 k 为中心的单位方块). 用 $A \lesssim B$ 表示存在一个常数 $C > 0$ 使得 $A \leq CB$.

引理 2 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且存在 $A, \varepsilon > 0$ 使得 $|f(x)| \leq A(1 + |x|)^{-n-\varepsilon}$, 则

(1) 若 $1 \leq q \leq r$, 对任意 $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$,

$$\left\| \int_{\mathbb{R}^n} g(x)f(k-x)dx \right\|_{l^r(\mathbb{Z}^n)} \leq C\|g\|_{L^q};$$

(2) 若 $1 \leq q \leq r$, 对任意 $\{c_k\} \in l^q(\mathbb{Z}^n)$,

$$\left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k f(x-k) \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq C\|\{c_k\}\|_{l^q}.$$

证明 首先证 (1). 任意给定一个序列 $\{c_k\}$, 定义函数 $h(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k 1_{Q_k}(x)$, 则显然有 $\|h\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \|\{c_k\}\|_{l^q}$. 因此可得

$$\left\| \int_{\mathbb{R}^n} g(x)f(k-x)dx \right\|_{l^r(\mathbb{Z}^n)} \lesssim \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|1_{Q_k}(x)\langle k-y \rangle^{-n-\varepsilon} dy \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}$$

$$\lesssim \left\| \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \cdot \langle x - y \rangle^{-n-\varepsilon} dy \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|g\|_{L^q}.$$

对于 (2), 类似可得

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k f(x - k) \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} &\lesssim \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k \int_{Q_k} \langle x - k \rangle^{-n-1} dy \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \\ &\lesssim \left\| \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k 1_{Q_k}(y) \langle x - y \rangle^{-n-\varepsilon} dy \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \\ &\lesssim \|\{c_k\}\|_{l^q}. \end{aligned}$$

因此引理得证. □

在定理的证明中, 我们将利用 Fourier 级数的分布理论^[1]. 用 $\mathbb{T}^n$ 表示环 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$, $D(\mathbb{T}^n)$ 表示 $\mathbb{T}^n$ 上的光滑函数, $D'(\mathbb{T}^n)$ 表示其上分布 (称为周期分布). 类似于 Fourier 变换的分布理论, 有下面的引理:

引理 3 任意 $f \in D'(\mathbb{T}^n)$, 则

$$f = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k e^{ikx},$$

其中 $c_k = \frac{1}{(2\pi)^n} \langle f, e^{-ikx} \rangle$, 级数在 $D'(\mathbb{T}^n)$ 的意义下收敛.

定理 1 的证明 由于 $\eta\hat{\varphi}^{-1} \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 令 $\chi = \mathcal{F}^{-1}(\eta\hat{\varphi}^{-1})$. 定义 $g(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{\chi}(\xi)$. 则 g 是一个缓增分布, 且具有紧支集包含于 $(-\pi, \pi)^n$. 现在将 g 按各个变量作 2π 周期延拓, 仍记为 g , 则 $g \in D'(\mathbb{T}^n)$, 从而, 利用引理 3 可得

$$g(\xi) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l e^{il\xi}, \quad \text{在 } D'(\mathbb{T}^n) \text{ 的意义下,}$$

其中

$$c_l = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{T}^n} g(\xi) e^{-il\xi} d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi)\hat{\chi}(\xi) e^{-il\xi} d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \chi * f(-l).$$

利用引理 2(1), 可得 $\{c_l\} \in l^p(\mathbb{Z}^n)$ 且 $\|\{c_l\}\|_{l^p} \lesssim \|f\|_{L^p}$.

接着, 利用 g 的紧支集性质, 且 η 的支集包含于 $(-\pi, \pi)^n$ 可知,

$$\eta(\xi)g(\xi) = \eta(\xi) \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l e^{il\xi}, \quad \text{在 } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \text{ 的意义下.}$$

从而得 $\hat{f}(\xi) = \eta(\xi)g(\xi)\hat{\varphi}$, 于是, 在缓增分布的 Fourier 变换意义下有

$$f = \mathcal{F}^{-1}[\eta(\xi)g(\xi)\hat{\varphi}] = \mathcal{F}^{-1} \left[\eta(\xi) \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l e^{il\xi} \hat{\varphi} \right] = \Delta_0 \left[\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l \varphi(x - l) \right]. \quad (2.1)$$

由 $\{c_l\} \in l^p$ 知, (2.1) 右端级数事实上在 L^p 中收敛. 再由引理 2(2) 可得 $\|f\|_{L^p} \lesssim \|\{c_l\}\|_{l^p}$.

这样的 $\{c_l\}$ 是不唯一的. 因为 g 的支集包含于球 $\{|x| \leq 3\}$, 可以选取一个光滑截断函数 $\tilde{\eta}$, 使其支集包含于球 $\{3 < |x| < \pi\}$. 这样令 $\tilde{g} = g + \|f\|_p \tilde{\eta}$. 在证明中, 用 $\tilde{g}$ 代替 g , 也可以得到一族 $\{\tilde{c}_l\}$ 满足要求, 但显然不同于 $\{c_l\}$. □

我们给出 φ 的几个例子. 定理 1 可以看成是采样定理的推广, 若形式地取 $\varphi(x) = \frac{\sin \pi x}{x}$ (此时不满足定理的条件), 则回到了采样定理. 在应用中, 可以有如下几个常见的取法:

(1) φ 为截断函数, $\varphi(x) = \chi_Q(x)$, 其中 $Q = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^n$. 此时, $\hat{\varphi}(\xi) = \frac{\sin 2\xi}{\xi}$, 则显然满足定理的条件.

(2) φ 为光滑截断函数, 如 $\varphi(x) = \eta^2(x)$. 此时, $\widehat{\varphi}(\xi) = \widehat{\eta} * \widehat{\eta}$, 满足定理的条件.

(3) $\varphi(x) = e^{-|x|^2/2}$, 此时, $\widehat{\varphi}(\xi) = e^{-|\xi|^2/2}$, 如 $\varphi(x) = e^{-|x|}$ 等都满足定理的条件.

例如, 我们将取 $\varphi(x) = e^{-|x|^2/2}$ 来研究 Schrödinger 方程的相关估计. 在这个选取下, Schrödinger 方程的解有非常明确简单的表达式, 这点是受 Gabor 框架启发的, 关于 Gabor 框架应用到 Schrödinger 方程可参见文献 [2]. 另一方面, 在很多的估计中, 由于算子 Δ_0 具有非常好的性质, 而通常可以丢掉, 从而只需考虑如下形式的函数:

$$f(x) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l \varphi(x - l).$$

这样的函数同样具有很好的频率局部化性质, 故没有丢掉太多的信息.

接下来, 我们利用伸缩和平移变换, 给出具有一般频率支集的带有限 L^p 函数的刻画. 对 $k \in \mathbb{Z}$, 定义 $\Delta_k = \mathcal{F}^{-1} \eta(\xi/2^k) \mathcal{F}$; 对 $j \in \mathbb{Z}^n$, 定义 $\square_k = \mathcal{F}^{-1} \eta(\xi - j) \mathcal{F}$.

推论 4 设 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ (当 $p = \infty$ 时, 假设 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f = 0$), φ 是给定的满足 (1.1) 的函数, 则

(1) 若存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得 $\text{supp } \widehat{f} \subset \{|\xi| \sim 2^k\}$, 则存在 $\{c_l\} \in l^p(\mathbb{Z}^n)$ (当 $p = \infty$ 时, 有 $\lim_{|l| \rightarrow \infty} c_l = 0$) 使得

$$f(x) = \Delta_k \left[\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l 2^{kn/p} \varphi(2^k x - l) \right], \quad \text{在 } L^p \text{ 中收敛.}$$

进一步, 存在常数 $c, C > 0$ 与 f 无关, 使得

$$c \|\{c_l\}\|_{l^p} \leq \|f\|_{L^p} \leq C \|\{c_l\}\|_{l^p}.$$

(2) 若存在 $k \in \mathbb{Z}^n$, 使得 $\text{supp } \widehat{f} \subset k + Q$, 则存在 $\{c_l\} \in l^p(\mathbb{Z}^n)$ (当 $p = \infty$ 时, 有 $\lim_{|l| \rightarrow \infty} c_l = 0$) 使得

$$f(x) = \square_k \left[\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l e^{ikx} \varphi(x - l) \right], \quad \text{在 } L^p \text{ 中收敛.}$$

进一步, 存在常数 $c, C > 0$ 与 f 无关, 使得

$$c \|\{c_l\}\|_{l^p} \leq \|f\|_{L^p} \leq C \|\{c_l\}\|_{l^p}.$$

证明 对于 (1), 令 $\tilde{f} = 2^{-kn/p} f(2^{-k}x)$, 则 $\tilde{f} \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|\tilde{f}\|_p \sim \|f\|_p$. 对 $\tilde{f}$ 应用定理 1 可知, 存在 $\{c_l\}$ 使得

$$\tilde{f}(x) = \Delta_0 \left[\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l \varphi(x - l) \right].$$

再作伸缩变换即得. 类似地, 对于 (2), 令 $g = e^{-ikx} f(x)$, 则 $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|g\|_p \sim \|f\|_p$. 对 g 应用定理 1 再作频率平移变换即得. $\square$

3 若干应用

本节取 $\varphi(x) = e^{-|x|^2/2}$, 然后用定理 1 来回顾 Schrödinger 方程的解的相关估计. 用这个刻画的优势是, Schrödinger 方程的解有一个简单的表达式. 考虑 (非椭圆型) Schrödinger 方程

$$i u_t + \Delta_{\pm} u = g, \quad u(0) = f,$$

其中 $\Delta_{\pm} = \varepsilon_1 \partial_{x_1}^2 + \dots + \varepsilon_n \partial_{x_n}^2$, $\varepsilon_i \in \{-1, 1\}$, $i = 1, \dots, n$, 则

$$u = e^{it\Delta_{\pm}} f - i \int_0^t e^{i(t-s)\Delta_{\pm}} g(s) ds.$$

通过直接的计算^[2], 可得如下引理:

引理 5 设 $k \in \mathbb{Z}^n$, $f(x) = \square_k [\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l e^{ikx} e^{-|x-l|^2/2}]$, 则

$$e^{it\Delta_{\pm}} f = \square_k \left[\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l e^{ikx} e^{it|k|_{\pm}^2} \prod_{j=1}^n \frac{e^{-\frac{|x_j-l_j+2t\varepsilon_j k_j|^2}{2(1-2i\varepsilon_j t)}}}{(1-2i\varepsilon_j t)^{1/2}} \right]. \tag{3.1}$$

特别地, 当 $k = (0, \dots, 0)$ 时,

$$e^{it\Delta_{\pm}} f = \Delta_0 \left[\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l \prod_{j=1}^n \frac{e^{-\frac{|x_j-l_j|^2}{2(1-2i\varepsilon_j t)}}}{(1-2i\varepsilon_j t)^{1/2}} \right].$$

下面考虑 Schrödinger 方程的几个基本估计. 首先重新得到一个 Schrödinger 半群在带有限的 L^p 中的有界性, 这个结果最早由文献 [3] 得到下面的引理:

引理 6 设 $1 \leq p \leq \infty$, 则

$$\|e^{it\Delta_{\pm}} \square_k f\|_{L_x^p} \lesssim (1+|t|)^{n(1/2-1/p)} \|\square_k f\|_p. \tag{3.2}$$

证明 $p = 2$ 显然. 由对偶和插值, 只需再考虑 $p = 1$. 由推论 4 和引理 5, 只需证明

$$\left\| \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l e^{ikx} e^{it|k|_{\pm}^2} \prod_{j=1}^n \frac{e^{-\frac{|x_j-l_j+2t\varepsilon_j k_j|^2}{2(1-2i\varepsilon_j t)}}}{(1-2i\varepsilon_j t)^{1/2}} \right\|_{L_x^1} \lesssim (1+|t|)^{n(1/2-1/p)} \|\{c_l\}\|_{l^1}. \tag{3.3}$$

事实上,

$$(3.3) \text{ 的左边} \lesssim \left\| \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} |c_l| (1+|t|)^{-n/2} \prod_{j=1}^n e^{-\frac{|x_j-l_j+2t\varepsilon_j k_j|^2}{2(1+4t^2)}} \right\|_{L_x^1} \lesssim (1+|t|)^{n/2} \|\{c_l\}\|_{l^1}.$$

引理得证. □

3.1 Strichartz 型估计

在非线性 Schrödinger 方程的研究中, Strichartz 估计起着十分基础的作用. 它们是指如下齐次和非齐次的时空估计:

$$\|e^{it\Delta_{\pm}} f\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|f\|_2, \tag{3.4}$$

$$\left\| \int_0^t e^{i(t-s)\Delta_{\pm}} g(s) ds \right\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|g\|_{L_t^{q'} L_x^{r'}}, \tag{3.5}$$

其中 p' 表示共轭数 $p' = \frac{p}{p-1}$. 现在知道 (3.4) 成立的最佳范围是可容许条件, 即 (q, r) 满足

$$2 \leq q, r \leq \infty, \quad \frac{2}{q} + \frac{d}{r} = \frac{d}{2}, \quad (q, r, d) \neq (2, \infty, 2). \tag{3.6}$$

当 (q, r) 和 $(\tilde{q}, \tilde{r})$ 均满足 (3.6) 时, (3.5) 成立, 但是 (3.5) 成立的最佳范围至今还是一个具有挑战性的公开问题, 关于 Strichartz 估计可参见文献 [4].

我们现在用引理 5 得到如下的命题:

命题 7 设 $k \in \mathbb{Z}, j \in \mathbb{Z}^n, (q, r)$ 满足 $1 \leq q, r \leq \infty, \frac{1}{q} < n(\frac{1}{2} - \frac{1}{r})$. 则

$$\|e^{it\Delta_\pm} \Delta_k f\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim 2^{k(n - \frac{n}{r} - \frac{2}{q})} \|\Delta_k f\|_1, \quad \|e^{it\Delta_\pm} \square_j f\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|\square_j f\|_1. \quad (3.7)$$

证明 先看第一个估计. 因为 $e^{it\Delta_\pm} \Delta_k f = e^{i2^{2k}t\Delta_\pm} \Delta_0 \tilde{f}_k(2^k x)$, 其中 $\tilde{f}_k = \mathcal{F}^{-1} 2^{kn} \hat{f}(2^k x)$. 由伸缩变换不变性, 可以假设 $k = 0$. 由推论 4 和引理 5, 只需证明

$$\left\| \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l \prod_{j=1}^n \frac{e^{-\frac{|x_j - l_j|^2}{2(1-2i\varepsilon_j t)}}}{(1-2i\varepsilon_j t)^{1/2}} \right\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|\{c_l\}\|_1. \quad (3.8)$$

事实上,

$$(3.8) \text{ 的左边} \lesssim \left\| \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} |c_l| (1+|t|)^{-n/2} e^{-\frac{|x-l|^2}{2(1+4t^2)}} \right\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|\{c_l\}\|_1.$$

第二个估计类似可得. □

注 8 在上面的命题中, 我们假设了 $f \in L^1$. 在这个假设下, 由 (3.1) 给出的表达式不需要考虑振荡性就能得到最佳的估计, 因为可以假设 c_l 只取值在某个 l_0 . 根据振荡积分可知, 当 $1 \ll |x| \lesssim |t|$ 时,

$$\left| \int e^{it|\xi|^2} e^{ix\xi} \eta(\xi) d\xi \right| \sim |t|^{-n/2},$$

从而, $\int e^{it|\xi|^2} e^{ix\xi} \eta(\xi) d\xi \in L_t^q L_x^r(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ 当且仅当 $\frac{1}{q} < n(\frac{1}{2} - \frac{1}{r})$, 这说明上述命题关于 (q, r) 的范围是最佳的.

当 $f \notin L^1$ 时, 我们还需要开发 (3.1) 中的振荡性, 这是以后思考的一个问题. 在二进制分解情形, 我们可以借助伸缩不变性, 结合经典的 Strichartz 估计, 利用插值定理, 可以得到更多的最佳估计. 但在方块分解情形, 这样做会损失正则性, 似乎只能带着频率指标 j .

注 9 利用 Littlewood-Paley 二进制分解、伸缩不变性和 Minkowski 不等式可知, 要考虑 (3.5), 可以先考虑频率局部化的情形

$$\left\| \int_0^t e^{i(t-s)\Delta_\pm} \Delta_0 g(s) ds \right\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|g\|_{L_t^{\tilde{q}'} L_x^{\tilde{r}'}}. \quad (3.9)$$

对 $\Delta_0 g$ 使用引理 3, (3.9) 进一步等价于

$$\left\| \int_0^t \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l(s) \prod_{j=1}^n \frac{e^{-\frac{|x_j - l_j|^2}{2(1-2i\varepsilon_j(t-s))}}}{(1-2i\varepsilon_j(t-s))^{1/2}} ds \right\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|\{c_l(t)\}\|_{L_t^{\tilde{q}'} L_x^{\tilde{r}'}}. \quad (3.10)$$

例如, 如果取 $\tilde{r} = \infty$, 很容易验证, 当 $1 \leq q, \tilde{q}, r \leq \infty, \frac{1}{q} + \frac{1}{\tilde{q}} < \frac{n}{2} - \frac{n}{r}$ 时, 有

$$\left\| \int_0^t e^{i(t-s)\Delta_\pm} \Delta_0 g(s) ds \right\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|g\|_{L_t^{\tilde{q}'} L_x^1}. \quad (3.11)$$

我们期望利用离散的形式, 对非齐次的 Strichartz 估计能有帮助.

3.2 光滑效应与极大函数估计

接下来考虑另外一类估计: 光滑效应估计, 或者称为倒时空估计. 这类估计在处理非线性项含有导数时非常有用. 用 $L_x^q L_t^r$ 和 $L_{x_i}^q L_{x_i, t}^r$ 分别表示具有如下范数的 Banach 空间:

$$\|f\|_{L_x^q L_t^r} = \| \|f(\cdot, x)\|_{L_t^r} \|_{L_x^q}, \quad \|f\|_{L_{x_i}^q L_{x_i, t}^r} = \| \|f(\cdot, \dots, x_i, \dots)\|_{L_{x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n, t}^r} \|_{L_{x_i}^q}.$$

假设初始值 f 在 Sobolev 空间 $\dot{H}^s$ 中, 文献 [5] 得到了 $e^{it\Delta}f$ 的倒时空 $L_x^q L_t^r$ 估计的最佳范围. 我们可以得到初值在 L^1 中的一些新的估计.

命题 10 设 $k \in \mathbb{Z}$, $1 \leq q, r \leq \infty$, $q > 2/n$, $1/q < n(1/2 - 1/r)$, 则

$$\|e^{it\Delta \pm} \Delta_k f\|_{L_x^r L_t^q} \lesssim 2^{k(n - \frac{n}{r} - \frac{2}{q})} \|\Delta_k f\|_1. \tag{3.12}$$

证明 由伸缩变换不变性, 可以假设 $k = 0$. 由推论 4 和引理 5, 只需证明

$$\left\| \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} c_l \prod_{j=1}^n \frac{e^{-\frac{|x_j - l_j|^2}{2(1 - 2i\varepsilon_j t)}}}{(1 - 2i\varepsilon_j t)^{1/2}} \right\|_{L_x^r L_t^q} \lesssim \|\{c_l\}\|_{l^1}. \tag{3.13}$$

事实上,

$$(3.13) \text{ 的左边} \lesssim \left\| \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} |c_l| (1 + |t|)^{-n/2} e^{-\frac{|x-l|^2}{2(1+4t^2)}} \right\|_{L_x^r L_t^q}.$$

从而只要证

$$\|(1 + |t|)^{-n/2} e^{-\frac{|x-l|^2}{2(1+4t^2)}}\|_{L_x^r L_t^q} \lesssim 1$$

关于 $l \in \mathbb{Z}^n$ 一致成立.

将上式左边分解成三个区域 A_i 的部分, 记为 I_i , $i = 1, 2, 3$, 其中 $A_1 = \{|x - l| \lesssim 1\}$, $A_2 = \{1 \lesssim |x - l| \lesssim 1 + |t|\}$, $A_3 = \{|x - l| \gtrsim 1 + |t|\}$. 首先, 显然只要 $q > 2/n$, 则 $I_1 \lesssim 1$. 再来看 I_2 和 I_3 . 当 $q > 2/n$, $1/q < n(1/2 - 1/r)$,

$$\begin{aligned} I_2 &\lesssim \| |t|^{-n/2} \chi_{A_2}(x, t) \|_{L_x^r L_t^q} \lesssim \| |x - l|^{1/q - n/2} \|_{L_x^r} \lesssim 1, \\ I_3 &\lesssim \left\| |t|^{-n/2} \chi_{A_3}(x, t) \left(\frac{|x - l|}{1 + |t|} \right)^{-100} \right\|_{L_t^q} \| \cdot \|_{L_x^r} \lesssim \| |x - l|^{1/q - n/2} \|_{L_x^r} \lesssim 1. \end{aligned}$$

命题得证. □

接下来看各向异性的时空范数估计. 下面这个命题的结论首先由文献 [2] 证明, 在文献 [2] 中关于非线性方程的研究起着关键的作用, 我们这里给出一个相对简单的证明.

命题 11 设 $1 \leq q, r \leq \infty$, $\frac{1}{r} < n(\frac{1}{2} - \frac{1}{q})$, $j \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}^n$, 则

$$\|e^{it\Delta \pm} \Delta_j f\|_{L_{x_1}^r L_{\bar{x}_1, t}^q} \lesssim 2^{j(n - \frac{n+1}{q} - \frac{1}{r})} \|\Delta_j f\|_1, \quad \|e^{it\Delta \pm} \square_k f\|_{L_{x_1}^r L_{\bar{x}_1, t}^q} \lesssim (1 + |k_1|)^{1/2} \|\square_k f\|_1. \tag{3.14}$$

证明 对于第一个估计, 由伸缩不变性, 不妨设 $j = 0$, 这对应于第二个估计 $k = (0, \dots, 0)$ 的情形, 因此只要证明第二个估计. 由推论 4 和引理 5, 只需证明

$$\left\| \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} |c_l| (1 + |t|)^{-n/2} \prod_{j=1}^n e^{-\frac{|x_j - l_j + 2t\varepsilon_j k_j|^2}{2(1 + 4t^2)}} \right\|_{L_{x_1}^r L_{\bar{x}_1, t}^q} \lesssim \|\{c_l\}\|_{l^1}. \tag{3.15}$$

进一步, 只需要证

$$\|(1 + |t|)^{\frac{n-1}{q} - \frac{n}{2}} e^{-\frac{|x_1 + 2t\varepsilon_1 k_1|^2}{2(1 + 4t^2)}}\|_{L_{x_1}^r L_t^q} \lesssim (1 + |k_1|)^{1/r}. \tag{3.16}$$

情形 1 $k_1 = 0$. 只要证

$$\|(1 + |t|)^{\frac{n-1}{q} - \frac{n}{2}} e^{-\frac{|x_1|^2}{2(1 + 4t^2)}}\|_{L_{x_1}^r L_t^q} \lesssim 1.$$

将被积函数分解成 $|x| \lesssim |t|$ 和 $|x| \gtrsim |t|$ 两部分, 易得当 $\frac{1}{r} < n(\frac{1}{2} - \frac{1}{q})$ 时, 上式成立.

情形 2 $k_1 \neq 0$. 分解成三部分

$$\begin{aligned} (1 + |t|)^{\frac{n-1}{q} - \frac{n}{2}} e^{-\frac{|x_1 + 2\varepsilon_1 k_1 t|^2}{2(1+4t^2)}} &\lesssim (1 + |t|)^{\frac{n-1}{q} - \frac{n}{2}} \chi_{|x_1| \lesssim |k_1|} + (1 + |t|)^{\frac{n-1}{q} - \frac{n}{2}} \chi_{|k_1| \lesssim |x_1| \lesssim |t||k_1|} \\ &\quad + (1 + |t|)^{\frac{n-1}{q} - \frac{n}{2}} \chi_{|x_1| \gg |t||k_1|} e^{-\frac{|x_1|^2}{2(1+4t^2)}} \\ &=: I + II + III. \end{aligned}$$

对 I 和 II 显然有, 当 $\frac{1}{r} < n(\frac{1}{2} - \frac{1}{q})$ 时, $\|I\|_{L_{x_1}^r L_t^q} + \|II\|_{L_{x_1}^r L_t^q} \lesssim (1 + |k_1|)^{1/r}$. 对于 III 有

$$III \lesssim |t|^{\frac{n-1}{q} - \frac{n}{2}} \chi_{|x_1| \gg |t||k_1|} |x_1|^{-M} |t|^M,$$

从而可知, 当 $\frac{1}{r} < n(\frac{1}{2} - \frac{1}{q})$ 时, $\|III\|_{L_{x_1}^r L_t^q} \lesssim (1 + |k_1|)^{1/r}$. $\square$

参考文献

- 1 Schwartz L. Théorie des Distributions. Paris: Hermann, 1957
- 2 Wang B. Sharp global well-posedness for non-elliptic derivative Schrödinger equations with small rough data. ArXiv:1012.0370
- 3 Gröchenig K, Heil C. Modulation spaces and pseudodifferential operators. Integral Equations Operator Theory, 1999, 34: 439–457
- 4 Keel M, Tao T. Endpoint Strichartz estimates. Amer J Math, 1998, 120: 955–980
- 5 Lee S, Rogers K, Vargas A. An endpoint space-time estimate for the Schrödinger equation. Adv Math, 2011, 226: 4266–4285

A characterization of band-limited L^p function and its applications

GUO ZiHua & PENG LiZhong

Abstract Using the ideas of Shannon-Nyquist sampling theorem, we give a characterization for the band-limited L^p functions. As applications, we obtain some new estimates for the Schrödinger equation such as Strichartz type estimate and reverse Strichartz type estimate, and simple proof for some known estimates.

Keywords band-limited function, sampling theorem, Schrödinger equation

MSC(2010) 42B10, 42B35

doi: 10.1360/N012013-00141