DOI: 10.3724/SP.J.1006.2021.04105

花生油脂合成相关基因的表达谱分析

许 静^{1,**} 潘丽娟^{1,**} 李昊远² 王 通¹ 陈 娜¹ 陈明娜¹ 王 冕¹
禹山林¹ 侯艳华^{2,*} 迟晓元^{1,*}

¹ 山东省花生研究所, 山东青岛 266100; ² 哈尔滨工业大学(威海)海洋科学与技术学院, 山东威海 264209

摘 要: 为研究不同发育时期花生籽仁油脂合成过程中基因表达调控模式, 本研究以高油酸、中油花生品系 F18 和低油酸、低油花生品种 ‘鲁花 6 号’ 为材料, 对下针后 10、30、40、60 DAP (days after pegging) 的花生种子进行表达谱芯片测序。结果表明, 130、3556、2783 个基因分别在 30、40、60 DAP 时期差异表达。GO 注释和 KEGG 富集结果显示, 差异表达的基因主要富集在脂肪酸合成和光合等代谢进程中, 其中 *FAB2*、*FAD2*、*WRII* 等主要参与油酸的积累, 参与光合作用的基因均为捕光叶绿素 *a/b* 结合蛋白, 全部上调表达。代谢通路图结果表明, 籽仁发育的 40 DAP 和 60 DAP 时期, 脂肪酸合成途径的基因均上调表达。研究结果为花生油脂代谢的分子机制提供理论基础, 同时也为花生品质改良贡献了基因资源。

关键词: 花生; 基因芯片; 差异表达分析; 油脂合成相关基因

Expression pattern analysis of genes related to lipid synthesis in peanut

XU Jing^{1,**}, PAN Li-Juan^{1,**}, LI Hao-Yuan², WANG Tong¹, CHEN Na¹, CHEN Ming-Na¹, WANG Mian¹,
YU Shan-Lin¹, HOU Yan-Hua^{2,*}, and CHI Xiao-Yuan^{1,*}

¹ Shandong Peanut Research Institute, Qingdao 266100, Shandong, China; ² School of Marine and Technology, Harbin Institute of Technology, Weihai 264209, Shandong, China

Abstract: In order to survey the regulation patterns of genes expression in the synthesis of oil at different developmental stages in peanut seed, F18 (high-oleic medium oil peanut variety) and ‘Luhua 6’ (low-oleic acid low oil variety) were used as research materials. The expression pattern analysis of genes was performed for peanut seeds on the 10, 30, 40, and 60 DAP, respectively. The results indicated that 130, 3556, and 2783 genes were significantly differentially expressed in the two varieties (lines) on the 30, 40, and 60 DAP, respectively. GO annotation and KEGG enrichment showed that DEGs were mainly enriched in the fatty acid synthesis and photosynthetic pathways, such as *FAB2*, *FAD2*, *WRII* genes, which were involved in the accumulation of oleic acid. All the genes involved in photosynthesis pathway were photochlorophyll binding proteins and all of them were up-regulated. KEGG pathway indicated that all the genes involved in fatty acid biosynthesis pathway on the 40 DAP and 60 DAP were up-regulated. In summary, these results provide a theoretical basis for molecular study of fatty acid synthesis in the development stage of peanut seeds and offer some candidate genes as gene resources of quality improvement in peanut breeding.

Keywords: peanut; microarray; differentially expressed genes; genes involved in lipid synthesis

本研究由国家现代农业产业技术体系(花生)建设专项(CARS-13), 青岛市科技惠民示范引导专项(20-3-4-26-nsh), 山东省农业科学院农业科技创新工程(CXGC2016B02, CXGC2018E21), 山东省重大科技创新工程项目(2019JZZY010702), 广东省重点领域研发计划项目(2020B020219003), 山东省良种工程(2017LZGC003), 临沂市重点研发计划项目(2019YD009)和国家自然科学基金项目(31701464)资助。This study was supported by the China Agriculture Research System (CARS-13), the Qingdao People's livelihood Science and Technology Program (20-3-4-26-nsh), the Agricultural Scientific and Technological Innovation Project of Shandong Academy of Agricultural Sciences (CXGC2016B02, CXGC2018E21), the Breeding Project from Department Science & Technology of Shandong Province (2019JZZY010702), the Key-Area Research and Development Program of Guangdong Province (2020B020219003), the Improved Variety Engineering Project of Shandong Province (2017LZGC003), the Key Research and Development Program of Linyi (2019YD009), and the National Natural Science Foundation of China (31701464).

* 通信作者(Corresponding authors): 迟晓元, E-mail: chi000@126.com; 侯艳华, E-mail: houyanhua2006@163.com

** 同等贡献(Contributed equally to this work)

第一作者联系方式: 许静, E-mail: xu_jing_cool@yeah.net

Received (收稿日期): 2020-07-10; Accepted (接受日期): 2020-11-13; Published online (网络出版日期): 2020-12-23.

URL: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20201223.1136.006.html>

花生(*Arachis hypogaea* L.)是世界上重要的油料作物和经济作物,也是重要的食用油和食用蛋白源,具有较高的经济价值^[1]。我国是世界上最大的花生消费国,每年花生总产量的46%~48%用于榨油。花生籽仁中脂肪含量占50%左右,其中80%为不饱和脂肪酸,能够降低有害胆固醇,减缓动脉粥样硬化,有效预防冠心病等心脑血管疾病^[2],是人们健康的食用油。因此,提高花生含油量是国家发展的重大需求,市场潜力巨大,发展前景广阔。

植物油脂的合成过程复杂,涉及多种酶的催化作用。甘油-3-磷酸酰基转移酶(*sn*-glycerol-3-phosphate acyltransferase, GPAT)、溶血磷脂酸酰基转移酶(lysophosphatidyl acyltransferase, LPAAT)和二酰甘油酰基转移酶(diacylglycerol acyltransferase, DGAT)是参与植物油脂合成的3个关键酶。近年来,花生油脂合成方面也取得了一定的研究进展。陈玉梅等^[3]对花后20、35、50、60 d的花生籽粒进行转录组测序,共得到135条代谢通路,其中与油脂合成相关的有脂肪酸生物合成、不饱和脂肪酸生物合成、脂肪酸延长、脂肪酸代谢、花生四烯酸代谢等代谢通路。Chi等^[4]在花生中分离得到6个*AhGPAT*基因,RT-PCR分析发现,在花生籽仁发育时期*AhGPAT9*的转录水平逐渐增加,同时在逆境环境下,*AhGPAT*基因在叶片或根中的表达显著增加。3个*AhDGATs*基因从花生中被克隆出来,*AhDGAT1-1*在籽仁发育的初期表达较低,但在果针入土50 d时表达增加,*AhDGAT1-2*在果针入土10 d和50 d高表达,*AhDGAT3-3*在果针入土20 d和50 d表达量最高^[5]。Zheng等^[6]将*AhDGAT1.1*转到烟草中,与野生型相比,脂肪酸含量增加14.7%~20.9%。Chi等^[7]通过RT-PCR或RACE-PCR在花生中克隆得到4个*AhLPAAT*基因,*AhLPAAT2*基因在籽粒中富集表达,主要集中在籽粒发育初期,然而*AhLPAAT6*基因在籽粒发育时期表达量下降,主要在花中富集表达。Chen等^[8]克隆了花生中的*AhLPAT4*基因,RT-PCR表明*AhLPAT4*在花后40 d和50 d表达量与种子中油脂的积累速率同步增加。皮广静等^[9]分析高油品系农大D666及其亲本不同发育时期籽仁内三类酰基转移酶基因的表达量表明,R5期*DGAT1-2*和*GPAT9*、*LPAAT*基因表达量之间协调性较好,有利于油脂的合成与积累。

硬脂酰-ACP去饱和酶(Stearoyl-ACP desaturase, FAD2)是实现硬脂酸转化为不饱和脂肪酸的关键酶,

微粒体12去饱和酶(Microsomal 12 desaturase, FAD2)是调控花生油酸、亚油酸含量和油亚比(O/L)的关键酶。在酵母中异源表达*AhFAD2-2*和*AhFAD6*发现了亚油酸的形成,证实了两基因的功能^[10]。此外,Chi等^[11]克隆了一系列的脂肪酸去饱和酶,RT-PCR分析发现*AhFAB2-2*和*AhFAD3-1*在籽粒中较其他组织表达量高,在籽粒发育时期,*AhFAB2-2*、*AhFAD3-1*、*AhFAD7-1*表达量逐渐上升达到最高水平,然后降低。转录因子WRINKLED(WRI1)是在种子皱缩的拟南芥突变体中发现并命名,研究发现该基因会导致突变体种子含油量降低80%^[12]。随后,WRI1转录因子常被用于油料作物和模式植物油分改良相关的研究。Pouvreau等^[13]研究表明,过表达*WRI1*基因,能使转基因玉米种子中含油量增加,同时还发现*WRI1*基因具有调节细胞质中三酰甘油主链生成的作用。孙金波等^[14]从二倍体花生野生种和四倍体栽培种克隆到20个WRI1转录因子,转录组分析表明*WRI1*在种子中的表达高于其他组织,RT-PCR结果进一步表明,*WRI1*表达随种子成熟水平逐渐增加。为进一步研究花生油脂合成的调控机制,本研究选用油酸和油脂含量差异显著的2个花生品种(系)。通过基因芯片测序技术,研究花生种子不同发育阶段的全基因组表达谱,并分离克隆出与种子发育有关,特别是与油脂或脂肪酸合成和调控有关的特异表达基因,以为花生品质的遗传改良奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

花生(*Arachis hypogaea* L.)材料选择山东省花生研究所杂交育种课题组培育的高油酸、中油花生品种F18和低油酸、低油花生品种‘鲁花6号’。

1.2 方法

1.2.1 样品采集 分别在10、30、40、60 DAP选取无病害、长势一致的花生荚果,剥去花生壳后迅速将籽仁放入液氮中速冻,-80℃保存,作为芯片测序的样品。另取各个时期花生荚果适量,作为油脂和脂肪酸含量测定的样品。

1.2.2 花生籽仁油脂和脂肪酸含量测定 采用索氏提取法^[15]提取油脂,脂肪酸的提取及气相色谱分析方法具体参考迟晓元等^[16]的方法。样品采用3 g左右研磨成粉末的花生种子,每个样品重复3次。

1.2.3 RNA提取和纯化 采用北京天根生化科

技有限公司试剂盒(RNeasy Mini Kit)提取样品总 RNA。使用 NucleoSpin RNA 纯化试剂盒(MACHEREYNAGEL, 德国)进行 RNA 样品的纯化。用甲醛琼脂糖凝胶电泳对 RNA 质检, 然后用 Nanovue Plus 分光光度计(General Electric Company, USA)对 RNA 进行定量。所有 RNA 样品均保存于 -80°C 冰箱备用。

1.2.4 基因芯片制备 芯片测序工作由厦门博奥生物科技有限公司完成。采用 Roche 公司的 NimbleGen 花生表达谱芯片, 芯片包含 36,158 个探针组。Roche NimbleGen 表达谱芯片试验流程按照博奥生物公司的规定流程进行, 具体方法参考 Yu 等^[17]的方法。

1.2.5 数据分析 利用 NimbleScan v2.6 软件将杂交芯片的图像信号转换为数字信号。采用 Genespring v13.0 软件分位数法进行数据标准化处理, 以上工作均由博奥生物有限公司完成。根据统计学分析, 差异基因的筛选条件为: 校正后的 P -value 0.05 且 2 个样品的差异倍数 $|\text{fold change}| \geq 2$ 。

1.2.6 GO 功能注释及富集分析 首先利用 blast + v2.2.30 将基因序列与 NCBI 中的 NR、Swissprot、TrEm1 等数据库进行比对。然后将比对结果导入 Blast2GO 中用于 GO 注释, 主要包括分子功能、生物过程和细胞组分信息注释。最后利用 WEGO 对 GO 功能进行分类统计(<http://wego.genomics.org>。

[cn/cgi-bin/wego/index.pl](http://wego.genomics.org))。

1.2.7 KEGG Pathway 分类与富集分析 利用 KEGG 网站(<http://www.kegg.jp/>)对获得的序列进行代谢通路分类, 同一个基因序列可能注释到多个代谢通路中。使用 R 软件中 ggplot2 软件包进行富集分析。

1.2.8 蛋白互作网络分析 将 F18 和‘鲁花 6 号’ 40 DAP 和 60 DAP 2 个时期的所有差异表达的基因序列比对结果上传至 STRING 数据库(<https://string-db.org/>)中, 分析蛋白之间的互作关系。然后导入到 cytoscape 中进行编辑作图。

1.2.9 差异表达基因的 RT-PCR 验证 参照陈娜等^[18]的方法进行荧光定量 PCR 的反应。每个样品 3 次重复, 内参基因选择 *Actin11*, 采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 方法分析数据。荧光定量 PCR 所用引物见表 1。

2 结果与分析

2.1 不同发育时期花生籽仁油脂和脂肪酸含量分析

F18 和‘鲁花 6 号’不同发育时期花生籽仁含油量和脂肪酸组分含量如表 2, 两品种(系)含油量和油酸含量随着籽仁的发育不断积累。除了 30 DAP 发育时期, F18 在各个发育时期的含油量均高于‘鲁花 6 号’, 两品种(系)在 60 DAP 发育时期含油量均最高, 分别为 50.81%和 45.44%。F18 在 4 个发育时

表 1 RT-PCR 验证基因所用的引物

Table 1 Primers for RT-PCR in this study

基因编号 Gene ID	正向引物 Forward primer (5'-3')	反向引物 Reverse primer (5'-3')
AHTC1032413	ACGAAGGTTATGGAAGTAG	AGGAAGGTAGTGAAGGAA
AHTC1030930	AGGTGAAGAATCTGTAGTC	CTTATCTTGTAATTACTTGTCT
AHTC1005724	GATAAGTGGAGCAGTAGC	CAAGAAGACGATGATATAAGC
AHTC1030772	TCAATCAGATTCGTAACATTC	ACTCAATAACTCTATCCACTAG
AHTC1020107	CTACTACTCATTCATTGTGTC	CTTAACCTACCCACACAT
AHTC1012845	TCCTCTTCTTCATCTTCATC	CCTGGTTACTCCTCTGTA
AHTC1014100	ACTCCTTCTCCTCTTCAT	ATATTAGGCAGCAGATACC
AHTC1001812	AATGGCAGGAGGTTATTG	TTCTTCTTCATCATAATCTTAGC
AHTC1001844	GTGACTTGGCAGAGATTA	AATTGATTGATTGACGGATG
AHTC1001749	TCTTGAGATTCTTGTGTTG	GCTATGCGACTTCTTCAT
AHTC1005424	GAGTGATGTAGTTGAGATAGA	CTCTCCGATGACTTGAT
AHTC1000715	TGGTTAAGAGGAGCATTG	ATGAGGCATTGTTGAGAA
AHTC1002482	GTTGCTCTGATGACTCTC	TATGGCTAACCGTTGATG
AHTC1027178	TCTCACTCACTCTCATCA	CCACCACCATCTTAGAAG
<i>Actin11</i>	TTGGAATGGGTCAGAAGGATGC	AGTGGTGCCTCAGTAAGAAGC

期的油酸含量均高于‘鲁花 6 号’，在 40 DAP 发育时期达 76.06%，而‘鲁花 6 号’在 60 DAP 达到最高，为 43.98%。亚油酸含量在两品种(系)中随着籽仁发育呈下降趋势，F18 和‘鲁花 6 号’均在 60 DAP 发育时期达到最低，为 1.55%和 34.28%，油亚比均最高为 45.65 和 1.28。

2.2 不同发育时期花生籽仁差异表达基因分析

根据芯片杂交结果中不同发育时期籽仁基因表达水平，筛选出显著差异表达的基因。10 DAP 时期两品种(系)基因表达水平差异不显著(图 1-A)；30 DAP 时期在两品种(系)中差异表达的基因共 130 个，与‘鲁花 6 号’相比，F18 上调表达基因 20 个，下调

表 2 不同发育时期两品种(系)油脂和脂肪酸含量

Table 2 Oil and fatty acid content at different developmental stages in F18 and Luhua 6

样品名称 Name	发育时期 Development stage	含油量 Oil content (%)	油酸含量 Oleic content (%)	亚油酸含量 Linoleic content (%)	油亚比 O/L
F18	10 DAP	13.86	58.91	15.39	3.83
	30 DAP	35.21	74.01	5.61	13.19
	40 DAP	46.82	76.06	2.43	31.30
	60 DAP	50.81	70.75	1.55	45.65
鲁花 6 号 Luhua 6	10 DAP	19.67	31.63	37.14	0.85
	30 DAP	36.95	34.96	41.28	0.85
	40 DAP	44.44	37.67	39.39	0.96
	60 DAP	45.44	43.98	34.28	1.28

图 1 不同发育时期两品种(系)间差异表达基因火山图

Fig. 1 Volcano plot of differential expression genes at the different developmental stages between F18 and Luhua 6

A: 10 DAP 差异表达基因; B: 30 DAP 差异表达基因; C: 40 DAP 差异表达基因; D: 60 DAP 差异表达基因。红色表示 F18 相对于‘鲁花 6 号’差异表达的基因。

A: different expression genes of 10 DAP; B: different expression genes of 30 DAP; C: different expression genes of 40 DAP; D: different expression genes of 60 DAP. Red blots represent the different expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’.

表达基因 110 个(图 1-B); 两品种(系)在 40 DAP 时期差异表达的基因数目最多, 达 3556 个, 其中上调的差异表达基因有 2056 个, 下调的有 1500 个(图 1-C); 60 DAP 时期两品种(系)差异表达的基因共 2783 个, 相对于‘鲁花 6 号’, F18 上调表达的基因有 1746 个, 下调表达的基因有 1037 个(图 1-D)。

根据筛选的差异表达基因分析发现, 一些基因在花生籽仁发育的不同时期均有表达。由图 2 可知, 与‘鲁花 6 号’相比, F18 在 30、40、60 DAP 3 个时期同时表达上调的基因有 6 个, 下调表达的基因有 50 个; 在 40、60 DAP 2 个时期共同差异表达上调的有 712 个, 差异表达下调的有 362 个。

图 2 不同品种(系)间不同发育时期共同表达的差异基因

Fig. 2 Differentially expressed genes of two variations (lines) at three different developmental stages

A: F18 相比于‘鲁花 6 号’上调表达基因; B: F18 相比于‘鲁花 6 号’下调表达基因。

A: the up-regulated expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’; B: the down-regulated expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’.

2.3 不同发育时期差异表达基因的 GO 功能注释分析

对筛选到的差异表达基因进行 GO 功能注释, 3 个不同发育时期分别注释 22、1914 和 1559 个差异基因, 主要包括生物过程、细胞组分和分子功能三大类别。如图 3-A 所示, 40 DAP 和 60 DAP 时期差异表达基因主要参与代谢调控(metabolic process GO: 0008152)和催化进程(catalytic activity GO: 0003824)。有趣的是, 参与光合作用的基因全部上调(53 个)而没有下调, 这些参与光合作用的基因大量上调导致 F18 固定空气中更多的 CO_2 , 并合成为自身碳源, 最终流向脂质合成。此外, 还发现前体代谢物和能量的生成上调的基因有 42 个, 而下调仅有 1 个。这些光合作用、糖、蛋白等代谢也对油脂合成和积累有一定影响。进一步对 40 DAP 和 60 DAP 2 个时期差异表达的 1074 个基因进行富集

发现, 共有 598 个基因富集到 11 个 GO 类别中(图 3-B)。其中代谢进程富集的基因最多, 这表明‘鲁花 6 号’和 F18 参与代谢途径的基因的表达有显著差异。

2.4 不同发育时期差异表达基因的 KEGG Pathway 富集分析

根据 KEGG 数据库, 本研究对花生籽仁 40 DAP 和 60 DAP 2 个发育时期 1074 个差异表达的基因(上调表达基因 712 个, 下调表达基因 362 个)进行 KEGG Pathway 富集分析。上调表达的基因主要富集在光合、氨基酸代谢、脂肪酸合成和淀粉蔗糖代谢 4 个代谢途径中(图 4-A), 注释的基因分别为 25、12、21 和 9 个。下调表达的基因只富集在柠檬烯和蒽烯降解途径中, 没有富集到与脂肪酸代谢相关的途径(图 4-B)。这表明, 与‘鲁花 6 号’相比, F18 中参与脂肪酸合成的基因在花生籽仁发育的后期表达量普遍较高。另外, 本研究发现, 光合途径差异表达基因编码的都是捕光叶绿素 *a/b* 结合蛋白, 这些蛋白复合体能够捕获并传递光能, 调节光能分配, 而光合作用是植物一切物质积累的源头, 这一发现反应了 2 个品种(系)自身的遗传差异。

针对我们感兴趣的脂肪酸合成途径, 绘制了代谢通路图(图 5)。结果显示, 在 F18 和‘鲁花 6 号’后 2 个发育时期脂肪酸合成途径中没有找到下调的基因, 说明在这一时期中, F18 的脂肪酸合成代谢比‘鲁花 6 号’更旺盛, 产生更多的脂肪酸。在代谢通路的最开始, 第 1 个上调的是 ACCase (EC: 6.4.1.2)基因, 催化脂肪酸生物合成的起始; 而后在脂肪酸合成循环的通路中, β -酮脂酰 ACP 合酶(FabF)、 β -酮脂酰 ACP 还原酶(FabG)、 β -羟酰基 ACP 脱水酶(FabZ)和烯酰-ACP 还原酶(FabI)均上调, 他们共同催化脂肪酸的缩合反应; 在途径的末端, 长链酰基合成酶(EC:6.2.1.3)基因上调表达, 合成长链的脂肪酸。

2.5 油脂代谢相关基因的筛选

根据 GO 注释的结果, 我们分别在 40 DAP 和 60 DAP 籽仁发育时期筛选到 64 个和 62 个参与油脂代谢相关的基因, 其中分别鉴定到 25 个和 27 个油脂合成的关键基因(表 3 和表 4)。硬脂酰 ACP 去饱和酶(FAB2)是催化硬脂酸产生油酸的关键酶, ω 6 脂肪酸去饱和酶(FAD2)是催化油酸 C12 位去饱和酶形成亚油酸的一类酶。花生籽仁发育的 40 DAP 时期, F18 花生品系中两基因均上调表达

(*AHTC1008662* 和 *AHTC1005915*), 比 ‘鲁花 6 号’ 花生品种中的表达量分别高 3.48 倍和 2.06 倍。在 60 DAP 发育时期, *FAB2* 起关键作用, 与 ‘鲁花 6 号’ 相比, F18 中 *FAB2* (*AHTC1001749*) 表达量显著增加, 高达 29.89 倍。

2.6 WRI1 蛋白互作网络分析

在花生籽仁发育后期的差异表达基因中筛选到 WRI1 转录因子, 以 WRI1 为核心进行蛋白互作网络分析, 共发现 9 个与 WRI1 互作的蛋白(图 6)。其中 KASI (3-酮酰基载体蛋白合酶)、MOD1 (烯酰基载体蛋白还原酶) 和 GLB1 (氮调控蛋白) 与脂质代谢

有关, SUC5 (蔗糖转运蛋白) 和 UGT84B1 (葡萄糖基转移酶) 参与糖代谢, 进一步使碳源从糖代谢流向脂肪酸合成, 促进脂肪酸合成。

2.7 不同发育时期差异表达基因的 RT-PCR 验证

为验证芯片测序结果中基因表达量的准确性, 随机挑选了不同发育时期的 16 个基因进行 RT-PCR 验证, 16 个差异表达基因及内参基因引物如表 1 所示。将 RT-PCR 结果与芯片测序数据比对发现, 16 个差异表达基因与芯片数据基本吻合(图 7 和表 5), 表明芯片测序数据的可靠性, 可以用来分析不同发育时期花生籽仁差异表达的基因。

图 3 差异表达基因 GO 注释及富集分析

Fig. 3 GO annotation and enrichment of differentially expressed genes

图 4 差异表达基因 KEGG 注释及富集分析
Fig. 4 KEGG pathway annotation and enrichment of differentially expressed genes

图 5 40 DAP 和 60 DAP 差异表达基因脂肪酸代谢通路图
Fig. 5 Fatty acid biosynthesis pathway of differential expression genes on 40 DAP and 60 DAP
红色代表相对于‘鲁花 6 号’, F18 上调表达的基因。
Red represents the up-regulated expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’.

表 3 40 DAP 发育时期油脂代谢相关基因

Table 3 Differentially expressed genes involved in the lipid metabolism on 40 DAP

基因编号	基因注释	GO 富集	调控 ^a	差异表达倍数
Gene ID	Gene annotation	GO enrichment	Regulation ^a	Fold change
AHTC1031703	移酶 1-酰基-sn-甘油-3-磷酸酰基转	磷脂生物合成	上调	4.19
	1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase-like	Phospholipid biosynthetic process	Up	

(续表 3)

基因编号 Gene ID	基因注释 Gene annotation	GO 富集 GO enrichment	调控 ^a Regulation ^a	差异表达倍数 Fold change
AHTC1022314	3-酮脂酰-合酶 3-ketoacyl-synthase	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.88
AHTC1029564	类 3-酮脂酰-合酶 10 3-ketoacyl-synthase 10-like	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.30
AHTC1007527	3-酮脂酰-合酶 11 3-ketoacyl-synthase 11	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	下调 Down	3.28
AHTC1008395	类 3-酮脂酰-合酶 11 3-ketoacyl-synthase 11-like	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	下调 Down	2.55
AHTC1016489	3-酮脂酰-合酶 21 3-ketoacyl-synthase 21	脂质生物合成 Lipid biosynthetic process	上调 Up	5.25
AHTC1003640	类 3-酮脂酰-合酶 21 3-ketoacyl-synthase 21-like	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	3.51
AHTC1003641	类 3-酮脂酰-合酶 21 3-ketoacyl-synthase 21-like	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	6.43
AHTC1004544	3-酮脂酰-合酶 6 3-ketoacyl-synthase 6	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.86
AHTC1019082	α -乙酰羧化酶亚基 Alpha-acetyl-carboxylase subunit	脂肪酸生物合成; 丙二酰辅酶 A 生物合成 Fatty acid biosynthetic process; malonyl-CoA biosynthetic process	下调 Down	2.07
AHTC1001812	β -酮酰基-ACP 还原酶 Beta-ketoacyl-acp reductase 1-2	脂肪酸生物合成; 氧化还原 Fatty acid biosynthetic process; oxidation-reduction process	上调 Up	2.05
AHTC1001844	β -酮酰基-ACP 合酶 Beta-ketoacyl-acp synthase i-2	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.17
AHTC1005915	叶绿体 ω -6 脂肪酸去饱和酶 Chloroplast omega-6 fatty acid desaturase	二磷酸生物合成 Diphosphate biosynthetic process	上调 Up	2.06
AHTC1032453	酰基-载体-蛋白合酶 Fatty acid biosynthesis 1 isoform 1	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.16
AHTC1032454	酰基-载体-蛋白合酶 Fatty acid biosynthesis 1 isoform 1	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.57
AHTC1020107	鞘脂 Δ 8 去饱和酶 Fatty acid sphingolipid desaturase	脂质代谢; 氧化还原 Lipid metabolic process; oxidation-reduction process	上调 Up	2.04
AHTC1035094	脂质转移蛋白 Lipid transfer protein gpi-anchored	脂质转移 Lipid transport	上调 Up	14.59
AHTC1009675	长链酰基合成酶 Long chain acyl-synthetase 1-like isoform $\times$ 1	长链脂肪酸代谢 Long-chain fatty acid metabolic process	上调 Up	2.44
AHTC1026013	长链酰基合成酶 Long chain acyl-synthetase 1-like isoform $\times$ 1	长链脂肪酸代谢 Long-chain fatty acid metabolic process	上调 up	3.03
AHTC1017689	长链酰基合酶 2 Long chain acyl-synthetase 2	长链脂肪酸代谢 Long-chain fatty acid metabolic process	上调 up	2.65
AHTC1006429	长链酰基合成酶 2 异构体 Long chain acyl-synthetase 2-like isoform $\times$ 2	长链脂肪酸代谢 Long-chain fatty acid metabolic process	上调 Up	3.44
AHTC1034617	微粒体 ω -3 脂肪酸去饱和酶 Microsomal omega-3 fatty acid desaturase	脂质代谢; 氧化还原 Lipid metabolic process; oxidation-reduction process	上调 Up	5.40

(续表 3)

基因编号 Gene ID	基因注释 Gene annotation	GO 富集 GO enrichment	调控 ^a Regulation ^a	差异表达倍数 Fold change
AHTC1020991	非特异性脂质转移酶蛋白 Non-specific lipid-transfer protein	脂质转移 Lipid transport	上调 Up	3.92
AHTC1017861	ω -3 去饱和酶家族蛋白 Omega-3 desaturase family protein	不饱和脂肪酸生物合成; 氧化还原 Unsaturated fatty acid biosynthetic process; oxidation-reduction process	下调 Down	2.55
AHTC1008662	硬脂酰 ACP 去饱和酶 Stearoyl-acyl-carrier desaturase	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process; oxidation-reduction process	上调 Up	3.48

^a表示 F18 相对于‘鲁花 6 号’的上调和下调。^arepresents the up- and down-regulated expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’.

表 4 60 DAP 发育时期油脂代谢相关基因

Table 4 Differentially expressed genes involved in the lipid metabolism on 60 DAP

基因编号 Gene ID	基因注释 Gene annotation	GO 富集 GO enrichment	调控 ^a Regulation ^a	差异表达倍数 Fold change
AHTC1005431	类 3-酮脂酰-合酶 11 3-ketoacyl-synthase 11-like	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	7.27
AHTC1000075	酰基载体蛋白 Acyl carrier protein 1	脂肪酸生物合成; 氧化还原 Fatty acid biosynthetic process; oxidation-reduction process	上调 Up	3.10
AHTC1000128	酰基载体蛋白 Acyl carrier protein 1	脂肪酸生物合成; 氧化还原 Fatty acid biosynthetic process; oxidation-reduction process	上调 Up	2.72
AHTC1028756	α -羧基转移酶前体 Alpha-carboxyltransferase precursor	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	4.68
AHTC1005278	α -羧基转移酶 Alpha-carboxyl transferase 2	脂肪酸生物合成; 泛醌生物合成 Fatty acid biosynthetic process; coenzyme biosynthetic process	上调 Up	4.26
AHTC1000881	β -羟烷基-ACP 脱氢酶 Beta-hydroxyacyl-acyl dehydratase	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	18.60
AHTC1001812	β -酮酰基-ACP 还原酶 Beta-ketoacyl-acyl reductase 1-2	脂肪酸生物合成; 氧化还原 Fatty acid biosynthetic process; oxidation-reduction process	上调 Up	7.89
AHTC1001844	β -酮酰基-ACP 合酶 Beta-ketoacyl-acyl synthase i-2	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	4.49
AHTC1007010	β -酮酰基-ACP 合酶 Beta-ketoacyl-acyl synthase ii-1	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	3.25
AHTC1002452	生物素羧基载体蛋白 Biotin carboxyl carrier protein 2-2	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	6.29
AHTC1014935	生物素羧基载体蛋白 Biotin carboxyl carrier protein 2-2	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.83
AHTC1022457	生物素羧基载体蛋白 Biotin carboxyl carrier protein 2-2	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	4.01
AHTC1032453	酰基-载体-蛋白合酶 Fatty acid biosynthesis 1 isoform 1	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	3.90
AHTC1009675	长链酰基合成酶 Long chain acyl-synthetase 1-like isoform x 1	长链脂肪酸代谢 Long-chain fatty acid metabolic process	上调 Up	7.57

(续表 4)

基因编号 Gene ID	基因注释 Gene annotation	GO 富集 GO enrichment	调控 ^a Regulation ^a	差异表达倍数 Fold change
<i>AHTC1026013</i>	长链酰基合成酶 Long chain acyl-synthetase 1-like isoform x 1	长链脂肪酸代谢 Long-chain fatty acid metabolic process	上调 Up	9.64
<i>AHTC1017689</i>	长链酰基合成酶 2 Long chain acyl-synthetase 2	长链脂肪酸代谢 Long-chain fatty acid metabolic process	上调 Up	6.75
<i>AHTC1020991</i>	非特异性脂质转移酶蛋白 Non-specific lipid-transfer protein	脂质转移 Lipid transport	上调 Up	3.89
<i>AHTC1002315</i>	非特异性脂质转移酶蛋白 Non-specific lipid-transfer protein at5g64080-like	脂质转移 Lipid transport	上调 Up	3.73
<i>AHTC1015374</i>	非特异性脂质转移酶蛋白 Non-specific lipid-transfer protein at5g64080-like	脂质转移 Lipid transport	上调 Up	3.13
<i>AHTC1019533</i>	酰基转移酶 O-acyltransferase wsd1-like	甘油酯生物合成 Glycerolipid biosynthetic process	下调 Down	6.23
<i>AHTC1005424</i>	油酰-酰基载体蛋白硫酯酶 Oleoyl-acyl carrier protein thioesterase chloroplastic-like	脂肪酸生物合成 Fatty acid biosynthetic process	上调 Up	2.72
<i>AHTC1000715</i>	ω 6 脂肪酸去饱和酶 Omega 6 fatty acid desaturase	脂质代谢; 氧化还原 Lipid metabolic process; oxidation-reduction process	上调 Up	3.82
<i>AHTC1021791</i>	过氧化物酶体脂肪酸- β 氧化多功能蛋白 Peroxisomal fatty acid beta-oxidation multi- functional protein mfp2-like	脂肪酸生物合成; 氧化还原 Fatty acid metabolic process; oxidation- reduction process	下调 Down	2.62
<i>AHTC1001749</i>	硬脂酰-ACP 去饱和酶 Searoyl-acp desaturase	脂肪酸生物合成; 氧化还原 Fatty acid biosynthetic process; oxidation- reduction process	上调 Up	29.89
<i>AHTC1003174</i>	超长链 3-酰基还原酶 Very-long-chain 3-oxoacyl-reductase 1-like	超长链脂肪酸生物合成 Very long-chain fatty acid biosynthetic process	上调 Up	3.92
<i>AHTC1001068</i>	类超长链烯酰还原酶异构体 Very-long-chain enoyl-reductase-like iso- formx1	脂质代谢; 氧化还原 Lipid metabolic process; oxidation-reduction process	上调 Up	3.97
<i>AHTC1001069</i>	类超长链烯酰还原酶异构体 Very-long-chain enoyl-reductase-like iso- formx1	脂质代谢; 氧化还原 Lipid metabolic process; oxidation-reduction process	上调 Up	3.80

^a 表示 F18 相对于‘鲁花 6 号’的上调和下调。

^a represents the up- and down-regulated expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’.

3 讨论

油酸是有益脂肪酸，能够减少心脑血管的发生，维持身体健康^[19]。最近几年已有多家单位开展高油酸花生育种工作：姜慧芳等^[20]发现，远缘杂交后脂肪酸的变异远超过亲本间的差异，并且获得了 6 份油酸含量达 64.0% 以上且棕榈酸含量在 8.5% 以下的新种质；于明洋等^[21]将‘花育 22’与‘开农 1716’杂交并不断回交，获得了 24 个油酸含量高于 70% 的花生新品系。然而，高油酸代谢的分子机制研究相

对较少，尤其是不同花生品种(系)之间。本研究对‘鲁花 6 号’和 F18 不同发育时期的花生籽仁进行芯片测序，分别在 10 DAP、30、40、60 发育时期筛选到 130、3556、2783 个差异表达的基因(10 DAP 发育时期无差异表达基因)。本研究发现在发育初期(10 DAP 和 30 DAP)两品种(系)之间差异表达基因较少，而在 40 DAP 发育时期差异表达基因数目最多，60 DAP 发育时期相对减少，这与植物种子油脂积累呈现慢—快—慢的变化规律相一致^[22]。

图 6 WRI1 蛋白互作网络

Fig. 6 Protein-protein interaction of WRI1

黑色和灰色分别代表相对于‘鲁花 6 号’, F18 上调和下调表达的基因。

Black and grey represent the up- and down-regulated expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’.

图 7 不同发育时期差异表达基因的 RT-PCR 验证结果

Fig. 7 RT-PCR validation results of the differentially expressed genes at different developmental stages

表 5 差异表达基因的 RT-PCR 验证结果

Table 5 RT-PCR validation results of the differentially expressed genes

基因编号 Gnen ID	基因注释 Gene annotation	发育时期 Development stage	调控 ^a Regulation ^a	芯片数据(倍数) Microarray data (fold change)	RT-PCR 验证结果(倍数) RT-PCR result (fold change)
AHTC1032413	黄酮醇合酶 Flavonol synthase flavanone 3-hydroxylase-like	DAP30	上调 Up	6.05	13.64
AHTC1030930	锌指蛋白 Dof zinc finger protein	DAP30	下调 Down	-3.78	-4.55
AHTC1005724	非特异性脂质转移酶 Non-specific lipid-transfer protein 3-like	DAP40	上调 Up	4.04	3.25
AHTC1030772	β-羟酰基-ACP 脱水酶 Beta-hydroxyacyl-acp dehydrase 1	DAP40	上调 Up	2.86	2.11
AHTC1020107	鞘脂 Δ8 去饱和酶 Fatty acid sphingolipid desaturase	DAP40	上调 Up	2.04	3.48
AHTC1012845	WRI1 转录因子 Ethylene-responsive transcription factor wri1-like	DAP40	上调 Up	2.15	2.31
AHTC1030930	锌指蛋白 Dof zinc finger protein	DAP40	下调 down	-5.30	-10.24
AHTC1014100	肌醇半乳糖醇合酶 Galactinol synthase 8	DAP40	下调 Down	-3.09	-4.07
AHTC1001812	β-酮酰基-ACP 还原酶 Beta-ketoacyl-acp reductase 1-2	DAP60	上调 Up	7.89	5.09
AHTC1001844	β-酮酰基-ACP 合酶 Beta-ketoacyl-acp synthase i-2	DAP60	上调 Up	4.49	4.83
AHTC1012845	WRI1 转录因子 Ethylene-responsive transcription factor wri1-like	DAP60	上调 Up	5.83	21.21
AHTC1005424	酰基载体蛋白硫酯酶 Oleoyl-acyl carrier protein thioesterase chloroplastic-like	DAP60	上调 Up	2.72	3.47

(续表 5)

基因编号 Gnen ID	基因注释 Gene annotation	发育时期 Development stage	调控 ^a Regulation ^a	芯片数据(倍数) Microarray data (fold change)	RT-PCR 验证结果(倍数) RT-PCR result (fold change)
<i>AHTC1001749</i>	硬脂酰-ACP 去饱和酶 Stearoyl-acp desaturase	DAP60	上调 Up	29.89	16.26
<i>AHTC1000715</i>	ω6 脂肪酸去饱和酶 Omega 6 fatty acid desaturase	DAP60	上调 Up	3.82	1.55
<i>AHTC1002482</i>	天冬酰胺合成酶 Asparagine synthetase 2	DAP60	下调 Down	-4.87	-6.12
<i>AHTC1027178</i>	Hsf 转录因子 Heat stress transcription factor a-2-like	DAP60	下调 Down	-4.39	-9.85

^a表示 F18 相对于‘鲁花 6 号’的上调和下调。
^arepresents the up- and down-regulated expression genes of F18 compared with ‘Luhua 6’.

GO 注释及富集分析发现, 40 DAP 和 60 DAP 2 个时期共有 416 个差异表达的基因富集到代谢进程 (metabolic process)。其中相比于‘鲁花 6 号’, F18 在脂质代谢进程中上调表达基因居多, 表明 F18 在花生籽仁发育后期, 脂质代谢相关基因活跃, 油脂合成加快, 这可能是造成两品种(系)间含油量差异的原因。GO 富集分析发现, F18 中参与光合作用的基因表达量均比‘鲁花 6 号’高, 这将促使 F18 固定更多的碳源并流向油脂合成途径。此外, F18 中前体代谢和能量生成途径上的基因上调表达。这些光合作用、糖、蛋白等代谢进程的活跃将促进油脂合成和积累, 与前人研究相符^[23]。

已有研究证明 *FAB2* 和 *FAD2* 在改善油料作物脂肪酸组分方面发挥了作用。与野生型相比, 转 *FAB2* 基因的烟草植株不饱和脂肪酸(尤其是油酸)含量更高^[24]。*FAD2* 是调控花生油酸、亚油酸含量和油亚比(O/L)的关键酶, *AhFAD2* 酶活性的丧失是产生高 O/L 比值花生的主要原因之一^[25]。本研究发现, 60 DAP 花生发育时期, F18 中两基因均上调表达, 但 *FAB2* 的表达量差异倍数(29.89)远高于 *FAD6* (3.82), 这表明 F18 品系花生籽仁发育后期, *FAB2* 基因起主要作用, 因此导致 F18 的油酸含量高于‘鲁花 6 号’。这与官梅等^[26]利用芯片测序的结果一致。

转录因子与基因启动子区相结合调控基因的表达, 有研究发现, 一些转录因子能够参与植物油脂代谢^[27]。*WRI1* (*WRINKLED1*)转录因子是 AP2/EREBP 家族的一员, Maeo 等^[28]发现, 超表达 *WRI1* 基因能够上调脂肪酸合成途径的一系列基因, 包括 *Pl-PKb1*、*BCCP2*、*ACPI*、*KASI* 等。Fukuda 等^[29]的研究表明, *WRI1* 能够与脂肪酸合成相关基因的上

游序列 AW-box 结合, 调控乙酰辅酶 A 羧化酶基因的表达, 进而调控油脂代谢。本研究在花生籽仁发育的后期筛选到了 *WRI1* 转录因子, 其在 F18 中的表达量比在‘鲁花 6 号’高 3.99 倍, 但是本文中筛选到的与油脂合成相关的差异表达基因是否受到该转录因子的调控有待进一步研究。

以上数据表明, 花生籽仁油脂的合成是一个复杂的过程, 受许多基因和转录因子的共同调控。研究结果可为花生籽仁油脂合成机理研究提供理论基础, 为花生品质育种提供新的基因资源, 但是相关基因复杂的调控网络及功能有待进一步验证。

4 结论

分别在 30、40、60 DAP 时期检测到 130、3556、2783 个差异表达的基因。GO 注释、KEGG 富集和代谢通路图表明, 差异表达的基因主要参与脂肪酸合成和光合等代谢进程, 其中硬脂酰-ACP 去饱和酶 (*FAB2*)、微粒体 12 去饱和酶(*FAD2*)、*WRI1* 转录因子主要参与油酸的积累。

References

[1] Sarvamangala C, Gowda M, Varshney R. Identification of quantitative trait loci for protein content, oil content and oil quality for groundnut (*Arachis hypogaea* L.). *Field Crops Res*, 2011, 122: 49–59.

[2] Huth P J, Fulgoni III V L, Larson B T. A systematic review of high-oleic vegetable oil substitutions for other fats and oils on cardiovascular disease risk factors: implications for novel high-oleic soybean oils. *Adv Nutr*, 2015, 6: 674–693.

[3] 陈玉梅, 李璐璐, 陈锦玲, 徐媛, 李惠敏, 秦新民. 基于转录组测序的花生籽粒不同发育时期油脂合成相关基因差异表达分析. *河南农业科学*, 2019, 48(7): 24–37.

Chen Y M, Li L L, Chen J L, Xu Y, Li H M, Qin X M. Differential expression analysis of genes related to lipid synthesis through

- transcriptome sequencing during different developmental stages in peanut seed. *J Henan Agric Sci*, 2019, 48(7): 24–37 (in Chinese with English abstract).
- [4] Chi X Y, Yang Q L, Pan L J, Chen N, Wang T, Wang M, Yang Z, Guan X, Yu S L. Isolation and expression analysis of glycerol-3-phosphate acyltransferase genes from peanuts (*Arachis hypogaea* L.). *Grasas y Aceites*, 2015, 66: e093.
- [5] Chi X Y, Hu R B, Zhang X W, Chen M N, Chen N, Pan L J, Wang T, Wang M, Yang Z, Wang Q F, Yu S L. Cloning and functional analysis of three diacylglycerol acyltransferase genes from peanut (*Arachis hypogaea* L.). *PLoS One*, 2014, 9: e105834.
- [6] Zheng L, Shockey J, Guo F, Shi L M, Li X G, Shan L, Wan S B, Peng Z Y. Discovery of a new mechanism for regulation of plant triacylglycerol metabolism: the peanut *diacylglycerol acyltransferase-1* gene family transcriptome is highly enriched in alternative splicing variants. *J Plant Physiol*, 2017, 219: 62–70.
- [7] Chi X Y, Dong F, Yang Q L, Chen M N, Chen N, Pan L J, Wang T, Wang M, Yang Z, He Y N, Yu S L. Expression and characterization of *Lysophosphatidyl acyltransferase* genes from peanut (*Arachis hypogaea* L.). *Res Crops*, 2014, 15: 141–153.
- [8] Chen S L, Huang J Q, Lei Y, Zhang Y T, Ren X P, Chen Y N, Jiang H F, Yan L Y, Li Y R, Liao B S. Identification and characterization of a gene encoding a putative lysophosphatidyl acyltransferase from *Arachis hypogaea*. *J Biosci*, 2012, 37: 1029–1039.
- [9] 皮广静, 刘凤珍, 万勇善, 张昆, 吕玉英, 张秀荣. 花生高油品系农大 D666 及其亲本油脂合成酰基转移酶基因的表达分析. *分子植物育种*, 2018, 16: 1057–1065.
- Pi G J, Liu F Z, Wan Y S, Zhang K, Lyu Y Y, Zhang X R. Expression analysis of Acyltransferase genes involved in oil biosynthesis in high-oil peanut line Nongda D666 and parents. *Mol Plant Breed*, 2018, 16: 1057–1065 (in Chinese with English abstract).
- [10] Chi X Y, Yang Q L, Pan L J, Chen M N, He Y N, Yang Z, Yu S L. Isolation and characterization of fatty acid desaturase genes from peanut (*Arachis hypogaea* L.). *Plant Cell Rep*, 2011, 30: 1393–1404.
- [11] Chi X Y, Zhang Z M, Chen N, Zhang X W, Wang M, Chen M N, Wang T, Pan L J, Chen J, Yang Z, Guan X Y, Yu S L. Isolation and functional analysis of fatty acid desaturase genes from peanut (*Arachis hypogaea* L.). *PLoS One*, 2017, 12: e0189759.
- [12] Focks N, Benning C. Wrinkled1: a novel, low-seed-oil mutant of *Arabidopsis* with a deficiency in the seed-specific regulation of carbohydrate metabolism. *Plant Physiol*, 1998, 118: 91–101.
- [13] Pouvreau B, Baud B, Vernoud V, Morin V, Py C, Gendrot G, Pichon J P, Rouster J, Paul W, Rogowsky P M. Duplicate maize *Wrinkled1* transcription factors activate target genes involved in seed oil biosynthesis. *Plant Physiol*, 2011, 156: 674–686.
- [14] 孙金波, 石素华, 杨利, 李凤丽, 王兴军, 赵术珍. 花生 *WRI1* 基因家族的全基因组与表达谱分析. *花生学报*, 2020, 49(1): 9–18.
- Sun J B, Shi S H, Yang L, Li F L, Wang X J, Zhao S Z. Genome-wide analysis of *WRI1* gene family and their expression profiles in peanut. *J Peanut Sci*, 2020, 49(1): 9–18 (in Chinese with English abstract).
- [15] Harwood H J. Oleochemicals as a fuel: mechanical and economic feasibility. *J Am Oil Chem Soci*, 1984, 61: 315–324.
- [16] 迟晓元, 郝翠翠, 潘丽娟, 陈娜, 陈明娜, 王通, 王冕, 杨珍, 梁成伟. 不同花生品种脂肪酸组成及其积累规律的研究. *花生学报*, 2016, 45(3): 32–36.
- Chi X Y, Hao C C, Pan L J, Chen N, Chen M N, Wang T, Wang M, Yang Z, Liang C W. Fatty acid accumulation pattern in different types of peanut. *J Peanut Sci*, 2016, 45: 32–36 (in Chinese with English abstract).
- [17] Yu P, Wang C H, Xu Q, Feng Y, Yuan X P, Yu H Y, Wang Y P, Tang S X, Wei X H. Detection of copy number variations in rice using array-based comparative genomic hybridization. *BMC Genomics*, 2011, 12: 372.
- [18] 陈娜, 迟晓元, 程果, 潘丽娟, 陈明娜, 王通, 王冕, 杨珍, 禹山林. 花生中低温胁迫相关转录因子基因的筛选. *核农学报*, 2016, 30(1): 19–27.
- Chen N, Chi X Y, Cheng G, Pan L J, Chen M N, Wang T, Wang M, Yang Z, Yu S L. Profiling of genes encoding cold stress-related transcription factors in peanut. *J Nucl Agric Sci*, 2016, 30: 19–27 (in Chinese with English abstract).
- [19] Barbour J A, Howe P R, Buckley J D, Bryan J, Coates A M. Cerebrovascular and cognitive benefits of high-oleic peanut consumption in healthy overweight middle-aged adults. *Nutr Neurosci*, 2017, 20: 555–562.
- [20] 姜慧芳, 任小平, 黄家权, 雷永, 廖伯寿. 野生花生脂肪酸组成的遗传变异及远缘杂交创造高油酸低棕榈酸花生新种质. *作物学报*, 2009, 35: 25–32.
- Jiang H F, Ren X P, Huang J Q, Lei Y, Liao B S. Genetic variation of fatty acid components in *Arachis* species and development of interspecific hybrids with high oleic and low palmitic acids. *Acta Agron Sin*, 2009, 35: 25–32 (in Chinese with English abstract).
- [21] 于明洋, 孙明明, 郭悦, 姜平平, 雷永, 黄冰艳, 冯素萍, 郭宝珠, 隋炯明, 王晶珊. 利用回交法快速选育高油酸花生新品系. *作物学报*, 2017, 43: 855–861.
- Yu M Y, Sun M M, Guo Y, Jiang P P, Lei Y, Huang B Y, Feng S P, Guo B Z, Sui J M, Wang J S. Breeding new peanut line with high oleic acid content using backcross method. *Acta Agron Sin*, 2017, 43: 855–861 (in Chinese with English abstract).
- [22] 陈四龙. 花生油脂合成相关基因的鉴定与功能研究. 中国农业科学院研究生院博士学位论文, 北京, 2012, pp 60–61.
- Chen S L. Identification and Functional Analysis of Lipid Biosynthesis Related Genes in Peanut (*Arachis hypogaea* L.). PhD Dissertation of Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China, 2012, pp 60–61 (in Chinese with English abstract).
- [23] Li F P, Ma C Z, Wang X, Gao C B, Zhang J F, Wang Y Y, Cong N, Li X H, Wen J, Yi B, Shen J X, Tu J X, Fu T D. Characterization of sucrose transporter alleles and their association with seed yield-related traits in *Brassica napus* L. *BMC Plant Biol*, 2011, 11: 168.
- [24] Zaborowska Z, Starzycki M, Femiak I, Swiderski M, Legocki A B. Yellow lupine gene encoding stearyl-ACP desaturase: organization, expression and potential application. *Acta Biochim Pol*, 2002, 49: 29–42.
- [25] Bruner A C, Jung S, Abbott A G, Powell G L. The naturally occurring high oleate oil character in some peanut varieties results

- from reduced oleoyl-PC desaturase activity from mutation of aspartate 150 to asparagine. *Crop Sci*, 2001, 41: 522–526.
- [26] 官梅, 李桐, 官春云. 利用基因芯片技术研究甘蓝型油菜油酸合成中差异表达基因. 作物学报, 2010, 36: 968–978.
- Guan M, Li X, Guan C Y. Differentially expressed genes in oleic acid synthesis of *Brassica napus* by detected gene chip. *Acta Agron Sin*, 2010, 36: 968–978 (in Chinese with English abstract).
- [27] 李玉兰, 孙勤富, 王幼平. 植物油脂合成的转录调控研究进展. 分子植物育种, 2016, 14: 2509–2518.
- Li Y L, Sun Q F, Wang Y P. Research advance in transcriptional regulation of lipid synthesis and accumulation in plant. *Mol Plant Breed*, 2016, 14: 2509–2518 (in Chinese with English abstract).
- [28] Maeo K, Tokuda T, Ayame A, Mitsui N, Kawai T, Tsukagoshi H, Ishiguro S, Nakamura K. An AP2-type transcription factor, WRINKLED1, of *Arabidopsis thaliana* binds to the AW-box sequence conserved among proximal upstream regions of genes involved in fatty acid synthesis. *Plant J*, 2009, 60: 476–487.
- [29] Fukuda N, Ikawa Y, Aoyagi T, Kozaki A. Expression of the genes coding for plastidic acetyl-CoA carboxylase subunits is regulated by a location-sensitive transcription factor binding site. *Plant Mol Biol*, 2013, 82: 473–483.