研究论著

DOI: 10.3969/j.issn.0253-9802.2023.11.008

不同体格测量指标与2型糖尿病发病风险关系的病例对照研究

陈佩妍 叶艳彬 卓淑雨 卢味

【摘要】 目的 探讨不同体格测量指标与2型糖尿病发病风险之间的关系,为早期预防2型糖尿病提供科学依据。方法 纳入299对2型糖尿病患者和健康对照。运用Logistic回归模型分析BMI、腰围、腰臀比和腰围身高比与2型糖尿病发病风险之间的关系。结果 在校正可能的混杂因素后,与正常组(BMI 18.5~23.9 kg/m²)相比,超重和肥胖组(BMI 24.0~27.9 kg/m²和≥28.0 kg/m²)发生2型糖尿病风险的OR(95%CI)值分别是2.35(1.56~3.57)和6.47(2.92~14.33)。相比于正常腰围组(男<85 cm,女<80 cm),中心性肥胖前期组(男85~89.9 cm,女80~84.9 cm)和中心性肥胖组(男≥90 cm,女≥85 cm)发生2型糖尿病风险的OR值(95%CI)分别是2.99(1.81~4.95)和3.88(2.43~6.22)。腰臀比最高组(Q4)和腰围身高比最高组(Q4)发生2型糖尿病的风险是最低组(Q1)的4.35倍与3.45倍(95%CI: 2.48~7.64, 1.94~6.14, P<0.001)。结论 超重、全身性肥胖、中心性肥胖前期和中心性肥胖可能增加2型糖尿病的发病风险。

【关键词】 肥胖;体格测量指标;BMI;腰围;腰围身高比;腰臀比;2型糖尿病

Relationship between different anthropometric parameters and risk of type 2 diabetes mellitus: a case-control study Chen Peiyan[△], Ye Yanbin, Zhuo Shuyu, Lu Wei. [△]Department of Clinical Nutrition, the First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China

Corresponding author, Ye Yanbin, E-mail: yanbinye72@163.com

【Abstract】 Objective To investigate the association between different anthropometric parameters and the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM), aiming to provide scientific evidence for early prevention of T2DM. **Methods** 299 pairs of T2DM patients and healthy controls were recruited in this case-control study. Logistic regression models were used to analyze the association between BMI, waist circumference (WC), waist-hip ratio (WHR) and waist-to-height ratio (WHtR) and the risk of T2DM. **Results** After potential confounding factors were adjusted, compared with the healthy BMI group (BMI 18.5-23.9 kg/m²), the odds ratio (OR, 95%CI) in the overweight (BMI 24.0-27.9 kg/m²) and obesity groups (BMI≥28.0 kg/m²) was 2.35 (1.56-3.57) and 6.47 (2.92-14.33), respectively. Compared with the normal WC (male < 85 cm, female < 80 cm), the OR (95%CI) of T2DM risk in the pre-central (male 85-89.9 cm, female 80-84.9 cm) and central obesity (male ≥ 90 cm, female ≥ 85 cm) groups was 2.99 (1.81, 4.95) and 3.88 (2.43, 6.22), respectively. The risk of T2DM was 4.35 times (95%CI: 2.48-7.64, P<0.001) higher in the highest WHR group (Q4) and 3.45 times (95%CI: 1.94-6.14, P<0.001) higher in the highest WHtR group (Q4) compared with those in the lowest WHR and WHtR groups (Q1). **Conclusion** Overweight, general obesity, pre-central and central obesity may increase the risk of T2DM.

【Key words】 Obesity; Anthropometric parameter; BMI; Waist circumference; Waist-to-height ratio; Waist-hip ratio; Type 2 diabetes mellitus

2型糖尿病是世界范围内常见的慢性非传染性疾病之一^[1]。2017年我国糖尿病患者率达到12.8%,患病人数已超过1亿人^[2]。超重和肥胖是2型糖尿病发生发展的重要危险因素,尤其是中心性肥胖中内脏脂肪引起的胰岛素抵抗在糖尿病

病因学上具有重要意义^[1]。不同体格测量指标,如BMI、腰围(WC)、腰臀比(WHR)、腰围身高比(WHtR)均可反映成人机体中脂肪的分布,BMI主要反映全身体质量与身高的关系,WC、WHR及WHtR主要反映腹部脂肪的堆积情况,且各指

作者单位:510080 广州,中山大学附属第一医院临床营养科(陈佩妍,卓淑雨,卢味);510630 广州,暨南大学附属第一医院临床营养科(叶艳彬)

通信作者,叶艳彬, E-mail: yanbinye72@163.com

标对2型糖尿病具有不同的预测价值^[36]。因此,本研究通过病例对照研究探讨不同体格测量指标与2型糖尿病发病风险之间的关联,为我国早期预防2型糖尿病的发生提供流行病学依据。

对象与方法

一、研究对象

本研究为广州居民营养与健康队列研究的子项研究,采用1:1频数匹配病例对照设计方法,在年龄(± 2 岁)和性别上对病例组与对照组进行匹配。病例组来源为中山大学附属第一医院内分泌科2011年5月至2012年2月招募的门诊或住院患者。纳入标准:①年龄18~80岁;②2型糖尿病诊断符合美国糖尿病2007版诊断标准;③首次诊断为2型糖尿病,未接受药物和膳食干预治疗;④首次诊断至进入研究时间间隔在3个月以内^[7]。对照组来源为同时期在广州社区招募的健康居民。纳入标准:①年龄18~80岁;②没有被诊断为糖尿病或糖耐量异常。排除标准:①有器官功能严重损害(心、肺、肝、肾、神经、甲状腺或其他内分泌功能异常等);②近一年服用过糖皮质激素类药物;③体格测量资料缺失。本研究通过中山大学附属第一医院科研项目伦理审查(批件号:[2017]020)。所有参与者均对本研究知情同意。

二、研究内容

调查员统一使用规范的测量方法和同型号的量尺、体重秤(Seca Mod 220, Germany)来测量2组的身高(cm)、体质量(kg)、WC(cm)、臀围(cm)等。计算BMI、WHR、WHtR, $BMI = \text{体质量}(\text{kg}) / \text{身高}^2(\text{m}^2)$, $WHR = WC(\text{cm}) / \text{臀围}(\text{cm})$, $WHtR = WC(\text{cm}) / \text{身高}(\text{cm})$ 。参考中华人民共和国卫生行业标准《成人体重判定》(WS/T 428—2013)将病例组与对照组进一步分组,以 $BMI < 18.5 \text{ kg/m}^2$ 、 $18.5 \sim 23.9 \text{ kg/m}^2$ 、 $24.0 \sim 27.9 \text{ kg/m}^2$ 、 $\geq 28.0 \text{ kg/m}^2$ 为消瘦、正常、超重、肥胖;以 WC 男性 $< 85 \text{ cm}$ 、 $85 \sim 89.9 \text{ cm}$ 、 $\geq 90 \text{ cm}$, 女性 $< 80 \text{ cm}$ 、 $80 \sim 84.9 \text{ cm}$ 、 $\geq 85 \text{ cm}$ 为非中心性肥胖、中心性肥胖前期、中心性肥胖^[8]。以对照组性别分层,对研究对象的WHR、WHtR分别根据四分位数(Q1~Q4组)分组。

采用统一的问卷调查记录研究对象的社会人口学特征,包括年龄、性别、婚姻状况、家庭人

均月收入、文化程度、吸烟、饮酒、饮茶情况等。本研究中吸烟者定义为连续6个月或以上,每日至少抽1支烟;饮酒者定义为连续6个月或以上,每周至少饮用1次酒,包括白酒、啤酒等。采用食物频率问卷(FFQ)调查研究对象近1年的膳食情况,计算平均每日能量的总摄入量(kcal/d)。采用一份19个条目的量表来评估体力活动,并通过公式计算平均每日的总代谢值(MET-h/d)。

三、统计学处理

使用SPSS 24.0软件对数据进行统计分析。符合正态分布的年龄、BMI、WC、WHR、WHtR的连续型变量以 $\bar{x} \pm s$ 表示;不符合正态分布的总能量、体力活动水平变量以 $M(P_{25}, P_{75})$ 表示;性别、婚姻情况、受教育程度、吸烟、饮酒、饮茶等分类变量以率等指标来表示。病例组与对照组的年龄、WC、WHR、WHtR的比较采用 t 检验,总能量、体力活动水平的比较采用Wilcoxon秩和检验,分类变量比较采用 χ^2 检验。采用Pearson相关系数分析不同体格测量指标之间的相关性。采用Logistic回归分析BMI、WC、WHR、WHtR与2型糖尿病发病风险之间的关系,方程中以BMI($18.5 \sim 23.9 \text{ kg/m}^2$)、腰围(男性 $< 85 \text{ cm}$, 女性 $< 80 \text{ cm}$)、WHR(Q1)、WHtR(Q1)为参照,计算OR和95%CI。为进一步观察其关联趋势,将研究对象按照性别(男、女)和能量来分层(低能量 $\leq 1850 \text{ kcal/d}$, 高能量 $> 1850 \text{ kcal/d}$),并采用模型2进行分析。采用双侧检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

一、一般情况

病例组和对照组年龄、性别、吸烟史、饮酒史、饮茶史和体力活动水平比较差异无统计学意义($P > 0.05$)。病例组家庭人均月收入、能量摄入高于对照组,而受教育程度低于对照组(P 均 < 0.05)。病例组的体质量、BMI、WC、WHR、WHtR均高于对照组(P 均 < 0.001)。见表1。

二、不同肥胖指标间的相关性

WC与BMI、WHR呈正相关($r > 0.819$, $P < 0.001$); BMI与WHR相关($r = 0.487$, $P < 0.001$),腰围身高比与BMI、WC、WHR的相关性均较低(r 分别为0.236、0.288、0.225, $P < 0.001$)。

表1 病例组与对照组一般资料比较

项目	病例组 (299 例)	对照组 (299 例)	<i>t</i> / <i>Z</i> / χ^2 值	<i>P</i> 值
年龄 / 岁	58.8 ± 7.7	58.7 ± 7.1	-0.243	0.808
女性 / 例 (%)	200 (66.9)	200 (66.9)	—	—
受教育程度 / 例 (%)			11.447	0.001
初中及以下	134 (44.8)	95 (31.8)		
高中及以上	162 (54.2)	204 (68.2)		
家庭人均月收入 / 例 (%)			25.444	<0.001
0~3 000 元	189 (63.2)	245 (81.9)		
≥ 3 001 元	107 (35.8)	53 (17.7)		
吸烟 / 例 (%)	68 (22.7)	52 (17.4)	2.738	0.098
饮酒 / 例 (%)	31 (10.4)	22 (7.4)	1.921	0.166
饮茶 / 例 (%)	160 (53.5)	166 (55.5)	0.129	0.720
能量摄入 / (kcal/d)	2 132.7 (1 688.1, 2 612.8)	1 850.9 (1 566.3, 2 210.9)	-4.691	<0.001
体力活动 / (MET-h/d)	32.3 (28.1, 37.2)	32.2 (27.4, 38.6)	-0.319	0.750
体质量 /kg	61.6 ± 10.0	58.3 ± 10.1	-3.923	<0.001
BMI / (kg/m ²)	24.1 ± 3.4	22.9 ± 3.0	-4.518	<0.001
WC/cm	86.2 ± 8.9	82.1 ± 9.3	-5.656	<0.001
WHR	0.91 ± 0.07	0.88 ± 0.07	-3.043	<0.001
WHtR	0.56 ± 0.30	0.52 ± 0.06	-2.365	0.018

三、不同肥胖指标与 2 型糖尿病的关系

在校正可能的混杂因素后,发现超重、全身性肥胖和中心性肥胖均能增加 2 型糖尿病的发病风险。相比于正常者,超重与肥胖者发生 2 型糖尿病风险的 OR 值 (95%CI) 分别为 2.35 (1.56, 3.57) 和 6.47 (2.92, 14.33)。相比于非中心性肥胖者,中心性肥胖前期和中心性肥胖者发生 2 型糖尿病风险的 OR 值 (95%CI) 分别为 2.99 (1.81, 4.95) 和 3.88 (2.43, 6.22)。WHR 最高组 (Q4) 和 WHtR 最高组 (Q4) 发生 2 型糖尿病的风险是相应最低组 (Q1) 的 4.35 倍和 3.45 倍 (95%CI: 2.48~7.64, 1.94~6.14, $P < 0.001$)。消瘦对 2 型糖尿病的影响差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 见表 2。各指标进一步调整 BMI、WC、WHR 或 WHtR 后显示,超重、肥胖、中心性肥胖前期和中心性肥胖与 2 型糖尿病发病风险的关联程度减弱;而在进一步调整 BMI 或 WC 的模型中,WHR 和 WHtR 对 2 型糖尿病的发病风险的 OR 值 (Q2~Q4) 无统计学意义。见图 1。

四、性别、能量摄入对不同肥胖指标与 2 型糖尿病之间关系的影响

在不同性别和不同能量摄入组人群中,随着 BMI、WC、WHR、WHtR 的增加,2 型糖尿病的发病风险呈增加趋势,且在不同性别组间的关联趋势相似。与能量 $\leq 1\ 850$ kcal/d 者相比, $>1\ 850$ kcal/d

者的 BMI、WHR、WHtR 与 2 型糖尿病的发病风险关联强度逐渐降低,而在 WC 指标中,关联强度相似。见表 3。

讨 论

超重和肥胖是 2 型糖尿病发生的重要危险因素,同时也是可以被早期干预的重要因素。本研究显示,BMI、WC、WHR、WHtR 与 2 型糖尿病的发病风险呈正相关,且指标数值每增加一个标准差,糖尿病的发生风险也随之增加。机体中脂肪组织的不断增长使得瘦素、脂联素等脂肪因子分泌异常、局部及全身产生慢性炎症、高游离脂肪酸血症及肝脏、骨骼肌脂质异位沉积,进而干扰胰岛素的转导,参与胰岛素抵抗的发生,最终导致肥胖者,尤其是中心性肥胖者更容易发生 2 型糖尿病^[1,9]。

BMI、WC、WHR、WHtR 不仅是评价身体超重与肥胖的常用指标,也是预测慢性代谢性疾病的敏感指标。BMI 是评价全身性肥胖的体格指标,而 WC、WHR 是评价腹部内脏脂肪的良好指标,并且指标间对疾病的发生发展存在互补作用。Ashwell 等 (2012 年) 的研究表明,BMI、WC、WHR 与心血管疾病、2 型糖尿病发病风险,甚至是死亡风险呈正相关,而中心性肥胖是其风险升高的独立危险因素。与其他研究结果一致,本研究显示,在模

表 2 不同体格指标与 2 型糖尿病的关系

项 目	组别 1	组别 2	组别 3	组别 4	每增加 1 个标准差
BMI	正常	消瘦	超重	肥胖	1.75 (1.40, 2.20)
模型 1	1.00	0.65 (0.31, 1.34)	1.86 (1.30, 2.67)	4.15 (2.08, 8.28)	
模型 2	1.00	0.59 (0.27, 1.31)	2.35 (1.56, 3.57)	6.47 (2.92, 14.33)	
WC	非中心性肥胖	中心性肥胖前期	中心性肥胖		2.01 (1.59, 2.53)
模型 1	1.00	2.51 (1.61, 3.92)	3.04 (2.07, 4.45)	—	
模型 2	1.00	2.99 (1.81, 4.95)	3.88 (2.43, 6.22)	—	
WHR	Q1	Q2	Q3	Q4	1.80 (1.45, 2.23)
模型 1	1.00	1.89 (1.12, 3.19)	1.78 (1.06, 3.00)	3.91 (2.38, 6.43)	
模型 2	1.00	2.05 (1.16, 3.63)	2.08 (1.18, 3.68)	4.35 (2.48, 7.64)	
WHtR	Q1	Q2	Q3	Q4	8.74 (3.90, 19.55)
模型 1	1.00	1.08 (0.64, 1.84)	2.46 (1.51, 4.01)	2.82 (1.73, 4.59)	
模型 2	1.00	1.04 (0.58, 1.86)	2.58 (1.49, 4.47)	3.45 (1.94, 6.14)	

注:模型 1 中调整年龄和性别;模型 2 中调整年龄、性别(男、女)、受教育程度(初中及以下、高中及以上)、家庭人均月收入[≤3 000 元/(月·人)、>3 000 元/(月·人)]、吸烟(是、否)、饮酒(是、否)、能量摄入(kcal/d)和体力活动水平(MET-h/d)。

注: A~D 分别表示 BMI、腰围、腰臀比和腰围身高比与 2 型糖尿病发病风险的关联。Logistic 回归模型中基础调整年龄、性别(男、女)、受教育程度(初中及以下、高中及以上)、家庭人均月收入[≤3 000 元/(月·人)、>3 000 元/(月·人)]、吸烟(是、否)、饮酒(是、否)、能量摄入和体力活动水平。

图 1 不同模型下 BMI、腰围、腰臀比和腰围身高比与 2 型糖尿病发病风险的关联

型中进一步调整 BMI、WC、WHR 后,各指标与 2 型糖尿病风险的关联趋势不变,而关联强度(OR 值)有所减弱。在进一步调整 BMI、WC、WHR 时,WHtR 对 2 型糖尿病的影响作用消失,指标间相关性较低,可能的解释是 WHtR 排除了不同性别、身高的影响,主要反映了中心性肥胖情况,尤其是内脏脂肪对糖尿病的生物作用^[5,10]。

在本研究中,无论是男性还是女性,高 BMI、WC、WHR 和 WHtR 者 2 型糖尿病的发病风险增

加,且女性是男性的 1~2 倍,即使交互作用无统计学意义。流行病学资料显示,我国 55 岁以上的女性人群 BMI、WC 比男性人群更高,相应发生代谢性疾病的风险更高^[11]。其可能的原因与女性绝经后体内激素和生活方式的改变有关^[12]。此外,能量摄入分层分析显示,低能量组的超重、肥胖者发生 2 型糖尿病的风险是高能量组的 1.5~2 倍。2 型糖尿病是由基因和多种环境因素综合影响导致的慢性疾病,包括老龄化、肥胖、中心性肥胖、高

表3 性别、能量摄入对不同体格指标与2型糖尿病发病风险的影响

项 目	组别 1	组别 2	组别 3	组别 4	<i>P</i> 交互作用
BMI	正常	消瘦	超重	肥胖	
男	1.00	0.97 (0.25, 3.81)	1.86 (0.90, 3.82)	4.96 (1.16, 21.20)	0.203
女	1.00	0.42 (0.14, 1.25)	2.51 (1.49, 4.24)	8.27 (3.06, 22.34)	
低能量	1.00	0.36 (0.11, 1.23)	3.11 (1.62, 5.96)	8.44 (2.49, 28.68)	0.100
高能量	1.00	0.96 (0.29, 3.20)	1.77 (1.02, 3.06)	5.50 (1.91, 15.79)	
WC	非中心性肥胖	中心性肥胖前期	中心性肥胖		
男	1.00	2.70 (1.04, 7.00)	3.54 (1.52, 8.22)	—	0.462
女	1.00	3.29 (1.79, 6.06)	4.11 (2.29, 7.38)	—	
低能量	1.00	2.95 (1.39, 6.23)	4.32 (2.10, 8.93)	—	0.436
高能量	1.00	3.09 (1.53, 6.23)	3.67 (1.95, 6.91)	—	
WHR	Q1	Q2	Q3	Q4	
男	1.00	1.34 (0.48, 3.72)	1.29 (0.48, 3.45)	4.30 (1.63, 11.36)	0.724
女	1.00	2.27 (1.11, 4.64)	2.40 (1.17, 4.94)	4.34 (2.12, 8.90)	
低能量	1.00	1.72 (0.68, 4.32)	2.45 (0.98, 6.11)	5.24 (2.06, 13.33)	0.255
高能量	1.00	2.58 (1.20, 5.56)	1.87 (0.88, 3.98)	3.92 (1.90, 8.09)	
WHtR	Q1	Q2	Q3	Q4	
男	1.00	0.65 (0.235, 1.79)	2.08 (0.78, 5.55)	2.69 (0.99, 7.31)	0.463
女	1.00	1.32 (0.63, 2.78)	2.94 (1.47, 5.91)	4.00 (1.92, 8.34)	
低能量	1.00	1.29 (0.50, 3.35)	2.71 (1.15, 6.37)	5.14 (2.09, 12.62)	0.145
高能量	1.00	0.89 (0.41, 1.91)	2.64 (1.24, 5.62)	2.59 (1.20, 5.58)	

注:调整年龄、性别(男、女)、受教育程度(初中及以下、高中及以上)、家庭人均月收入[$\leq 3\ 000$ 元/(月·人)、 $>3\ 000$ 元/(月·人)]、吸烟(是、否)、饮酒(是、否)、能量摄入(kcal/d)和体力活动水平(MET-h/d)。

血脂、不健康的膳食结构、吸烟、久坐方式、妊娠糖尿病等^[3]。因此,超重和肥胖者不仅需要限制膳食能量摄入,还需要进一步调整膳食结构、改变生活方式来降低体质量,从而减少2型糖尿病的发病风险。

为了减少混杂偏倚,本研究采用病例对照的研究方式,按照性别和年龄来进行1:1的频数匹配,收集完善调查资料,并在回归分析中校正可能的混杂因素,并进行了分层分析。此外,回顾性研究难以避免回忆偏倚,并且不能排除BMI、WC、WHR、WHtR与2型糖尿病发病风险的反向因果关系。但糖尿病初发时的临床特征以多饮、多尿、多食及消瘦为主,此外,研究中的病例组主要纳入初发糖尿病患者,未经过膳食和药物治疗干预,因此在测量体质量和WC等数据时会存在信息偏倚,可能造成低估不同肥胖指标与糖尿病发病风险之间的关联。未来仍需要进行更多的研究来探讨两者之间的关联。

综上所述,本研究显示超重、全身性肥胖、中心性肥胖前期和中心性肥胖与2型糖尿病的发病风险呈正相关。倡导维持正常体质量,利用不同体格测量指标来评估身体体型,早期减重,对

于降低2型糖尿病发病风险具有重大的公共卫生意义。

参 考 文 献

- [1] DeFronzo R A, Ferrannini E, Groop L, et al. Type 2 diabetes mellitus. *Nat Rev Dis Primers*, 2015, 1: 15019.
- [2] Li Y, Teng D, Shi X, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study. *BMJ*, 2020, 369: m997
- [3] Browning L M, Hsieh S D, Ashwell M. A systematic review of waist-to-height ratio as a screening tool for the prediction of cardiovascular disease and diabetes: 0.5 could be a suitable global boundary value. *Nutr Res Rev*, 2010, 23 (2): 247-269.
- [4] 王文娟, 王克安, 李天麟, 等. 体重指数、腰围和腰臀比预测高血压、高血糖的实用价值及其建议值探讨. *中华流行病学杂志*, 2002, 23 (1): 16-19.
- [5] Kodama S, Horikawa C, Fujihara K, et al. Comparisons of the strength of associations with future type 2 diabetes risk among anthropometric obesity indicators, including waist-to-height ratio: a meta-analysis. *Am J Epidemiol*, 2012, 176 (11): 959-969.
- [6] Ashwell M, Hsieh S D. Six reasons why the waist-to-height ratio is a rapid and effective global indicator for health risks of obesity and how its use could simplify the international public health

- message on obesity. *Int J Food Sci Nutr*, 2005, 56 (5): 303-307.
- [7] Association A D. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*, 2009, 32 (Supplement_1): S62-S67.
- [8] 国家卫生和计划生育委员会. WS/T 428—2013 成人体重判定 2013.
- [9] 宋梭, 赵家军. 肥胖致胰岛素抵抗的机制研究新进展. *中国老年学杂志*, 2013, 33 (17): 4359-4361.
- [10] Wu H Y. Waist to height ratio as a predictor of abdominal fat distribution in men. *Chin J Physiol*, 2009, 52 (6): 441-445.
- [11] Hu L, Huang X, You C, et al. Prevalence of overweight, obesity, abdominal obesity and obesity-related risk factors in Southern China. *PLoS One*, 2017, 12 (9): e0183934.
- [12] Sternfeld B, Bhat A K, Wang H, et al. Menopause, physical activity, and body composition/fat distribution in midlife women. *Med Sci Phys Exerc*, 2005, 37 (7): 1195-1202.

(收稿日期: 2023-02-26)

(本文编辑: 洪悦民)