生长素代谢与信号转导及其调控种子休眠与萌发的分子机制

宋松泉^{1,2*}, 刘军², 唐翠芳³, 张文虎², 徐恒恒², 张琪², 高家东²

1. 中国科学院植物研究所, 北京 100093;

2. 广东省农作物种质资源保存与利用重点实验室/广东省农业科学院农业生物基因研究中心, 广州 510640;

3. 深圳前海国垦大地基金管理有限公司, 广州 510630

* 联系人, E-mail: sqsong@ibcas.ac.cn

2020-04-30 收稿, 2020-06-12 修回, 2020-06-12 接受, 2020-06-15 网络版发表

国家科技支撑计划(2012BAC01B05)、广东省农作物种质资源保存与利用重点实验室项目(2020B121201008)和国家自然科学基金(31871716)资助

摘要 种子萌发是一个由遗传和环境因子共同调控的复杂过程, 其中植物激素调节可能是种子植物萌发过程中的一种高度保守的机制. 生长素是植物中的一种最重要的信号分子, 调控植物生长发育的各个方面, 包括形态发生和对环境变化的响应等. 生长素通过多条平行的途径被生物合成和失活, 也通过典型和非典型途径被感受和转导. 生长素在种子休眠和萌发中的作用主要受其生物合成与分解代谢以及信号转导途径的调控. 本文主要综述了生长素的生物合成与代谢、生长素的信号转导以及它们对种子休眠与萌发的调控的研究进展. 此外, 我们也提出了在本领域需要进一步研究的科学问题, 试图为解释生长素调控种子休眠与萌发的分子机理提供参考.

关键词 生长素, 休眠, 萌发, 代谢, 种子, 信号转导

萌发是将静止的种子转化为具有高代谢活性的幼苗, 是种子植物生命周期中的关键步骤, 是植物进入生态系统以及在适宜的条件下生长与繁育的前提. 在农业生产中, 迅速一致的种子萌发是作物高产优质的必要条件. 种子通过后熟(干藏)或者在物种专一的温度下吸胀(层积)解除休眠并促进萌发. 种子萌发是一个复杂的多步骤过程, 在这个过程中静止的干燥种子迅速恢复其代谢活性, 完成胚伸出周围结构的细胞事件, 为随后的幼苗生长做准备^[1,2].

种子萌发由遗传和环境因素共同决定, 其中休眠释放与萌发的激素调控可能是种子植物中的一种高度保守的机制^[2,3]. 研究表明, 脱落酸(abscisic acid, ABA)和赤霉素(gibberellin, GA)在种子萌发中起重要作用

用^[4,5]. 外源ABA抑制种子萌发, ABA生物合成或者信号转导缺失的突变体增加种子的萌发率, 脱落酸不敏感因子(abscisic acid insensitive, ABI)ABI1、ABI2、ABI3、ABI4和ABI5对种子萌发有抑制作用^[6-8]. 相反, 外源GA促进种子萌发. GA突变体, 如ga1和ga2表现出种子萌发延迟或者缺陷, GA信号转导必需的DELLA (Asp-Glu-Leu-Leu-Ala)蛋白RGA(repressor of GA)、GAI(gibberellic acid insensitive)和RGL2(RGA-like 2)在种子萌发中起负调控作用^[9-11]. 除ABA和GA外, 植物激素生长素(auxin)^[12,13]、乙烯(ethylene)^[14,15]和细胞分裂素(cytokinin)^[16]也在种子休眠释放和萌发中起重要作用.

生长素是植物中的一种重要的信号分子, 几乎调控

引用格式: 宋松泉, 刘军, 唐翠芳, 等. 生长素代谢与信号转导及其调控种子休眠与萌发的分子机制. 科学通报, 2020, 65: 3924–3943

Song S Q, Liu J, Tang C F, et al. Metabolism and signaling of auxins and their roles in regulating seed dormancy and germination (in Chinese). Chin Sci Bull, 2020, 65: 3924–3943, doi: 10.1360/TB-2020-0509

植物生长发育的所有方面,包括形态发生和对环境变化的响应等。细胞内适宜的生长素浓度促进细胞的分裂、生长和分化,从而影响器官的形成、生长以及最终的植物形态^[17]。生长素通过多条平行的途径被合成、储存和失活^[18],也通过典型和非典型途径进行感受和转导^[19,20]。种子休眠与萌发的调控也取决于细胞中的生长素浓度以及细胞(组织)对生长素的敏感性。外源高浓度的生长素(0.3~1 $\mu\text{mol/L}$ 吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid, IAA))抑制拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)种子的萌发^[21],而低浓度的生长素(0.03~3 nmol/L IAA)促进种子萌发和幼苗形成^[22]。生长素反应因子(auxin response factor, ARF)10/16通过介导*ABI3*的表达作为ABA信号途径的正调控因子起作用,*arf10 arf16*双突变体表现出种子萌发对ABA不敏感^[12]。表达*maRF10*(miR160-resistant form of *ARF10*)的转基因种子对外源ABA的萌发抑制过敏,而*miR160*的异位表达导致其对ABA的敏感性降低^[21]。转录组研究表明,在*gal*突变体种子中, GA_4 处理显著上调生长素运输载体基因*AUX1*(*AUXIN RESISTANT 1*)、*PIN2*(*PIN-FORMED 2*)和*PIN7*的表达^[23]。*AUX1*是ABA抑制种子萌发所必需的,其功能缺失突变体表现出对ABA的抗性增加^[24]。此外,与休眠种子比较,后熟种子中生长素输出和输入运输载体都被上调表达^[25],表明生长素运输载体也在种子萌发中起作用。这些结果表明,不同的生长素信号转导途径通过影响ABA和/或GA信号转导途径参与种子萌发。近几年来,生长素的生物合成与代谢,尤其是生长素信号转导途径的研究取得了重要的进展^[26~28]。本文主要综述生长素的生物合成与分解代谢、生长素的信号转导,以及它们对种子休眠与萌发调控的研究进展。此外,我们也提出了在本领域需要进一步研究的科学问题,试图为解释生长素调控种子休眠与萌发的分子机理提供参考。

1 生长素的生物合成和分解代谢

1.1 生长素的生物合成

IAA是植物中最丰富的内源生长素,通过多条平行的途径被生物合成(图1)^[17,18]。尽管植物中还存在其他的内源生长素,如4-Cl-IAA(4-chloro-IAA)和苯乙酸(phenylacetic acid, PAA)等,但它们在植物物种中的分布不普遍,且具有非常弱的生长素效应^[29]。研究发现,色氨酸(tryptophan, Trp)是植物和细菌中IAA合成的共同前体^[18]。在植物中,Trp是在叶绿体中由莽草酸途径

(shikimate pathway)的最终产物分支酸(chorismate)产生的^[30]。拟南芥色氨酸氨基转移酶(tryptophan aminotransferase, TAA)和YUCCA(YUC)黄素单加氧酶家族(flavin-containing monooxygenase family)由Trp通过吲哚-3-丙酮酸(indole-3-pyruvate, IPA)产生IAA(图1)^[18,31,32]。遗传和生物化学研究表明,TAA和YUC家族在不同植物的IAA生物合成中起关键作用,包括拟南芥、玉米(*Zea mays*)、水稻(*Oryza sativa*)和地钱(*Marchantia polymorpha*)^[33~35]。此外,在拟南芥IAA和吲哚硫代葡萄糖苷(indole glucosinolate, IG)生物合成的最初步骤中,Cyt P450单加氧酶(cytochrome P450 monooxygenase)CYP79B2和CYP79B3催化Trp转化成为吲哚-3-乙醛肟(indole-3-acetaldoxime, IAOx),但随后产生IAA的途径仍然不够清楚(图1)^[18,36]。吲哚-3-乙酰胺(indole-3-acetaldoxime, IAM)、吲哚-3-乙醛(indole-3-acetaldehyde, IAAld)和色胺(tryptamine, TAM)也被认为是从Trp产生IAA的前体,但与这些中间产物生物合成有关的途径也不清楚(图1)^[18,34,37]。

1.1.1 IPA途径合成IAA

在植物中,评价IAA生物合成途径的关键标准包括:(1)基因鉴定;(2)酶活性测定;(3)代谢产物定量;(4)生理作用分析;(5)在植物物种中的分布(表1)^[18]。根据这些标准,IPA途径是植物中第一个完整的和普遍保守的IAA生物合成途径(图1,表1)^[18,31,33,34]。

在拟南芥中,TAA1由*SAV3/WEI8/TIR2*(*SHADE AVOIDANCE 3/WEAK ETHYLENE INSENSITIVE 8/TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 2*)基因编码,在IPA途径的第一步起作用^[38,39]。体外重组的TAA1蛋白催化Trp转化成为IPA^[38]。拟南芥中,TAR1(TAA1-related 1)和TAR2作为Trp氨基转移酶具有冗余作用^[38]。在TAA家族缺失的拟南芥突变体中,内源IAA和IPA的含量减少^[31,32];相反,TAA1的表达增加,内源IPA的水平升高^[31]。TAA1和TAR基因的多重突变在不同的生物学过程中引起严重的生长素缺陷表型,包括胚胎发生、花发育、幼苗生长、维管模式、侧根形成、向性、避荫和温度依赖的下胚轴伸长等^[38,39],表明TAA家族在植物的生长和发育中起重要作用。TAA基因家族的直系同源基因广泛分布于维管和非维管植物中,表明TAA基因在植物界的进化中是高度保守的(表1)^[18,35]。例如,VT2(*VANISHING TASSEL 2*)和FIB(*FISH BONE*)基因分别是玉米和水稻中TAA家族的共直系同源基因(co-ortholog),这些基因的突变导致IAA水平降低,引起多效性

图1 拟南芥IAA生物合成途径和次生代谢途径的图解模型^[18]。常见的色氨酸生物合成途径和吲哚-3-丙酮酸途径用蓝色表示，拟南芥中的吲哚-3-乙醛途径用绿色表示，吲哚-3-乙酰胺途径用紫色表示，色胺途径用灰色表示，Trp不依赖的途径用红色表示，拟南芥中的次生代谢途径用棕色表示。陆生植物中高度保守的IPA途径用方框围住。已鉴定的酶反应步骤用粗体字表示。有待证实的酶反应步骤用虚线箭头表示。ANT, 氨基苯甲酸; GB, 芸薹葡萄糖硫苷; IAA, 吲哚-3-乙酸; IAAld, 吲哚-3-乙醛; IAN, 吲哚-3-乙腈; IGP, 吲哚-3-甘油磷酸; IND, 吲哚; AAO, 醛氧化酶; CYP79B2/3, 细胞色素P450单氧化酶2/3; IMI1, 酰胺酶1; INS, 吲哚合酶; NIT, 腈水解酶; SUR1/2, SUPERROOT1/2; TAA, 色氨酸氨基转移酶; TRP3/TSA1, 色氨酸合酶 α -亚基; TRP2/TSB1, 色氨酸合酶 β -亚基; VAS1, 吡哆醛磷酸依赖的氨基转移酶1; YUC, YUCCA黄素单加氧酶

Figure 1 A schematic model of the IAA biosynthetic pathways and secondary metabolic pathways in *Arabidopsis*^[18]. The common tryptophan biosynthesis and indole-3-pyruvate pathways are shown in blue, the indole-3-acetaldoxime pathway in *Arabidopsis* is shown in green, the indole-3-acetamide pathway is shown in purple, the tryptamine pathway is shown in gray, the Trp-independent pathway is shown in red, and secondary metabolite pathways in *Arabidopsis* are shown in brown. The IPA pathway that is highly conserved in land plants is enclosed in the box. Characterized enzyme reaction steps are in bold typeface. Enzyme reaction steps remaining to be clarified are shown by dashed arrows. ANT, anthranilate; GB, glucobrassicin; IAA, indole-3-acetic acid; IAAld, indole-3-acetaldehyde; IAN, indole-3-acetonitrile; IGP, indole-3-glycerol phosphate; IND, indole; AAO, aldehyde oxidase; CYP79B2/3, cytochrome P450 monooxygenases 2/3; IMI1, amidase 1; INS, indole synthase; NIT, nitrilase; SUR1/2, SUPERROOT1/2; TAA, tryptophan aminotransferase; TRP3/TSA1, Trp synthase α -subunit; TRP2/TSB1, Trp synthase β -subunit; VAS1, pyridoxal phosphate-dependent aminotransferase 1; YUC, YUCCA flavin-containing monooxygenase

生长素缺陷表型^[40]。

*YUC*基因编码黄素单加氧酶。*YUC1*功能获得突变体(*yuc1D*)在光照条件下表现出高生长素表型，例如偏上性子叶和延长的下胚轴^[33]。研究人员在拟南芥中发现了11个*YUC*基因(表1)，每个*YUC*基因的过表达导致拟南芥中IAA水平的增加和高生长素表型，这表明*YUC*蛋白催化IAA生物合成中的限速步骤^[31,41-43]。重组的*YUC1*蛋白最初被鉴定为催化色胺的*N*-羟基化作

用^[33]，因此*TAA*和*YUC*基因家族曾被认为定位于独立的IAA生物合成途径中^[36,38]。然而，遗传和生化研究表明，这两个基因在同一途径中顺序地起作用(图1)^[18,31,32]。重组的*YUC2*蛋白以NADPH依赖的方式催化IPA转化成为IAA^[31]，*YUC4*和*YUC6*蛋白在体外能够转化IPA成为IAA^[44,45]。*YUC*基因的多重敲除突变体在各个生长发育阶段表现出严重的生长素缺陷表型，包括胚胎发生、花发育、幼苗生长、维管模式、侧根形成和避荫

表 1 拟南芥中生长素生物合成途径的主要组分^{[18]a)}Table 1 The main components of IAA biosynthesis pathways in *Arabidopsis*^[18]

途径	基因	酶	底物/产物	敲除突变体中催化产物的减少	生理作用	非维管植物中直系同源基因
IPA	<i>TAA</i>	色氨酸氨基转移酶	Trp/IPA	是	是	是
	<i>YUC</i>	黄素单加氧酶	IPA/IAA	是	是	是
IAOx	<i>CYP79B</i>	Cyt P450 单加氧酶	Trp/IAOx	是	是	是
	<i>NIT</i>	腈水解酶	IAN/IAA	—	—	—
IAM	<i>AMI1</i>	酰胺酶	IAM/IAA	—	—	—
TAM	<i>AAO</i>	醛氧化酶	IAAld/IAA	—	—	—
Trp-不依赖	<i>INS</i>	吡啶合酶	IGP/IND	是	是	—

a) —, 没有被观察到或者没有被报道

等, 表明 *YUC* 基因家族在植物生长发育中起关键作用^[41,42,46]。内源 IPA 水平在多重 *yuc* 敲除突变体中增加以及在 *YUC* 过表达株系中减少^[31]。尽管一些 *yuc* 单个敲除突变体在某一条件下可能具有敏感的表现型, 但每个 *YUC* 基因的单个敲除突变体不表现出生长素表现型的显著减少^[47], 表明 *YUC* 基因家族的功能冗余^[42]。此外, *YUC* 的直系同源基因普遍存在于维管和非维管植物中, 如水稻^[48]、玉米^[49]和苔类植物地钱^[35]等, 表明 *YUC* 基因家族在陆生植物的进化上是保守的(表1)。

TAA1 和 *YUC* 基因的共表达(co-expression)显著增加拟南芥中 IAA 的水平和高生长素表现型^[31]。*TAA* 和 *YUC* 基因家族的多重敲除突变体在不同的植物物种中表现出 IAA 水平的显著减少和严重的生长素缺陷表现型^[32,35,40], 表明 IPA 途径在 IAA 生物合成中的重要作用。研究发现, L-犬尿氨酸(L-kynurenine)和 L-氨基氧基苯基丙酸(L-amino-oxyphenylpropionic acid, L-AOPP)是 *TAA* 的抑制剂, *yucasin* 是 *YUC* 的抑制剂^[50-52]。应用 L-犬尿氨酸降低拟南芥中内源 IAA 的水平, 引起类似于 *wei8-1* 和 *wei8 tar2* 缺失突变体的生长素缺陷表现型^[50]。用 L-AOPP 处理的拟南芥幼苗也表现出 IAA 水平降低, 以及根伸长、根毛形成和根向地性缺陷^[52]。在玉米胚芽鞘中, *yucasin* 显著减少 IAA 的生物合成和抑制向地性反应^[51]。这些基于化学生物学的研究表明, IPA 途径是植物中 IAA 生物合成的主要途径。

在拟南芥中, 吡哆醛磷酸依赖的氨基转移酶(pyridoxal phosphate-dependent aminotransferase)VAS1 通过转化 IPA 成为 Trp 来调控 IAA 的生物合成^[53]。*vas1* 敲除突变体表现出 IAA 和与高生长素表现型相联系的乙烯前体 1-氨基环丙烷-1-羧酸(1-aminocyclopropane-1-carboxy-

late, ACC)的水平增加。VAS1 可能利用乙烯前体甲硫氨酸作为氨基供体, IPA 作为氨基受体来产生 Trp 和 2-氧-4-甲基硫代丁酸(2-oxo-4-methylthiobutyric acid)。VAS1 的发现为 IAA 和乙烯生物合成的协同调控提供了新的观点^[18]。

1.1.2 IAOx 途径合成 IAA

许多遗传和生化研究表明, IAOx 途径在拟南芥 IAA 生物合成中起辅助作用^[36,54]。在 IAOx 途径的最初步骤中, *CYP79B2* 和 *CYP79B3* 催化 Trp 转化为 IAOx(图1)^[18]。在拟南芥中, IAOx 是 IAA 和次生代谢物, 包括芸薹葡萄糖硫苷(glucobrassicin, GB)和植保素(camalexin)的共同前体(图1)^[18,36]。IAOx 途径可能是芸薹科植物中的一条物种专一的途径, 因为 *CYP79B* 基因主要局限于该科植物中(表1)^[18,36,55]。IG 生物合成突变体 *sur1*(*superroot 1*)、*sur2*(*superroot 2*)/*cyp83b1* 和 *ugt74b1* 表现出 IAA 和 IAOx 水平增加^[36,43]以及高生长素表现型^[56]。从 IG 到 IAA 的代谢通量增加, 表明 IAA 和 IG 生物合成之间有一种紧密的代谢联系。在体外, *CYP79B2* 和 *CYP79B3* 都能催化 Trp 转化成为 IAOx。在拟南芥中, 这些 Cyt P450 单加氧酶负责 IAOx 的产生, 因为在 *cyp79b2 cyp79b3* 双敲除突变体中未检测到内源 IAOx^[36]。*CYP79B2* 的过表达增加内源 IAA 水平, 导致高生长素表现型, 例如延长的下胚轴, 这表明 *CYP79B2* 是催化 IAOx 途径中的限速步骤^[18]。

CYP79B2 的启动子-GUS 报告基因融合的分析表明, 该基因在幼根、子叶和维管组织中的表达相对较高。在正常生长条件下, *cyp79b2 cyp79b3* 双突变体的表现型不明显, 其幼苗比野生型植株稍小; 然而, 在高温条件下, *cyp79b2 cyp79b3* 双突变体植株表现出比野生型

植株更短的下胚轴和更小的子叶^[36]。因此, IAOx途径被认为在高温条件下起重要作用。与该假设一致, 光敏色素相互作用因子4(phytochrome-interacting factor 4, PIF4)在温度升高时活化CYP79B2、TAA1和YUC4基因^[57]。研究表明, 高温诱导microRNA和miR10515的表达水平, 降低SURI的表达水平, 以及通过阻断IG的生物合成来增加IAA的水平^[54]。在较高的温度下, miR10515敲除突变体的低生长素表型变得更为严重, 表明IAOx途径与拟南芥的生长表型密切相关。

值得注意的是, 从IAOx到IAA的合成途径不清楚(图1)。IAM和吲哚-3-乙腈(indole-3-acetonitrile, IAN)被认为是可能的前体, 因为这两种前体表现出类似于IAOx的代谢谱^[36]。例如在cyp79b2 cyp79b3双突变体中, IAM和IAN(除IAOx外)的内源水平被显著降低。此外, 当用¹³C标记的IAOx饲喂cyp79b2 cyp79b3双突变体时, ¹³C被有效地掺入到IAM、IAN和IAA中。在拟南芥和玉米中, 腈水解酶(nitrilase, NIT)家族能够转化IAN成为IAA(表1)^[18,58]。然而, 在拟南芥中IAN和NIT可能在IG代谢、植保素稳态(homeostasis)和氰化物解毒中而不是在IAOx依赖的IAA生物合成中起主要作用^[34,59]。

此外, 研究表明, CYP79A2是一种拟南芥CYP79B2和CYP79B3的同源物, 能够催化苯丙氨酸(phenylalanine)转化为苯基乙醛肟(phenyl acetaldoxime, PAOx), 但在体外具有较窄的底物特异性。在拟南芥中, CYP79A2的过表达显著地增加苯基硫代葡萄糖苷(phenyl glucosinolate)的水平。在cyp79b2 cyp79b3双突变体中, 内源GB的水平表现出显著的降低(<0.01%)^[60]。Irmisch等人^[61]发现, 玉米CYP79A61能够在异源系统中产生PAOx和IAOx, 以及促进生长素的形成和植物的防御反应。

1.1.3 其他的IAA生物合成途径

Mano和Nemoto^[37]提出, 植物也能从IAM途径产生IAA(图1)。在玉米和水稻中已经检测到IAM, 但未检测到IAOx(表1)^[18,37,62]。iaaM(TRYPTOPHAN 2-MONOOXYGENASE)基因的过表达增加IAA的水平, 导致植物中高生长素表型, 表明植物在体内能够转化IAM成为IAA。拟南芥酰胺酶1(*Arabidopsis* amidase 1, AtAMI1)和烟草(*Nicotiana* sp.)中的同源基因在体外能够转化IAM成为IAA^[37,63]。然而, 在植物中还没有发现催化IAM途径最初步骤的酶, 尽管生物信息学研究表明AMI1家族成员在高等植物中广泛分布^[37], 但现有的证据还不足以提出IAM途径是植物中IAA生物合成的主

要途径。

TAM和IAAld也被认为是植物中IAA的可能前体(图1)^[18,64]。这些代谢物已经在许多植物物种中被检测到^[62]。此外, 当用氘标记的Trp处理时, 在豌豆(*Pisum* sp.)根中观察到高水平的氘掺入到TAM和IAAld中, 表明TAM和IAAld有助于豌豆根系从Trp生物合成IAA^[65]。色氨酸脱羧酶(Trp decarboxylase, TDC)家族能够转化Trp成为TAM; 然而, TDC成员不可能促进IAA的生物合成, 因为长春花(*Catharanthus*)TDC基因的过表达会引起烟草中TAM水平的增加, 但不增加IAA水平^[18]。乙醛氧化酶(aldehyde oxidase, AAO)家族催化IAAld转化成为IAA, 也被认为是IAA生物合成酶(表1)^[18]。研究表明, AAO活性的丧失不引起拟南芥中生长素缺陷的表型^[31]。因此, TDC和AAO成员不可能直接参与植物中IAA的生物合成。

根据Trp生物合成突变体中代谢物的定量分析和饲喂试验, Trp不依赖的途径被认为是玉米和拟南芥中IAA生物合成的另一条途径^[18]。当¹⁵N标记的邻氨基苯甲酸(anthranilate, ANT)饲喂给拟南芥Trp生物合成突变体trp2-1时, ¹⁵N掺入到IAA中的水平比Trp更高。因此, IAA被认为主要是由Trp前体, 例如吲哚(indole, IND)和吲哚-3-甘油磷酸(indole-3-glycerol phosphate, IGP)产生的, 而不是来自Trp(图1)^[18]。由于反义IGP合酶(antisense IGP synthase, IGS)转基因株系中IAA水平被显著降低, IGP被认为是拟南芥Trp不依赖途径中的一个分支点中间物; 然而, 当利用基于碱性水解定量法测定时, Trp生物合成突变体trp3-1和trp2-1中的IAA水平显著增加。由于trp3-1突变体中IGP和GB的水平显著增加, 以及IAA水平的明显增加是由碱性水解过程中IGP和GB降解形成的, 因此, Trp不依赖途径被认为是一种人工产物^[18]。Yu等人^[66]报道, 碱处理后产生的大部分IAA可能归因于化学转化而不是IAA结合物的水解。特别是GB的转化曾经被认为以很低的水平发生, 但实际上可能占释放IAA的大部分。另外, 高水平的IAA也可能来源于蛋白的Trp降解, 这些结果进一步证明Trp不依赖途径中的IAA及其代谢物水平的增加很可能是来自GB和蛋白Trp的化学转化所产生的IAA^[66], 弱化了Trp不依赖途径的生化证据, 表明在植物中IAA主要从Trp产生。

Wang等人^[67]报道, 细胞质定位的吲哚合酶(indole synthase, INS)是一种质体定位的Trp合酶 α 亚基结构域(Trp synthase α -subunit domain, TSA)/TRP3的旁系同

源物,在拟南芥Trp不依赖的途径中起作用。INS产生的IND作为细胞质中IAA的一种初始前体,从IND到IAA的合成途径还不清楚。在*ins*突变体的幼苗中内源IAA的水平轻微下降,然而,在*trp3-1*和*trp2-1*突变体的幼苗中IAA的水平增加。在早期胚胎发生过程中,INS在顶-基轴向模式(apical-basal pattern)的建立中起重要作用,表明Trp依赖的和Trp不依赖的IAA生物合成途径协同调控高等植物的胚胎发生。Trp不依赖途径的遗传和生化研究将有助于进一步理解该途径在IAA生物合成中的作用。

1.2 IAA分解代谢与失活

植物细胞中生物活性IAA的水平是由合成、运输、储存和失活之间的平衡决定的。生长素信号在局部积累后的失活以及生长素最适值的调节对于植物生长发育是非常重要的^[17]。实际上,植物细胞中只有25%的IAA以游离的形式存在^[68],大部分IAA通过形成暂时的储存形式或者通过不可逆的代谢降解而失活。在不同的植物物种中已经发现了几种IAA的失活形式^[62],其中一些形式可以转化回到游离的IAA,从而精确地调控IAA的浓度。

1.2.1 IAA的结合、储存与释放

氨基酸、肽和蛋白能够通过酰胺键与IAA结合^[62]。虽然IAA-肽和IAA-蛋白的功能还不清楚,但IAA-氨基酸结合物的特性已经被广泛研究。酰基酸酰胺合成酶(acyl acid-amido synthetase)的GH3(GRETCHEN HAGEN 3)家族成员最初在大豆(*Glycine max*)中被鉴定为早期生长素反应基因^[17]。在拟南芥中, GH3组II家族(GH3 group II family)的8个成员将IAA与不同的氨基酸结合^[69]。拟南芥单个*gh3*突变体对IAA的敏感性较低,但在无激素的培养基上生长时类似于野生型植株^[69]。只有高阶(high-order)*gh3*突变体表现出IAA含量增加和生长素过量表型,包括增加根分支和伸长叶柄^[70]。尽管GH3存在普遍的冗余,但仍有一定程度的专一性。例如,在对遮阴和高温的反应中GH3.17调节拟南芥下胚轴中活性IAA的水平^[71]。一些GH3被认为是具有多功能的酶,能将氨基酸与不同的植物激素结合^[69]。例如, IAA酰胺合成酶GH3.3、GH3.5和GH3.6能将Asp、Met和Trp与茉莉酸(jasmonic acid)结合,从而正调控不定根的发育^[72], GH3.5将水杨酸(salicylic acid, SA)或者苯甲酸(benzoic acid)与生长素PAA结合^[73]。

IAA酰胺水解酶(IAA amidohydrolases)将一些

IAA-氨基酸结合物转化成为游离的IAA,有助于调控IAA的水平。在拟南芥中,这些酰胺水解酶包括ILR1(IAA-leucine resistant1)、IAR3(IAA-alanine resistant3)和5个ILL(ILR1-like),它们对IAA-氨基酸底物具有广泛的体外活性,例如IAA-Leu、IAA-Ala、IAA-Phe和IAA-Gly等^[17]。与外源IAA所引起的表型比较,用这些结合物处理的植物表现出根系生长抑制,表明这些结合物是调控植物中生长素代谢的IAA储存形式^[17,74]。拟南芥*ilr1 iar3 ill2*突变体植株具有较低的IAA水平,积累IAA-Ala和IAA-Leu,表现出生长缺陷,例如缩短的下胚轴和减少的根分枝^[74]。最丰富的IAA-氨基酸结合物IAA-Asp和IAA-Glu不是可逆的IAA储存形式,但是分解的代谢产物;用标记的IAA-Asp和IAA-Glu饲喂拟南芥植株后,没有检测到标记的IAA,而且*ilr1 iar3 ill2*酰胺水解酶突变体中的IAA-Asp和IAA-Glu水平与野生型类似^[17]。

研究发现,酯连接的IAA-糖(IAA-sugar)共轭物存在于许多植物物种中,包括拟南芥、大豆、玉米和水稻,这些IAA结合物在几种谷类和豆科植物的种子中是非常丰富的^[17]。IAA-糖是欧洲赤松(*Pinus sylvestris*)种子中的主要IAA形式,在种子萌发后4 d开始从头合成IAA,表明IAA-糖是一些物种在幼苗早期形成过程中IAA的主要来源^[75]。已经在玉米^[76]和水稻^[77]种子中鉴定了IAA-葡萄糖水解酶(IAA-glc hydrolase),并确定水稻IAA-glc水解酶TGW6与粒重有关^[77]。在拟南芥中, IAA-glc是最普遍的IAA酯结合物,也是幼苗组织中最丰富的IAA代谢物,在根中的含量特别高^[70]。专一的尿苷二磷酸糖基转移酶(uridine-diphosphate (UDP) glycosyltransferases, UGT)催化UDP-glc与IAA的结合,已经在玉米(IAGLU)和拟南芥(UGT84B1)中被鉴定。拟南芥中*AtUGT84B1*和*ZmLAGLU*的过表达引起IAA-glc的积累,降低对外源IAA的敏感性^[17]。不同植物的IAA-糖基转移酶(IAA glycosyltransferase)和IAA-glc水解酶功能缺失突变体的分离和鉴定将有助于揭示IAA酯结合物对IAA代谢和植物发育的作用。

IAA甲酯(methyl ester of IAA, MeIAA)也被认为是一种与IAA代谢有关的储存形式。拟南芥IAA羧基甲基转移酶(IAA carboxyl methyltransferase, IAMT)在体外能使IAA的羧基甲基化。*IAMT1*在拟南芥幼苗中普遍表达,其RNAi敲除导致发育缺陷,包括矮化和育性降低^[78]。*IAMT1* T-DNA插入突变体的研究表明,在拟南芥下胚轴的重力感受过程中MeIAA在生长素梯度形成中

具有特异性作用^[79]。外源MeIAA抑制暗生长幼苗的根生长和下胚轴伸长,其抑制作用与IAA的作用相似,表明MeIAA调控内源IAA水平^[78]。事实上,拟南芥IAA甲基酯酶17(IAA methyltransferase 17, AtMES17)水解MeIAA结合物成为游离IAA^[80]。mes17植株的根生长对MeIAA的敏感性较低,饲喂试验表明mes17植株仅仅能水解40%的¹⁴C-MeIAA,这说明其他的MES冗余地促进MeIAA的水解^[80]。MeIAA本身不能被生长素-共受体复合物识别,不干扰IAA的作用^[79],这进一步支持MeIAA对植物发育的影响归因于水解产生的IAA的假设。

吲哚-3-丁酸(indole-3-butyric acid, IBA)能够被过氧化物酶体(peroxisome)中的酶以类似于脂肪酸 β -氧化的过程转化为IAA^[81]。IBA β -氧化途径的突变体对IBA不敏感,但对IAA敏感,这表明IBA本身是没有活性的,任何生长素反应完全归因于其转化生成的IAA^[81]。研究表明,从IBA衍生的IAA在根和茎发育的许多不同方面起专一的作用,例如,侧根的启动似乎高度依赖于侧根帽中的IBA转化成为IAA^[82]。

1.2.2 IAA的氧化

通过形成2-氧吲哚-3-乙酸(2-oxindole-3-acetic acid, oxIAA)以及随后与葡萄糖结合(oxIAA-glc)的IAA氧化衰减(oxidative attenuation)被认为是IAA失活的主要途径。因为这些氧化代谢物的水平比其他IAA分解代谢物高100倍^[83], IAA处理迅速增加oxIAA和oxIAA-glc的水平^[84]。一个生殖发育受损的水稻突变体缺乏生长素氧化的二加氧酶(dioxygenase for auxin oxidation, OsDAO)活性, OsDAO是一种2-氧戊二酸依赖的Fe(II)二加氧酶(2-oxoglutarate-dependent Fe(II) dioxygenase),在体外能将IAA转化成为oxIAA^[85]。研究表明,在dao的花药和子房中IAA的水平增加, oxIAA的产生下降^[85]。此外, oxIAA葡糖基化成为oxIAA-glc至少部分被UGT74D1酶催化^[86]。已经在拟南芥中鉴定了2个DAO同源基因AtDAO1和AtDAO2,但oxIAA的产生似乎主要依赖于AtDAO1的活性^[70]。拟南芥根系中oxIAA水平的细胞类型特异性定量表明, oxIAA的分布与根组织中IAA的分布相一致^[83],表明IAA的氧化参与生长素梯度的形成。这一结果被dao1-1突变体根系中IAA分布的数学模拟所支持^[70,87]。

2 IAA信号转导

IAA信号转导途径包括典型和非典型生长素信号转导途径^[19,20,26,27]。在典型的生长素信号转导途径(ca-

nonical auxin signaling pathway)中,生长素与TIR1/AFB(transport inhibition resistant1/auxin signaling F-box)家族的F-box蛋白和Aux/IAA(auxin/indole-3-acetic acid)转录抑制因子结合, SCF^{TIR1/AFB} E3泛素连接酶复合物将活化的泛素(ubiquitin)转移到Aux/IAA上, Aux/IAA的多泛素化导致其通过26S蛋白酶体降解并解除对ARF的抑制,活化生长素诱导基因的转录(图2)^[19,20]。非典型生长素信号转导途径(non-canonical auxin signaling pathway)主要包括TIR1、ETTIN和类受体激酶介导的途径,但生长素结合的下流事件仍然不清楚^[26]。

2.1 典型的生长素信号转导

典型的生长素信号转导途径的核心组分包括TIR1/AFB、Aux/IAA和ARF,它们相互作用完成生长素控制的基因转录。在拟南芥中含有6个TIR1/AFB同源成员,29个Aux/IAA同源成员以及3种类型的ARF^[20]。

2.1.1 TIR1/AFB

TIR1/AFB蛋白被整合到一个含有4个亚基的SCF^{TIR1/AFB}复合物中,这个复合物和小分子Aux/IAA蛋白都定位于细胞核中,所有的TIR1/AFB蛋白都能与生长素结合^[88,89]。研究表明,4个TIR1/AFB家族成员促进生长素反应;这些成员的单突变体(*tir1*、*afb2*和*afb3*)具有弱的生长素抗性,其高阶突变体(higher-order mutant) *afb1*具有强的生长素抗性^[88,89]。*tir1/afb*突变体也表现出与生长素感受一致的形态缺陷。SCF^{TIR1/AFB}泛素连接酶复合物的其他组分,如ASK1(*Arabidopsis* SKP1 homologue)、CUL1(Cullin 1)或者RBX1(ring-box 1)的突变体也引起生长素抗性^[90]。

TIR1/AFB家族成员具有一个N-端富含亮氨酸重复的区域和一个C-端F-box结构域(图2(a))^[20]。与TIR1和AFB1~3不同,AFB4和AFB5具有额外的蛋白结构域,并与生长素类似物结合^[91]。包含生长素和小分子Aux/IAA蛋白复合物TIR1-ASK1的晶体结构解析表明,TIR1/AFB中富含亮氨酸重复的结构域含有生长素结合口袋,而F-box结构域与ASK1接触;Aux/IAA蛋白也在生长素结合位点与富含亮氨酸重复的结构域接触^[92]。这些结果表明,生长素能够稳定TIR1/ASK和Aux/IAA蛋白之间的相互作用^[93]。TIR1/AFB蛋白也通过F-box结构域与SCF^{TIR1/AFB}复合物的CUL1亚基接触,这与自动催化的降解相联系^[94]。

2.1.2 Aux/IAA

Aux/IAA蛋白不含DNA结合基序,而是由ARF蛋白

图 2 生长素依赖的基因调控的核心组分的域结构^[20]。生长素反应由3个核心组分之间的相互作用(箭头)介导: (a) TIR1/AFB生长素受体, (b) Aux/IAA转录抑制因子和(c) ARF转录因子。TIR1/AFB蛋白含有一个F-box结构域和一个富含亮氨酸重复(LRR)的结构域。F-box结构域与SCF E3泛素连接酶复合物中的其他亚基结合, LRR结构域携带生长素结合口袋和Aux/IAA接触位点。Aux/IAA蛋白由结构域1(D I)、结构域2(D II)和PB1结构域组成。结构域1(IAA33缺失)含有一个介导与TPL相互作用的EAR基序; 结构域2(IAA20和-30-34缺失)携带降解决定子(保守的氨基酸序列为GWPP(V/I), 作为与TIR1/AFB和生长素的接触位点起作用); PB1结构域介导寡聚化和Aux/IAA-ARF异源二聚化。ARF含有一个N-端B3 DNA结合结构域, B3结构域的两侧各有一个二聚结构域(DD), 随后是介导转录调控的中间区域(MR)。在ARF2、-9、-18和-19中, MR中间区域可能包含一个与TPL相互作用的EAR基序; 在类型A ARF中富含谷氨酰胺(Q), 但在类型B和C ARF中富含脯氨酸(P)、丝氨酸(S)和苏氨酸(T)。在ARF5中, 这个结构域介导与SYD和BRM的相互作用。在其C-端, ARF(除ARF3和-17外)都含有一个寡聚化和Aux/IAA-ARF异源二聚化的PB1结构域。ARF, 生长素反应因子; Aux/IAA, 生长素/吲哚-3-乙酸蛋白; BRM, BRAHMA; EAR, 乙烯反应元件结合因子相关的抑制因子; PB1, Phox and Bem 1; SYD, SPLAYED; TIR1/AFB, 运输抑制因子抗性1/生长素信号转导F-BOX; TPL, TOPLESS

Figure 2 Domain architecture of central components of auxin-dependent gene regulation^[20]. Auxin responses are mediated by interactions (arrows) between three core components: (a) TIR1/AFB auxin receptors, (b) Aux/IAA transcriptional repressors, and (c) ARF transcription factors. TIR1/AFB proteins contain an F-box domain for tethering to the other subunits in the SCF E3 ubiquitin ligase complex and a leucine-rich-repeat (LRR) domain that carries the auxin-binding pocket and Aux/IAA contact site. Aux/IAA proteins consist of domain 1 (D I, missing in IAA33), which harbors an EAR motif that mediates interaction with TPL; domain 2 (D II, missing in IAA20 and -30-34), which carries the degron (the conserved amino acid sequence GWPP (V/I), which acts as the contact site with TIR1/AFB and auxin); and a PB1 domain, which mediates oligomerization and Aux/IAA-ARF heterodimerization. ARFs have an N-terminal B3 DNA-binding domain flanked on either side by a dimerization domain (DD), followed by a middle region (MR) that mediates transcriptional regulation. This domain can contain an EAR motif (in ARF2, -9, -18, and -19) for interaction with TPL; it is glutamine (Q) rich in class A ARFs but proline (P), serine (S), and threonine (T) rich in class B and C ARFs. In ARF5, this domain mediates the interaction with SYD and BRM. At their C termini, ARFs (with the exception of ARF3 and -17) have a PB1 domain for oligomerization and Aux/IAA-ARF heterodimerization. ARF, auxin response factor; Aux/IAA, auxin/indole-3-acetic acid protein; BRM, BRAHMA; EAR, ethylene-responsive element binding factor-associated repressor; PB1, Phox and Bem 1; SYD, SPLAYED; TIR1/AFB, transport inhibitor resistant 1/auxin signaling F-box; TPL, TOPLESS

招募到基因组区域, 它们与ARF蛋白一起通过共享的C-端结构域进行物理相互作用(图2(b))^[20,95]。Aux/IAA蛋白通常含有一个或者两个N-端乙烯反应元件结合因子相关的抑制因子(ethylene-responsive element binding factor-associated repressor, EAR)或者类EAR(EAR-like)抑制因子基序(结构域1(domain1, D I))、一个TIR1/AFB相互作用和降解必需的中心区域(降解决定子(degron), 或者结构域2(domain2, D II))以及一个介导同源和异源二聚作用的C-端PB1(Phox and Bem 1)蛋白-蛋白相互作用的域(图2(b))^[20,96]。研究表明, Aux/IAA蛋

白以头-尾排列(head-tail configuration)的多聚化是由PB1结构域介导的^[97]。不同的Aux/IAA蛋白对生长素有明显不同的敏感性, 半衰期从几分钟到几小时^[98]。

单个Aux/IAA蛋白在结构域的存在和保守性方面显著不同, 这些差异对于生长素的敏感性/蛋白稳定性以及与TIR1的联系是重要的^[98], 其中最重要的是降解决定子(结构域2)以及结构域1和结构域2之间的一对保守的氨基酸, 即赖氨酸和精氨酸(lysine and arginine, KR)(图2(b))。典型的降解决定子和KR基序的存在增加了共受体(TIR1/AFB-Aux/IAA)对生长素的亲和力, 导

致Aux/IAA蛋白的稳定性下降(在较低的生长素浓度下降解)^[91,99]。一些Aux/IAA蛋白具有不同的降解决定子或者完全缺乏该结构域,这将分别引起对生长素的敏感性降低或者不敏感^[91,98,99]。降解决定子的突变使得Aux/IAA蛋白对生长素不敏感,可能是因为降解决定子中的核心残基直接与TIR1-生长素复合物相互作用^[92]。携带一个赖氨酸-谷氨酰胺(lysine-glutamine, KQ)基序或者没有KR基序的Aux/IAA也表现出对生长素的敏感性降低^[91,98,99]。降解决定子下游极性氨基酸的存在增加与TIR1/AFB的相互作用,极性氨基酸的突变导致Aux/IAA蛋白的功能获得表型,这种表型类似于降解决定子基序的突变,但比后者的表型更弱^[99]。

Aux/IAA蛋白通过共抑制因子复合物(corepressor complex)的招募抑制在其靶点结合的活化ARF。Aux/IAA蛋白结构域1中的EAR抑制因子基序与称为TPL(topless)或者TPR(topless related)的Tup1/Groucho/TLE家族蛋白物理相互作用并招募它们^[100,101]。TPL和Aux/IAA EAR结构域之间的共晶体解析表明,这种相互作用需要TPL N-端的CTLH区域^[101]。EAR基序与TPL的相互作用区域形成一个四聚体,该四聚体与寡聚的含有EAR结构域的伴侣的相互作用更强^[97]。

一旦生长素与TIR1/AFB蛋白中的结合口袋结合,将对Aux/IAA蛋白的亲性和增加^[92]。Aux/IAA蛋白随后被泛素化并在26S蛋白酶体中降解^[102]。虽然泛素化已经在原生质体分析中被证明^[102],但在体内泛素化的位置和程度还不够清楚。Gilkerson等人^[103]提出,泛素化可能比最初的假设更为复杂。研究表明,即使拟南芥IAA1中所有16个赖氨酸被突变,消除所有可能的典型的泛素受体位点,但IAA1蛋白仍然是不稳定的且被泛素化。药物处理表明,生长素依赖的IAA1泛素化可能包括与丝氨酸、苏氨酸或者半胱氨酸中非典型的氧酯键(oxyester)。由于这些残基都能被翻译后修饰,如磷酸化(phosphorylation)或者形成二硫键(disulfide bridge),表明Aux/IAA蛋白的修饰能够影响生长素依赖的降解能力。

2.1.3 ARF

生长素转录反应的关键是ARF家族的序列专一性转录调控因子。ARF蛋白与称为生长素反应元件(auxin response element, AuxRE)的顺式调控序列(cis-regulatory sequence)结合,顺式调控序列的核心含有一个足以招募ARF蛋白的TGTC基序^[20]。结构分析和蛋白芯片数据表明,不同的拟南芥ARF(ARF1、-3和-5)优先与较大的TGTCGG基序结合^[104]。从早期陆生植物开始,

ARF蛋白分为3种类型(图2(c))^[20,105,106]。类型A由具有一个富含谷氨酰胺(glutamine, Q)中间区域的ARF组成,根据在原生质体中的瞬时基因表达分析,这些ARF被分类为转录活化因子。富含Q的结构域存在于所有类型A的ARF中^[105,106]。根据相同的原生质体分析或者序列同源性,剩余的ARF被分类为抑制因子、能够再分为*microRNA 160 (miR160)*靶定的ARF(类型C)和其他的ARF(类型B)(图2(c))^[20]。ARF DNA结合区域的结构分析表明,B3 DNA结合结构域被嵌入在ARF二聚结构域中,ARF蛋白优先与反向的AuxRE重复结合^[104]。大多数但不是所有的ARF都含有一个C-端PB1结构域(图2(c)),这对于ARF和Aux/IAA蛋白之间的物理相互作用是重要的^[97,107]。在低生长素条件下,Aux/IAA蛋白专一地抑制ARF的转录活性。PB1结构域也可能有助于ARF-ARF的二聚作用^[96,97,107]。

尽管许多类型B和类型C ARF具有PB1结构域,但大多数似乎不与Aux/IAA蛋白强烈地相互作用^[108]。Richter等人^[109]提出,类型B和类型C ARF可能以生长素不依赖的方式干扰类型A ARF的活性,例如通过竞争DNA结合位点或者通过异源二聚作用阻断活化的ARF活性。一些类型B(抑制的)ARF(ARF2、-9和-18)和一个单一的类型A ARF(ARF19)都含有一个EAR结构域,这个结构域与共抑制因子复合物的招募有关^[100]。研究已经发现,类型A ARF抑制某些靶基因^[110],对于生长素依赖的基因抑制目前还没有满意的模型。

在低生长素条件下,抑制生长素反应基因的表达还需要组蛋白去乙酰化酶(histone deacetylase, HDAC),如HDA19。HDA19活性的丧失能部分恢复与Aux/IAA编码基因中功能获得突变相关的表型,以及TPL和HDA19被招募到活化的ARF结合位点,特别是在低生长素条件下^[111]。在植物中TPL招募HDAC复合物^[112],HDAC从组蛋白(主要是组蛋白H3和H4)的赖氨酸残基上去除乙酰基,导致染色质状态更加致密并降低基因组DNA对转录因子或者转录复合体的可及性(accessibility)。当Aux/IAA水平增加、生长素水平降低时,致密的染色质阻止生长素反应基因的表达。生长素水平的增加引起Aux/IAA蛋白降解以及TPL和HDAC从活化的ARF靶点逐出,但留下致密的染色质^[111]。当生长素被感受时,另一类染色质调控蛋白SWI/SNF(switch/sucrose nonfermenting),如染色质重塑ATP酶有助于克服这种被抑制的染色质状态。SWI/SNF染色质重塑复合物利用ATP水解的能量来改变核小体(nucleosome)在

DNA上的占有或者定位,从而改变基因组DNA在染色质中的可及性^[113]。类型A ARF5/MP(monopteros)中富含Q的中间区域与在BRM(BRAHMA)或者SYD(SPLAYED)周围形成的植物SWI/SNF染色质重塑复合物相互作用,并招募这一复合物到MP靶点^[111]。BRM和SYD是生长素反应基因表达所必需的,通过在MP靶点解锁被抑制的染色质状态来完成这种作用,从而为其他转录因子开放结合位点。在低生长素条件下,SWI/SNF重塑因子的招募被与MP结合的Aux/IAA蛋白所阻断。SWI/SNF复合物与MP靶点的结合能够恢复*mp*突变体的形态缺陷,表明SWI/SNF复合物的招募可能是MP的一种主要功能。

2.2 非典型的生长素信号转导

生长素结合蛋白1(auxin binding protein 1, ABP1)是一种对生长素具有高亲和力的结合蛋白,长期以来被认为是细胞外生长素的受体,尤其是在快速的非转录生长素反应中起重要作用^[114,115]。然而,随后的研究发现,*abp1*突变体植株不表现出任何明显的发育缺陷,在野生型和*abp1*植株中已知的生长素调控基因对生长素处理的反应也是相似的;生长素信号转导以及在正常生长条件下植物的发育都不需要ABP1^[116]。因此,ABP1被认为不是生长素信号转导或者拟南芥发育的关键组分。经典的生长素反应包括生长素被添加到原生质体后质膜的迅速超极化(hyperpolarization)以及根系对生长素的快速反应,由于这些反应发生太快,不能用典型的生长素信号转导途径来解释^[117]。根据拟南芥根系对生长素添加和去除的快速反应,Fendrych等人^[118]提出,这种快速反应需要细胞内生长素的感受,而不需要转录重编程。现有的证据表明,非典型的生长素信号转导途径也在植物的生长和发育中起作用,主要包括TIR1、ETTIN和类受体激酶(receptor-like kinase, RLK)介导的途径^[26]。

2.2.1 TIR1介导的途径

利用生长素感受载体AUX1的敲除株系,发现根伸生长素的快速变化依赖于AUX1,表明生长素信号感受的部位在细胞内。将微电极插入根毛细胞,发现在对生长素刺激的反应中质膜电位(plasma membrane potential)产生快速且AUX1依赖的变化^[119]。单个或多个TIR1和AFB突变株系的研究表明,这些反应也依赖于TIR1/AFB^[26,120]。此外,通过一种凹凸(bump-and-hole)策略研发了一种正交的生长素-TIR1受体对,它能触发生长素

信号转导,但不干扰内源生长素或者TIR1/AFB。在互补的凹型TIR1(ccvTIR1)受体存在下,一种合成的凸型IAA(cvxIAA)在转录水平和特定的发育环境中在体内劫持下游生长素信号。利用cvxIAA-ccvTIR1系统,证实了幼苗中TIR1介导的途径在生长素诱导的酸生长(acid growth)中起作用^[121]。

在对IAA的反应中,质膜去极化以一种IAA浓度和pH依赖的方式发生。在*aux1*突变体中这种去极化被严重地破坏,表明AUX1是根毛中生长素吸收的主要转运体。AUX1介导的IAA转运和IAA触发的钙信号被SCF^{TIR1/AFB}抑制剂auxinole阻断,以及在*tir1 afb2 afb3*和*cngc14*突变体中被强烈地减少。研究表明,AUX1转运体、SCF^{TIR1/AFB}受体和CNGC 14(cyclic nucleotide-gate channel 14)Ca²⁺通道介导了根系中生长素信号的快速转导^[119]。

2.2.2 ETTIN介导的途径

ARF是一个转录因子家族,通过一个保守的N-端DNA结合结构域与AuxRE结合^[19,20,122]。大多数ARF也包含一个保守的C-端PB1结构域,该结构域在典型的生长素信号转导途径中负责与Aux/IAA蛋白结合^[20]。一个称为ETTIN(ETT)的变体ARF3具有一个长的和本质上无序的C-末端结构域(ES结构域);因为它不与Aux/IAA抑制因子相互作用,被认为是一种非典型的生长素感受器,调控发育必需的多种功能。ETT以IAA依赖的方式控制生长,但这种作用不需要泛素化和TIR1^[123,124]。ETT对生长素的感受能力依赖于其C-端的ES结构域,这个结构域能与一组可变转录调控因子(alternative transcriptional regulator)包括INDE(INDEHISCENT)、RPL(REPLUMLESS)和BP(BREVIPEDICELLUS)相互作用^[123,124]。利用信息学、突变、酵母双杂和表达技术,发现ES结构域具有一个长片段,这个长片段具有很低的序列保守性但其中有一系列短的保守基序^[124]。这些保守基序包括一个核定位基序、一个富含丝氨酸的激酶位点和另外三个尚未确定功能的位点。大多数ES结构域似乎是相互作用所必需的,但当激酶基序中任何丝氨酸残基被突变时,对IAA的敏感性丧失^[125]。值得注意的是,ETT对生长素的敏感性较低(通常在50~100 μmol/L IAA之间),不被人工合成的生长素α-萘乙酸(α-naphthylacetic acid, NAA)或者2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D)触发。研究还发现,ARF3的进化比典型的生长素信号途径出现得更晚,因此ETT是一个特殊的非典型途径^[126]。

2.2.3 类受体激酶介导的途径

非典型生长素信号转导也被认为与不同的类受体激酶有关,包括D6蛋白激酶、PINOID蛋白激酶、有丝分裂原活化的蛋白激酶(mitogen-activated protein kinases, MAPK)和质膜相关的激酶^[127],这些激酶通过调节称为PIN的生长素输出蛋白的定位和活性来促进生长素的作用;激酶级联(kinase cascade)反应是迅速的以及可能参与迅速的非典型的生长素信号转导。研究表明,MAPK级联参与了许多生长素调控的反应系统^[128],其作用包括RBK1(ROP binding protein kinase 1)的磷酸化,导致ROP(Rho-like GTPases from plant)成员的活化;ROP是小分子GTPase,通常与细胞骨架和生长素运输的调控有关^[128]。

跨膜激酶(transmembrane kinases, TMK)也与生长素信号转导有关^[129]。TMK形成一个亚家族的植物RLK,它们是一个大的和多样化的家族,其结构特征包括一个作为活性结构域起作用的胞外结构域、一个跨膜结构域和一个胞内激酶结构域,有时还具有一个磷酸传递受体结构域(phosphorelay receiver domain)^[26]。最近,Li等人^[130]发现了一种新的生长素信号转导机制,它与基于TIR1/AFB受体的典型生长素途径平行地起作用,在拟南芥顶钩(apical-hook)发育过程中改变细胞生长素水平以介导差异生长。这种信号转导机制在顶钩的凹面(concave side)起作用,包括生长素介导的TMK1的C-端剪切。细胞质和细胞核易位的TMK1 C-端专一地与Aux/IAA家族的两个非典型的转录抑制因子(IAA32和IAA34)相互作用,并磷酸化它们,从而调控ARF转录因子。与典型生长素信号途径中Aux/IAA转录抑制因子的降解相反,TMK1 C-端稳定非典型的IAA32和IAA34转录抑制因子以调控基因表达,最终抑制生长。生长素-TMK1信号转导途径起源于细胞表面,被高水平的生长素触发,以及与TIR1/AFB信号转导途径共享部分重叠的一组转录因子,从而介导复杂的发育过程。

3 IAA对种子休眠与萌发的调控

种子的休眠与萌发被多种植物激素相互作用调控。研究发现,生长素以剂量依赖的方式调控种子的休眠与萌发;在种子萌发过程中,生长素正调控ABA和负调控GA的生物合成与信号转导途径^[12,13,131]。

3.1 种子休眠依赖于生长素的水平

在黑暗条件下,1 $\mu\text{mol/L}$ 外源IAA处理显著延缓大

豆(*G. max* cv. ND-12和C-103)种子的萌发进程^[13]。种子萌发的最初可见性状包括种皮破裂和胚根伸出^[1,2]。外源IAA处理延缓大豆‘ND-12’的种皮破裂和胚根伸出,显著降低萌发种子的胚根长度和幼苗鲜重。IAA对‘ND-12’种子萌发的抑制作用是依赖浓度的,包括种皮破裂、胚根伸出、种子萌发后的胚根长度和幼苗鲜重,且随着IAA浓度的增加其抑制作用更为明显^[13]。人工合成的生长素如NAA和2,4-D对大豆种子的萌发也有延迟作用,在相同浓度下,2,4-D的延迟作用大于NAA^[13]。此外,外源IAA也以剂量依赖的方式有效地增加野生型拟南芥新鲜收获种子的休眠^[12]和烟草种子的次生休眠^[131]。4°C下层积4 d能够解除外源IAA对拟南芥种子萌发的抑制作用^[12]。层积和未层积拟南芥种子的萌发速率被低浓度(0.05~5 nmol/L)的IAA和2,4-D促进,被高浓度(0.05~5 $\mu\text{mol/L}$)的IAA和2,4-D抑制^[131]。5 nmol/L IAA处理增加拟南芥吸胀种子中胚根尖端生长素报告基因DR5::GUS的信号,表明外源IAA处理能增加内源生长素的反应水平^[132]。

过量产生生长素的转基因株系*iaaM-OX*种子的休眠特性比野生型更强;*iaaM-OX*植株的新鲜收获的湿(freshly harvested wet, FHW)种子在吸胀后30 d不萌发,而野生型植株的相同种子在吸胀后5 d具有50%萌发率^[12]。拟南芥种子胚根的伸长不需要细胞分裂,但需要下胚轴-胚根过渡区的细胞伸长^[133]。伸长区细胞体积的增加伴随着4C和内多倍体(endopolyploid, 8C和16C)核的比例增加^[134]。流式细胞技术分析表明,在5 nmol/L IAA或者2,4-D存在下,吸胀24和36 h种子中胚细胞的DNA含量以及4C和8C核的水平增加^[132]。

YUC黄素单加氧酶家族是生长素生物合成的关键酶^[17,18]。*YUC1*、*YUC2*和*YUC6*在种子发育过程中表达,在种子发育后期阶段达到峰值(<http://www.bar.utoronto.ca/efp/cgi-bin/efpWeb.cgi>)。由于*yuc1 yuc2 yuc6*三重突变体表现出低的育性,*yuc1 yuc6*双突变体被用来研究种子休眠特性的变化。与野生型种子比较,生长素缺陷的*yuc1 yuc6*双突变体的FHW种子表现出显著降低的休眠特性,但在4°C层积4 d后,突变体与野生型种子之间的萌发率没有差异^[12],表明种子休眠被生长素调控。

3.2 生长素信号转导途径与种子休眠

典型生长素信号转导途径包括由TIR1/AFB受体、Aux/IAA转录抑制因子和ARF转录因子介导的级联^[19,20]。三重突变体*tir1 afb2 afb3*和四重突变体*tir1 afb1*

*afb2 afb3*种子都不能形成下胚轴和根分生组织,可能是因为在胚胎发生过程中需要生长素^[12]。*tir1 afb2*和*tir1 afb3*双突变体的FWH种子像野生型种子一样能够正常萌发^[12]。IAA7/AXR2和IAA17/AXR3是两种由TIR1/AFB介导的生长素信号途径的转录抑制因子,突变体*axr2-1*和*axr3-1*表现出一种生长素反应基因的组成性抑制,它们的FWH种子也比野生型种子萌发更早^[12]。

*MIR160(35S:MIR160)*下调生长素信号转导途径中3个转录因子*ARF10*、*ARF16*和*ARF17*的表达^[21,135]。与野生型种子比较,过表达*MIR160*的转基因植株的FWH种子表现出显著降低的休眠特性^[12]。与35S:*MIR160*转基因植株的表型一致,*arf10 arf16*双突变体表现出显著降低的种子休眠;表达*ARF10*和*ARF16*的抗*MIR160*形式(分别为*mARF10*和*mARF16*)的2个转基因株系表现出显著增加的种子休眠,表明*MIR160*通过下调生长素信号转导来降低种子休眠^[12]。这些结果都表明,生长素信号转导途径是种子休眠必需的,其中*ARF10*和*ARF16*作为关键的下游组分起作用。

LEC2(*leafy cotyledon2*)是一种B3结构域转录因子,被认为是一个胚胎发生的中枢调节因子^[136]。研究表明,LEC2的诱导迅速活化拟南芥中*YUC2*和*YUC4*基因的表达,以及LEC2能够直接与*YUC4*的启动子结合^[136]。除了*YUC2*和*YUC4*外,LEC2也可能正调控拟南芥中的*YUC1*和*YUC10*基因^[137]。尽管LEC2是否直接与*YUC1*、*YUC2*和*YUC10*的启动子结合还不清楚。SHI/STY(*short internodes/stylish*)家族成员作为转录因子起作用,以及调控各种植物器官的发育^[138]。*STY1*基因的诱导也活化*YUC4*的表达和导致拟南芥幼苗中IAA水平的增加^[138]。*STY1*蛋白能够直接与*YUC4*启动子结合,也可能正调控*YUC8*^[138]。IDD(*indeterminate domain*)转录因子IDD14、IDD15和IDD16在器官形态发生和向地性反应中起作用^[139]。此外,*TAA1*和*YUC5*基因被鉴定为IDD14和IDD16的直接靶点。*IDD14*的过表达增加拟南芥幼苗中*TAA1*和*YUC5*的表达以及内源IAA的积累。PIF和碱性螺旋-环-螺旋(*basic helix-loop-helix*, bHLH)转录因子在光 and 高温介导的发育变化中起重要作用。PIF4和PIF5与*YUC8*的启动子结合以及PIF7与*YUC8*和*YUC9*的启动子结合以增加IAA的生物合成。PIF4介导的*TAA1*和*YUC4*的活化也在拟南芥高温诱导的IAA生物合成和下胚轴伸长中起作用^[157]。此外,REVEILLE1和PLETHORA转录活化因子正调控拟南芥*YUC*基因^[140]。相反,SPL/NZZ(*sporocyteless/nozzle*)转录因子是一种

孢子发生的调控因子,负调控*YUC2*和*YUC6*基因^[141]。这些结果表明,在发育和环境变化中*TAA*和*YUC*基因家族是植物中IAA水平调控的重要靶点。

3.3 生长素正调控ABA生物合成和信号转导

ABA抑制大豆种子萌发,而GA促进大豆种子萌发^[142]。qPCR分析表明,IAA处理显著上调大豆种子吸胀过程中ABA生物合成基因*GmABA2*和*GmAAO*的转录水平,其中*GmABA2*在整个吸胀过程中保持较高的转录水平,而*GmAAO*的转录水平在吸胀后3 h达到峰值,然后下降;IAA处理显著降低ABA分解代谢基因*GmCYP707A1*的转录水平^[13]。外源IAA处理通过上调*GmABI4*、*GmABI5*和*GmRD29-A*的转录水平显著增强ABA的信号转导,*GmABI4*和*GmABI5*是ABA信号转导途径中的关键正调控因子,而*GmRD29-A*是下游ABA反应基因^[5]。氟啶酮(*fluridone*)是一种ABA生物合成的抑制剂,氟啶酮处理促进大豆种子萌发,增加萌发后胚根的长度和幼苗鲜重,并能恢复IAA处理种子的正常萌发表型^[13]。

3.3.1 生长素信号转导途径是ABA抑制种子萌发所需

ABI4和ABI5是2个重要的转录因子,其功能缺失突变体*abi4*和*abi5-1*对ABA介导的种子萌发抑制是不敏感的,然而突变体的种子休眠没有变化^[7,8],表明ABA介导的种子休眠和ABA抑制种子萌发可能具有不同的信号转导途径。外源和内源IAA均以ABA依赖的方式抑制种子萌发^[12],表明生长素和ABA对种子萌发具有协同抑制作用。这种协同抑制作用是IAA剂量依赖的,在1 $\mu\text{mol/L}$ ABA存在下,4 $\mu\text{mol/L}$ IAA的协同效应最大;在缺乏ABA的情况下,相同浓度的IAA不抑制种子萌发^[12],表明生长素介导的种子萌发抑制依赖于ABA。

在1 $\mu\text{mol/L}$ ABA存在下,*yuc1 yuc6*突变体种子的萌发比野生型种子更快。尽管*tir1 afb1 afb2 afb3*的大多数种子都有缺陷,但少数的四重突变体种子以及几乎所有的单突变体和双突变体种子都是正常的,其萌发类似于野生型种子。四重突变体的正常种子对ABA不敏感,生长素信号转导缺陷与ABA不敏感之间具有紧密的正相关性。此外,*axr2-1*和*axr3-1*突变体种子对ABA的敏感性比野生型种子更低^[12]。

ARF活化/抑制下游生长素反应基因。在种子萌发过程中,*arf10*和*arf16*对ABA的敏感性较低,*arf10 arf16*双突变体对ABA的敏感性更低。这一结果与35S:

*MIR160*和*arf10 arf16*的种子休眠特性一致. 表达*MIR160*抗性的*mARF10*和*mARF16*的作用与*arf10*和*arf16*突变的作用相反^[12].

3.3.2 ABI3和生长素在种子休眠与萌发中的作用

生长素在ABA介导的种子休眠与萌发过程中可能有两种作用方式: 生长素促进ABA的生物合成, 或者活化ABA反应. 由于IAA对种子休眠与萌发的影响存在于ABA生物合成缺陷突变体*aba2-1*中, 可以认为ABA的生物合成不是生长素在种子休眠与萌发中的作用位点^[12].

ABI3、ABI4和ABI5是3个种子专一的ABA信号转导的关键组分, 然而, 只有ABI3在ABA介导的种子休眠和萌发抑制中起作用^[12]. 在野生型种子中, *ABI3* mRNA的水平在未萌发的种子中较高, 在萌发后迅速下降; 相反, 从*iaaM-OX*和*mARF10*植株中新鲜收获的干(freshly harvested dry, FHD)种子在其吸胀过程中*ABI3* mRNA的水平保持较长的时间(直到108 h), 但在*arf10 arf16*双突变体种子中*ABI3* mRNA的水平比野生型种子下降更快. 在ABA存在下, 类似的结果也在种子萌发过程中观察到. 此外, 外源IAA也增加FHD种子吸胀过程中*ABI3* mRNA的水平, 但对ABI3蛋白的稳定性具有很小的影响^[12]. 这些结果表明, 生长素和ARF10/16对于吸胀后种子中*ABI3*表达的维持是必需的.

Liu等人^[12]发现, 在*abi3-1*突变体中IAA和ABA对种子萌发的协同抑制作用丧失, *iaaM-OX*株系种子的深休眠和ABA过敏性反应在*iaaM-OX/abi3*双突变体中降低, 在*mARF16/abi3*双突变体中也观察到种子的深休眠和ABA敏感性下降, 以及生长素诱导萌发种子中ABI5蛋白的大量积累, 表明生长素对种子休眠的促进作用和ABA对种子萌发的抑制作用依赖于ABI3的功能.

3.3.3 ARF间接地调控ABI3的表达

ARF通过与启动子中的AuxRE结合来调控一系列生长素反应基因的表达^[19,20]. 利用野生型*ABI3:ABI3*或者突变的*mABI3:ABI3*来转化*abi3-1*, 其中TGTCTC序列被突变为AAGCTC; 突变的*mABI3:ABI3*结构与野生型结构相同, 能够补充*abi3-1*中ABA不敏感表型^[12]. 这一结果表明, TGTCTC序列对于种子萌发过程中*ABI3*的表达不是必需的. 这一假设与酵母单杂试验一致, 表明ARF10和ARF16不与*ABI3*启动子中含有TGTCTC元件的DNA区域或者覆盖一个2.7 kb *ABI3*启动子的其他区域结合^[12].

此外, *ABI3*仅仅在吸胀和未萌发的种子中被ABA高度活化, 而在幼苗中不被ABA活化^[12]. 利用myc标记的ARF16转基因株系的未萌发(吸胀后12 h)种子进行染色质免疫沉淀(chromatin immunoprecipitation, ChIP)分析, 试验结果与酵母单杂数据一致, 抗myc抗体不沉淀*ABI3*启动子片段, 表明ARF10或者ARF16不可能直接与*ABI3*启动子结合, 可能招募或者活化另外的种子专一转录因子来促进*ABI3*的表达(图3).

3.4 生长素负调控GA生物合成和信号转导

在种子吸胀过程中, *GmGA3*、*GmGA3ox2*、*GmGA3ox1*和*GmKAO*的表达水平被IAA处理明显降低, 特别是*GmGA3*的转录水平被IAA处理显著降低, 且从吸胀后3 h一直保持在很低的水平^[13]. IAA处理也降低大豆种子吸胀过程中活性GA₁和GA₄的水平, 显著增加ABA的水平, 从而使GA₁/ABA和GA₄/ABA的比值下调^[13], GA/ABA比值是种子萌发的关键因素^[4,5,143]. 多效唑(paclobutrazol, PAC)是一种GA生物合成的抑制剂, 能延缓大豆种子萌发以及降低萌发后胚根的长度和幼苗鲜重^[13].

*GmRGL*编码DELLA转录调控蛋白, 抑制拟南芥种子萌发过程中种皮的破裂^[144]. 在IAA存在下, *GmRGL*的转录水平在大豆种子吸胀过程中稍有上调^[13]. 这些结果表明, 外源IAA处理似乎负调控种子萌发过程中GA的生物合成和信号转导.

4 结束语

生长素是一种重要的植物激素, 在植物生长和发育的许多生理生化过程中起关键作用, 例如胚和果实的发育、组织分化、根的起始、植物的向地性以及植物对生物和非生物胁迫的反应^[17,130,145]. 尽管近年来这些领域的研究已经取得了重要的进展, 但仍然有一些重要的科学问题需要进一步研究. 例如生长素的生物合成和分解代谢都存在多条途径^[17,18], 那么这些途径是否同时存在于同一物种的同一组织, 还是具有物种、组织和发育阶段的特异性? 在响应生长发育和环境变化时, 为了控制组织或者细胞内的生长素水平, 这些途径怎样被启动、运行和协调?

IAA信号转导途径包括典型和非典型的生长素信号转导途径^[20,26]. 最近研究认为, 在非典型的生长素信号转导途径中, 生长素也通过AUX1进入细胞, 被定位于细胞核中的SCF^{TIR1/AFB}受体复合体和细胞质中的

图3 ABA-生长素相互作用调控种子休眠/萌发的模型^[12]。当生长素信号转导被低水平生长素或者信号中断失活时,生长素反应因子10 (ARF10)和ARF16被Aux/IAA抑制因子AXR2和AXR3失活。ABI3的表达不能被维持,从而解除种子休眠。随着生长素信号转导的活化,生长素与生长素受体TIR1/AFB F-box蛋白结合,促进IAA7/AXR2和IAA17/AXR3的降解。这种降解释放ARF10和ARF16的活性,以及维持ABI3的表达,从而保持种子休眠和抑制种子萌发。实心箭头表示直接调控,虚线箭头表示间接调控。黑色方框表示ABI3的基因区域

Figure 3 A model for seed dormancy/germination regulated by the ABA-auxin interaction^[12]. When auxin signaling is inactivated by low auxin level or signaling disruption, ARF10 (auxin response factor 10) and ARF16 are inactivated by the Aux/IAA repressors AXR2 and AXR3. ABI3 expression cannot be maintained, and seed dormancy is released. With auxin signaling activation, auxin binds to the auxin receptor TIR1/AFB F-box proteins and promotes the degradation of IAA7/AXR2 and IAA17/AXR3. The degradation releases the activity of ARF10 and ARF16 and maintains the expression of ABI3, which protects seed dormancy and inhibits seed germination. The solid arrows indicate direct regulation, and the dotted arrows indicate indirect regulation. The black box indicates the ABI3 gene region

TIR1所感受。值得研究的是,在整合生理条件或者对环境信号反应时哪一条途径优先响应,这2条途径之间怎样联系还不清楚。此外,在非典型的生长素信号转导途径中,生长素转导的下游事件仍然不清楚^[26]。

生长素反应组织对变化的生长素浓度具有不同的反应能力。在植物基因组中,信号转导途径的所有核心组分都由多个同源成员组成。每个组分的不同成员都有其独特的生化特性,这些核心组分的不同成员之间的相互作用可能产生一系列的反应结果。细胞是否通过调控不同组的基因来响应不同生长素浓度的变化仍然是一个未解决的问题^[20]。

生长素诱导的酸生长模型(acid growth model induced by auxin)提出,生长素活化质膜H⁺-ATPase质子

泵,泵质子(H⁺)进入细胞壁基质,导致细胞壁的酸化。细胞壁的酸化激活钾通道(potassium channel),钾通道运输K⁺进入细胞质,促进水分吸收和维持膨压。酸性pH活化细胞壁松弛蛋白(wall-loosening protein)和酶,使细胞壁不同多糖之间的连接松弛。细胞壁松弛蛋白和酶引起纤维素微纤丝(cellulose microfibril)的滑动和移动,增加细胞壁的孔隙度,导致细胞壁的伸展性增加和细胞迅速伸长^[146]。研究发现,种子完成萌发仅仅需要下胚轴-胚根过渡区的细胞伸长,不需要细胞分裂^[133,134],以及低浓度(0.05~5 nmol/L)的生长素促进种子萌发^[132]。低浓度生长素是否通过生长素诱导的酸生长模型促进种子萌发需要进一步证实,这一模型的证实也可能有助于种子萌发机理的解释。

参考文献

- Xu H H, Li N, Liu S J, et al. Research progress in seed germination and its control (in Chinese). *Acta Agron Sin*, 2014, 40: 1141–1156 [徐恒恒, 黎妮, 刘树君, 等. 种子萌发及其调控的研究进展. *作物学报*, 2014, 40: 1141–1156]
- Bewley J D, Bradford K J, Hilhorst H W M, et al. *Physiology of Development, Germination and Dormancy*. 3rd ed. New York: Springer, 2013
- Nonogaki H. Seed dormancy and germination emerging mechanisms and new hypotheses. *Front Plant Sci*, 2014, e5: 233

- 4 Finkelstein R, Reeves W, Ariizumi T, et al. Molecular aspects of seed dormancy. *Annu Rev Plant Biol*, 2008, 59: 387–415
- 5 Shu K, Liu X, Xie Q, et al. Two faces of one seed: Hormonal regulation of dormancy and germination. *Mol Plant*, 2016, 9: 34–45
- 6 Song S Q, Liu J, Xu H H, et al. ABA metabolism and signaling and their molecular mechanism regulating seed dormancy and germination (in Chinese). *Sci Agric Sin*, 2020, 53: 857–873 [宋松泉, 刘军, 徐恒恒, 等. 脱落酸代谢与信号传递及其调控种子休眠与萌发的分子机制. *中国农业科学*, 2020, 53: 857–873]
- 7 Hiroyuki N. Seed biology updates—Highlights and new discoveries in seed dormancy and germination research. *Front Plant Sci*, 2017, 8: 524
- 8 Hiroyuki N. Seed germination and dormancy: The classic story, new puzzles, and evolution. *J Integr Plant Biol*, 2019, 61: 541–563
- 9 Ito T, Okada K, Fukazawa J, et al. DELLA-dependent and -independent gibberellin signaling. *Plant Signal Behav*, 2018, 13: e1445933
- 10 Urbanova T, Leubner-Metzger G. Gibberellin and seed germination. In: Hedden P, Thomas S G, eds. *Annual Plant Reviews*. Vol. 49: The Gibberellins. Oxford: John Wiley & Sons, 2016. 253–284
- 11 Yang L, Jiang Z, Liu S, et al. Interplay between REVEILLE1 and RGA-LIKE2 regulates seed dormancy and germination in *Arabidopsis*. *New Phytol*, 2019, doi: 10.1111/nph.16236
- 12 Liu X, Zhang H, Zhao Y, et al. Auxin controls seed dormancy through stimulation of abscisic acid signaling by inducing ARF-mediated ABI3 activation in *Arabidopsis*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2013, 110: 15485–15490
- 13 Shuai H, Meng Y, Luo X, et al. Exogenous auxin represses soybean seed germination through decreasing the gibberellin/abscisic acid (GA/ABA) ratio. *Sci Rep*, 2017, 7: 12620
- 14 Song S Q, Liu J, Xu H H, et al. Biosynthesis and signaling of ethylene and their regulation on seed germination and dormancy (in Chinese). *Acta Agron Sin*, 2019, 45: 969–981 [宋松泉, 刘军, 徐恒恒, 等. 乙烯的生物合成与信号及其对种子萌发和休眠的调控. *作物学报*, 2019, 45: 969–981]
- 15 Corbinau F, Xia Q, Bailly C, et al. Ethylene, a key factor in the regulation of seed dormancy. *Front Plant Sci*, 2014, 5: 539
- 16 Wang Y, Li L, Ye T, et al. Cytokinin antagonizes ABA suppression to seed germination of *Arabidopsis* by downregulating ABI5 expression. *Plant J*, 2011, 68: 249–261
- 17 Casanova-Sáez R, Voß U. Auxin metabolism controls developmental decisions in land plants. *Trends Plant Sci*, 2019, 24: 741–754
- 18 Kasahara H. Current aspects of auxin biosynthesis in plants. *Biosci Biotech Biochem*, 2016, 80: 34–42
- 19 Leyser O. Auxin signaling. *Plant Physiol*, 2018, 176: 465–479
- 20 Weijers D, Wagner D. Transcriptional responses to the auxin hormone. *Annu Rev Plant Biol*, 2016, 67: 539–574
- 21 Liu P P, Montgomery T A, Fahlgren N, et al. Repression of AUXIN RESPONSE FACTOR10 by microRNA160 is critical for seed germination and post-germination stages. *Plant J*, 2007, 52: 133–146
- 22 He J, Duan Y, Hua D, et al. DEXH box RNA helicase-mediated mitochondrial reactive oxygen species production in *Arabidopsis* mediates crosstalk between abscisic acid and auxin signaling. *Plant Cell*, 2012, 24: 1815–1833
- 23 Ogawa M, Hanada A, Yamauchi Y, et al. Gibberellin biosynthesis and response during *Arabidopsis* seed germination. *Plant Cell*, 2003, 15: 1591–1604
- 24 Thole J M, Beisner E R, Liu J, et al. Absciscic acid regulates root elongation through the activities of auxin and ethylene in *Arabidopsis thaliana*. *G3*, 2014, 4: 1259–1274
- 25 Carrera E, Holman T, Medhurst A, et al. Gene expression profiling reveals defined functions of the ATP-binding cassette transporter COMATOSE late in phase II of germination. *Plant Physiol*, 2007, 143: 1669–1679
- 26 Kubeš M, Napier R. Non-canonical auxin signalling: Fast and curious. *J Exp Bot*, 2019, 70: 2609–2614
- 27 Ma Q, Grones P, Robert S. Auxin signaling: A big question to be addressed by small molecules. *J Exp Bot*, 2018, 69: 313–328
- 28 Shirley N J, Aubert M K, Wilkinson L G, et al. Translating auxin responses into ovules, seeds and yield: Insight from *Arabidopsis* and the cereals. *J Integr Plant Biol*, 2019, 61: 310–336
- 29 Lam H K, McAdam S A M, McAdam E L, et al. Evidence that chlorinated auxin is restricted to the Fabaceae but not to the Fabeae. *Plant Physiol*, 2015, 168: 798–803
- 30 Maeda H, Dudareva N. The shikimate pathway and aromatic amino acid biosynthesis in plants. *Annu Rev Plant Biol*, 2012, 63: 73–105
- 31 Mashiguchi K, Tanaka K, Sakai T, et al. The main auxin biosynthesis pathway in *Arabidopsis*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2011, 108: 18512–18517
- 32 Stepanova A N, Yun J, Robles L M, et al. The *Arabidopsis* YUCCA1 flavin monooxygenase functions in the indole-3-pyruvic acid branch of auxin biosynthesis. *Plant Cell*, 2011, 23: 3961–3973
- 33 Zhao Y. Auxin biosynthesis. *Arabidopsis Book*, 2014, 12: e0173
- 34 Brumos J, Alonso J M, Stepanova A N. Genetic aspects of auxin biosynthesis and its regulation. *Physiol Plant*, 2014, 151: 3–12
- 35 Eklund D M, Ishizaki K, Flores-Sandoval E, et al. Auxin produced by the indole-3-pyruvic acid pathway regulates development and gemmae dormancy in the liverwort *Marchantia polymorpha*. *Plant Cell*, 2015, 27: 1650–1669
- 36 Sugawara S, Hishiyama S, Jikumaru Y, et al. Biochemical analyses of indole-3-acetaldoxime-dependent auxin biosynthesis in *Arabidopsis*. *Proc*

- Natl Acad Sci USA, 2009, 106: 5430–5435
- 37 Mano Y, Nemoto K. The pathway of auxin biosynthesis in plants. *J Exp Bot*, 2012, 63: 2853–2872
 - 38 Stepanova A N, Robertson-Hoyt J, Yun J, et al. TAA1-mediated auxin biosynthesis is essential for hormone crosstalk and plant development. *Cell*, 2008, 133: 177–191
 - 39 Yamada M, Greenham K, Prigge M J, et al. The *TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE2* gene is required for auxin synthesis and diverse aspects of plant development. *Plant Physiol*, 2009, 151: 168–179
 - 40 Yoshikawa T, Ito M, Sumikura T, et al. The rice *FISH BONE* gene encodes a tryptophan aminotransferase, which affects pleiotropic auxin-related processes. *Plant J*, 2014, 78: 927–936
 - 41 Chen Q, Dai X, De-Paoli H, et al. Auxin overproduction in shoots cannot rescue auxin deficiencies in *Arabidopsis* roots. *Plant Cell Physiol*, 2014, 55: 1072–1079
 - 42 Cheng Y, Dai X, Zhao Y. Auxin biosynthesis by the YUCCA flavin monooxygenases controls the formation of floral organs and vascular tissues in *Arabidopsis*. *Genes Dev*, 2006, 20: 1790–1799
 - 43 Novák O, Hényková E, Sairanen I, et al. Tissue-specific profiling of the *Arabidopsis thaliana* auxin metabolome. *Plant J*, 2012, 72: 523–536
 - 44 Kriechbaumer V, Wang P, Hawes C, et al. Alternative splicing of the auxin biosynthesis gene *YUCCA4* determines its subcellular compartmentation. *Plant J*, 2012, 70: 292–302
 - 45 Dai X, Mashiguchi K, Chen Q, et al. The biochemical mechanism of auxin biosynthesis by an *Arabidopsis* YUCCA flavin-containing monooxygenase. *J Biol Chem*, 2013, 288: 1448–1457
 - 46 Cheng Y, Dai X, Zhao Y. Auxin synthesized by the YUCCA flavin monooxygenases is essential for embryogenesis and leaf formation in *Arabidopsis*. *Plant Cell*, 2007, 19: 2430–2439
 - 47 Hentrich M, Böttcher C, Dürsting P, et al. The jasmonic acid signaling pathway is linked to auxin homeostasis through the modulation of *YUCCA8* and *YUCCA9* gene expression. *Plant J*, 2013, 74: 626–637
 - 48 Fujino K, Matsuda Y, Ozawa K, et al. *NARROW LEAF 7* controls leaf shape mediated by auxin in rice. *Mol Genet Genomics*, 2008, 279: 499–507
 - 49 Bernardi J, Lanubile A, Li Q B, et al. Impaired auxin biosynthesis in the *defective endosperm18* mutant is due to mutational loss of expression in the *ZmYuc1* gene encoding endosperm-specific YUCCA1 protein in maize. *Plant Physiol*, 2012, 160: 1318–1328
 - 50 He W, Brumos J, Li H, et al. A small-molecule screen identifies l-kynurenine as a competitive inhibitor of TAA1/TAR activity in ethylene-directed auxin biosynthesis and root growth in *Arabidopsis*. *Plant Cell*, 2011, 23: 3944–3960
 - 51 Nishimura T, Hayashi K, Suzuki H, et al. Yucasin is a potent inhibitor of YUCCA, a key enzyme in auxin biosynthesis. *Plant J*, 2014, 77: 352–366
 - 52 Soeno K, Goda H, Ishii T, et al. Auxin biosynthesis inhibitors, identified by a genomics-based approach, provide insights into auxin biosynthesis. *Plant Cell Physiol*, 2010, 51: 524–536
 - 53 Zheng Z, Guo Y, Novák O, et al. Coordination of auxin and ethylene biosynthesis by the aminotransferase VAS1. *Nat Chem Biol*, 2013, 9: 244–246
 - 54 Kong W, Li Y, Zhang M, et al. A novel *Arabidopsis* microRNA promotes IAA biosynthesis via the indole-3-acetaldoxime pathway by suppressing *SUPERROOT1*. *Plant Cell Physiol*, 2015, 56: 715–726
 - 55 Bender J, Celenza J L. Indolic glucosinolates at the crossroads of tryptophan metabolism. *Phytochem Rev*, 2009, 8: 25–37
 - 56 Douglas Grubb C, Zipp B J, Ludwig-Müller J, et al. *Arabidopsis* glucosyltransferase UGT74B1 functions in glucosinolate biosynthesis and auxin homeostasis. *Plant J*, 2004, 40: 893–908
 - 57 Franklin K A, Lee S H, Patel D, et al. Phytochrome-interacting factor 4 (PIF4) regulates auxin biosynthesis at high temperature. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2011, 108: 20231–20235
 - 58 Kriechbaumer V, Park W J, Piotrowski M, et al. Maize nitrilases have a dual role in auxin homeostasis and β -cyanoalanine hydrolysis. *J Exp Bot*, 2007, 58: 4225–4233
 - 59 Su T, Xu J, Li Y, et al. Glutathione-indole-3-acetonitrile is required for camalexin biosynthesis in *Arabidopsis thaliana*. *Plant Cell*, 2011, 23: 364–380
 - 60 Zhao Y. Trp-dependent auxin biosynthesis in *Arabidopsis*: Involvement of cytochrome P450s CYP79B2 and CYP79B3. *Genes Dev*, 2002, 16: 3100–3112
 - 61 Irmisch S, Zeltner P, Handrick V, et al. The maize cytochrome P450 CYP79A61 produces phenylacetaldoxime and indole-3-acetaldoxime in heterologous systems and might contribute to plant defense and auxin formation. *BMC Plant Biol*, 2015, 15: 128
 - 62 Korasick D A, Enders T A, Strader L C. Auxin biosynthesis and storage forms. *J Exp Bot*, 2013, 64: 2541–2555
 - 63 Nemoto K, Hara M, Suzuki M, et al. The *NtAM1* gene functions in cell division of tobacco BY-2 cells in the presence of indole-3-acetamide. *FEBS Lett*, 2009, 583: 487–492
 - 64 Woodward A W. Auxin: Regulation, action, and interaction. *Ann Bot*, 2005, 95: 707–735
 - 65 Quittenden L J, Davies N W, Smith J A, et al. Auxin biosynthesis in pea: Characterization of the tryptamine pathway. *Plant Physiol*, 2009, 151:

1130–1138

- 66 Yu P, Lor P, Ludwig-Müller J, et al. Quantitative evaluation of IAA conjugate pools in *Arabidopsis thaliana*. *Planta*, 2015, 241: 539–548
- 67 Wang B, Chu J, Yu T, et al. Tryptophan-independent auxin biosynthesis contributes to early embryogenesis in *Arabidopsis*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2015, 112: 4821–4826
- 68 Ludwig-Müller J. Auxin conjugates: Their role for plant development and in the evolution of land plants. *J Exp Bot*, 2011, 62: 1757–1773
- 69 Staswick P E, Serban B, Rowe M, et al. Characterization of an *Arabidopsis* enzyme family that conjugates amino acids to indole-3-acetic acid. *Plant Cell*, 2005, 17: 616–627
- 70 Porco S, Pěnčík A, Rashed A, et al. Dioxxygenase-encoding *AtDAO1* gene controls IAA oxidation and homeostasis in *Arabidopsis*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2016, 113: 11016–11021
- 71 Zheng Z, Guo Y, Novák O, et al. Local auxin metabolism regulates environment-induced hypocotyl elongation. *Nat Plants*, 2016, 2: 16025
- 72 Gutierrez L, Mongelard G, Floková K, et al. Auxin controls *Arabidopsis* adventitious root initiation by regulating jasmonic acid homeostasis. *Plant Cell*, 2012, 24: 2515–2527
- 73 Westfall C S, Sherr A M, Zubietta C, et al. *Arabidopsis thaliana* GH3.5 acyl acid amido synthetase mediates metabolic crosstalk in auxin and salicylic acid homeostasis. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2016, 113: 13917–13922
- 74 Rampey R A, LeClere S, Kowalczyk M, et al. A family of auxin-conjugate hydrolases that contributes to free indole-3-acetic acid levels during *Arabidopsis* germination. *Plant Physiol*, 2004, 135: 978–988
- 75 Jakubowska A. The auxin conjugate 1-O-indole-3-acetyl- β -D-glucose is synthesized in immature legume seeds by IAGlc synthase and may be used for modification of some high molecular weight compounds. *J Exp Bot*, 2004, 55: 791–801
- 76 Jakubowska A, Kowalczyk S. A specific enzyme hydrolyzing 6-O(4-O)-indole-3-ylacetyl- β -d-glucose in immature kernels of *Zea mays*. *J Plant Physiol*, 2005, 162: 207–213
- 77 Ishimaru K, Hirotsu N, Madoka Y, et al. Loss of function of the IAA-glucose hydrolase gene *TGW6* enhances rice grain weight and increases yield. *Nat Genet*, 2013, 45: 707–711
- 78 Qin G, Gu H, Zhao Y, et al. An indole-3-acetic acid carboxyl methyltransferase regulates *Arabidopsis* leaf development. *Plant Cell*, 2005, 17: 2693–2704
- 79 Abbas M, Hernández-García J, Pollmann S, et al. Auxin methylation is required for differential growth in *Arabidopsis*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2018, 115: 6864–6869
- 80 Yang Y, Xu R, Ma C, et al. Inactive methyl indole-3-acetic acid ester can be hydrolyzed and activated by several esterases belonging to the AtMES esterase family of *Arabidopsis*. *Plant Physiol*, 2008, 147: 1034–1045
- 81 Strader L C, Culler A H, Cohen J D, et al. Conversion of endogenous indole-3-butyric acid to indole-3-acetic acid drives cell expansion in *Arabidopsis* seedlings. *Plant Physiol*, 2010, 153: 1577–1586
- 82 Frick E M, Strader L C. Roles for IBA-derived auxin in plant development. *J Exp Bot*, 2018, 69: 169–177
- 83 Pěnčík A, Simonovik B, Petersson S V, et al. Regulation of auxin homeostasis and gradients in *Arabidopsis* roots through the formation of the indole-3-acetic acid catabolite 2-oxindole-3-acetic acid. *Plant Cell*, 2013, 25: 3858–3870
- 84 Kubeš M, Yang H, Richter G L, et al. The *Arabidopsis* concentration-dependent influx/efflux transporter ABCB4 regulates cellular auxin levels in the root epidermis. *Plant J*, 2012, 69: 640–654
- 85 Zhao Z, Zhang Y, Liu X, et al. A role for a dioxxygenase in auxin metabolism and reproductive development in rice. *Dev Cell*, 2013, 27: 113–122
- 86 Tanaka K, Hayashi K, Natsume M, et al. UGT74D1 catalyzes the glucosylation of 2-oxindole-3-acetic acid in the auxin metabolic pathway in *Arabidopsis*. *Plant Cell Physiol*, 2014, 55: 218–228
- 87 Mellor N, Band L R, Pěnčík A, et al. Dynamic regulation of auxin oxidase and conjugating enzymes *AtDAO1* and *GH3* modulates auxin homeostasis. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2016, 113: 11022–11027
- 88 Dharmasiri N, Dharmasiri S, Estelle M. The F-box protein TIR1 is an auxin receptor. *Nature*, 2005, 435: 441–445
- 89 Parry G, Calderon-Villalobos L I, Prigge M, et al. Complex regulation of the TIR1/AFB family of auxin receptors. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2009, 106: 22540–22545
- 90 Gilkerson J, Hu J, Brown J, et al. Isolation and characterization of *cull1-7*, a recessive allele of *CULLIN1* that disrupts SCF function at the C terminus of *CUL1* in *Arabidopsis thaliana*. *Genetics*, 2009, 181: 945–963
- 91 Calderón Villalobos L I A, Lee S, De Oliveira C, et al. A combinatorial TIR1/AFB–Aux/IAA co-receptor system for differential sensing of auxin. *Nat Chem Biol*, 2012, 8: 477–485
- 92 Tan X, Calderon-Villalobos L I A, Sharon M, et al. Mechanism of auxin perception by the TIR1 ubiquitin ligase. *Nature*, 2007, 446: 640–645
- 93 Salehin M, Bagchi R, Estelle M. SCF^{TIR1/AFB}-based auxin perception: Mechanism and Role in plant growth and development. *Plant Cell*, 2015, 27: 9–19
- 94 Yu H, Zhang Y, Moss B L, et al. Untethering the TIR1 auxin receptor from the SCF complex increases its stability and inhibits auxin response.

- [Nat Plants](#), 2015, 1: 14030
- 95 Yamaguchi N, Wu M F, Winter C M, et al. A molecular framework for auxin-mediated initiation of flower primordia. [Dev Cell](#), 2013, 24: 271–282
 - 96 Guilfoyle T J. The PB1 domain in auxin response factor and Aux/IAA proteins: A versatile protein interaction module in the auxin response. [Plant Cell](#), 2015, 27: 33–43
 - 97 Korasick D A, Westfall C S, Lee S G, et al. Molecular basis for AUXIN RESPONSE FACTOR protein interaction and the control of auxin response repression. [Proc Natl Acad Sci USA](#), 2014, 111: 5427–5432
 - 98 Dreher K A, Brown J, Saw R E, et al. The *Arabidopsis* Aux/IAA protein family has diversified in degradation and auxin responsiveness. [Plant Cell](#), 2006, 18: 699–714
 - 99 Moss B L, Mao H, Guseman J M, et al. Rate motifs tune auxin/indole-3-acetic acid degradation dynamics. [Plant Physiol](#), 2015, 169: 803–813
 - 100 Causier B, Ashworth M, Guo W, et al. The TOPLESS interactome: A framework for gene repression in *Arabidopsis*. [Plant Physiol](#), 2012, 158: 423–438
 - 101 Ke J, Ma H, Gu X, et al. Structural basis for recognition of diverse transcriptional repressors by the TOPLESS family of corepressors. [Sci Adv](#), 2015, 1: e1500107
 - 102 dos Santos Maraschin F, Memelink J, Offringa R. Auxin-induced, SCF^{TIR1}-mediated poly-ubiquitination marks AUX/IAA proteins for degradation. [Plant J](#), 2009, 59: 100–109
 - 103 Gilkerson J, Kelley D R, Tam R, et al. Lysine residues are not required for proteasome-mediated proteolysis of the auxin/indole acidic acid protein IAA1. [Plant Physiol](#), 2015, 168: 708–720
 - 104 Boer D R, Freire-Rios A, van den Berg W A M, et al. Structural basis for DNA binding specificity by the auxin-dependent ARF transcription factors. [Cell](#), 2014, 156: 577–589
 - 105 Finet C, Berne-Dedieu A, Scutt C P, et al. Evolution of the ARF gene family in land plants: Old domains, new tricks. [Mol Biol Evol](#), 2013, 30: 45–56
 - 106 Kato H, Ishizaki K, Kouno M, et al. Auxin-mediated transcriptional system with a minimal set of components is critical for morphogenesis through the life cycle in *Marchantia polymorpha*. [PLoS Genet](#), 2015, 11: e1005084
 - 107 Nanao M H, Vinos-Poyo T, Brunoud G, et al. Structural basis for oligomerization of auxin transcriptional regulators. [Nat Commun](#), 2014, 5: 3617
 - 108 Piya S, Shrestha S K, Binder B, et al. Protein-protein interaction and gene co-expression maps of ARFs and Aux/IAs in *Arabidopsis*. [Front Plant Sci](#), 2014, 5: 744
 - 109 Richter R, Behringer C, Zourelidou M, et al. Convergence of auxin and gibberellin signaling on the regulation of the GATA transcription factors GNC and GNL in *Arabidopsis thaliana*. [Proc Natl Acad Sci USA](#), 2013, 110: 13192–13197
 - 110 Wang S, Hagen G, Guilfoyle T J. ARF-Aux/IAA interactions through domain III/IV are not strictly required for auxin-responsive gene expression. [Plant Signal Behav](#), 2013, 8: e24526
 - 111 Wu M F, Yamaguchi N, Xiao J, et al. Auxin-regulated chromatin switch directs acquisition of flower primordium founder fate. [eLife](#), 2015, 4: e09269
 - 112 Krogan N T, Hogan K, Long J A. APETALA2 negatively regulates multiple floral organ identity genes in *Arabidopsis* by recruiting the co-repressor TOPLESS and the histone deacetylase HDA19. [Development](#), 2012, 139: 4180–4190
 - 113 Clapier C R, Cairns B R. The biology of chromatin remodeling complexes. [Annu Rev Biochem](#), 2009, 78: 273–304
 - 114 Hertel R, Thomson K S, Russo V E A. In-vitro auxin binding to particulate cell fractions from corn coleoptiles. [Planta](#), 1972, 107: 325–340
 - 115 Enders T A, Strader L C. Auxin activity: Past, present, and future. [Am J Bot](#), 2015, 102: 180–196
 - 116 Gao Y, Zhang Y, Zhang D, et al. Auxin binding protein 1 (ABP1) is not required for either auxin signaling or *Arabidopsis* development. [Proc Natl Acad Sci USA](#), 2015, 112: 2275–2280
 - 117 Badescu G O, Napier R M. Receptors for auxin: Will it all end in TIRs? [Trends Plant Sci](#), 2006, 11: 217–223
 - 118 Fendrych M, Akhmanova M, Merrin J, et al. Rapid and reversible root growth inhibition by TIR1 auxin signalling. [Nat Plants](#), 2018, 4: 453–459
 - 119 Dindas J, Scherzer S, Roelfsema M R G, et al. AUX1-mediated root hair auxin influx governs SCFTIR1/AFB-type Ca²⁺ signaling. [Nat Commun](#), 2018, 9: 1174
 - 120 Wang R, Zhang Y, Kieffer M, et al. HSP90 regulates temperature-dependent seedling growth in *Arabidopsis* by stabilizing the auxin co-receptor F-box protein TIR1. [Nat Commun](#), 2016, 7: 10269
 - 121 Uchida N, Takahashi K, Iwasaki R, et al. Chemical hijacking of auxin signaling with an engineered auxin-TIR1 pair. [Nat Chem Biol](#), 2018, 14: 299–305
 - 122 Roosjen M, Paque S, Weijers D. Auxin response factors: Output control in auxin biology. [J Exp Bot](#), 2018, 69: 179–188
 - 123 Simonini S, Deb J, Moubayidin L, et al. A noncanonical auxin-sensing mechanism is required for organ morphogenesis in *Arabidopsis*. [Genes Dev](#), 2016, 30: 2286–2296

- 124 Simonini S, Mas P J, Mas C M V S, et al. Auxin sensing is a property of an unstructured domain in the auxin response factor ETTIN of *Arabidopsis thaliana*. *Sci Rep*, 2018, 8: 13563
- 125 Simonini S, Stephenson P, Østergaard L. A molecular framework controlling style morphology in *Brassicaceae*. *Development*, 2018, 145: dev158105
- 126 Mutte S K, Kato H, Rothfels C, et al. Origin and evolution of the nuclear auxin response system. *eLife*, 2018, 7: e33399
- 127 Marhava P, Bassukas A E L, Zourelidou M, et al. A molecular rheostat adjusts auxin flux to promote root protophloem differentiation. *Nature*, 2018, 558: 297–300
- 128 Enders T A, Frick E M, Strader L C. An *Arabidopsis* kinase cascade influences auxin-responsive cell expansion. *Plant J*, 2017, 92: 68–81
- 129 Dai N, Wang W, Patterson S E, et al. The TMK subfamily of receptor-like kinases in *Arabidopsis* display an essential role in growth and a reduced sensitivity to auxin. *PLoS One*, 2013, 8: e60990
- 130 Li Z, Zhang J, Liu Y, et al. Exogenous auxin regulates multi-metabolic network and embryo development, controlling seed secondary dormancy and germination in *Nicotiana tabacum* L. *BMC Plant Biol*, 2016, 16: 41
- 131 Wang Z, Chen F, Li X, et al. *Arabidopsis* seed germination speed is controlled by SNL histone deacetylase-binding factor-mediated regulation of AUX1. *Nat Commun*, 2016, 7: 13412
- 132 Finch-Savage W E, Leubner-Metzger G. Seed dormancy and the control of germination. *New Phytol*, 2006, 171: 501–523
- 133 Sliwinska E, Bassel G W, Bewley J D. Germination of *Arabidopsis thaliana* seeds is not completed as a result of elongation of the radicle but of the adjacent transition zone and lower hypocotyl. *J Exp Bot*, 2009, 60: 3587–3594
- 134 Wang J W, Wang L J, Mao Y B, et al. Control of root cap formation by microRNA-targeted auxin response factors in *Arabidopsis*. *Plant Cell*, 2005, 17: 2204–2216
- 135 Stone S L, Braybrook S A, Paula S L, et al. *Arabidopsis* LEAFY COTYLEDON2 induces maturation traits and auxin activity: Implications for somatic embryogenesis. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2008, 105: 3151–3156
- 136 Wójcikowska B, Jaskóla K, Gąsiorek P, et al. LEAFY COTYLEDON2 (LEC2) promotes embryogenic induction in somatic tissues of *Arabidopsis*, via YUCCA-mediated auxin biosynthesis. *Planta*, 2013, 238: 425–440
- 137 Eklund D M, Ståldal V, Valsecchi I, et al. The *Arabidopsis thaliana* STYLISH1 protein acts as a transcriptional activator regulating auxin biosynthesis. *Plant Cell*, 2010, 22: 349–363
- 138 Cui D, Zhao J, Jing Y, et al. The *Arabidopsis* IDD14, IDD15, and IDD16 cooperatively regulate lateral organ morphogenesis and gravitropism by promoting auxin biosynthesis and transport. *PLoS Genet*, 2013, 9: e1003759
- 139 Pinon V, Prasad K, Grigg S P, et al. Local auxin biosynthesis regulation by PLETHORA transcription factors controls phyllotaxis in *Arabidopsis*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2013, 110: 1107–1112
- 140 Li L C, Qin G J, Tsuge T, et al. *SPOROCTELESS* modulates *YUCCA* expression to regulate the development of lateral organs in *Arabidopsis*. *New Phytol*, 2008, 179: 751–764
- 141 Meng Y, Chen F, Shuai H W, et al. Karrikins delay soybean seed germination by mediating abscisic acid and gibberellin biogenesis under shaded conditions. *Sci Rep*, 2016, 6: 22073
- 142 Shu K, Chen Q, Wu Y, et al. ABI4 mediates antagonistic effects of abscisic acid and gibberellins at transcript and protein levels. *Plant J*, 2016, 85: 348–361
- 143 Piskurewicz U, Lopez-Molina L. The GA-signaling repressor RGL3 represses testa rupture in response to changes in GA and ABA levels. *Plant Signal Behav*, 2009, 4: 63–65
- 144 Cai Z, Zeng D, Liao J, et al. Genome-wide analysis of auxin receptor family genes in *Brassica juncea* var. *tumida*. *Genes*, 2019, 10: 165
- 145 Majda M, Robert S. The role of auxin in cell wall expansion. *Int J Mol Sci*, 2018, 19: 951

Summary for “生长素代谢与信号转导及其调控种子休眠与萌发的分子机制”

Metabolism and signaling of auxins and their roles in regulating seed dormancy and germination

Songquan Song^{1,2*}, Jun Liu², Cuifang Tang³, Wenhui Zhang², Hengheng Xu², Qi Zhang² & Jiadong Gao²

¹ Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China;

² Guangdong Provincial Key Lab for Crop Germplasm Resources Preservation and Utilization/Agro-Biological Gene Research Center, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou 510640, China;

³ Shenzhen Qianhai Guoken Earth Fund Management Co., Ltd, Guangzhou 510630, China

* Corresponding author, E-mail: sqsong@ibcas.ac.cn

During germination, a quiescent seed is converted to a seedling with high metabolic activity by germination, which is a critical step in the life cycle of seed plants. Seed germination is a complex process co-regulated by genetic and environmental factors, of which phytohormone regulation may be a highly conserved mechanism in seed plants. Auxin is one of the most important signaling molecules in plants, and it controls all aspects of plant growth and development, including morphogenesis and responses to environmental changes. Auxin is biosynthesized, stored and inactivated by many parallel pathways, and it is also perceived and transduced by canonical and non-canonical pathways. The role of auxin is mainly regulated by its biosynthesis and catabolism, as well as by a signaling pathway during seed dormancy and germination. Here, we mainly summarize research progress on metabolism and signaling of auxin and its roles in regulating seed dormancy and germination. Tryptophan (Trp) is a common precursor of indole-3-acetic acid (IAA) in plants, and IAA is biosynthesized from Trp by the indole-3-pyruvate (IPA), indole-3-acetaldoxime (IAOx), indole-3-acetaldoxime (IAM) and tryptamine (TAM) pathways, of which the IPA pathway is a main one. The IAOx pathway may be species-specific in Brassicaceae, and it plays an auxiliary role in IAA biosynthesis in Arabidopsis. However, present evidence is insufficient to propose the IAM and TAM pathways as major routes to IAA biosynthesis in plants. The majority of cellular IAA is inactivated by conjugation to amino acids, peptides, proteins and sugars to produce the transient storage forms, or by irreversible catabolic degradation. Heretofore, oxidative attenuation of IAA through formation of 2-oxindole-3-acetic acid (oxIAA) and subsequent conjugation to glucose was considered the major pathway for IAA inactivation. IAA signaling pathways include canonical and non-canonical auxin signaling pathways. In the canonical auxin signaling pathway, auxin binds to the F-box proteins of the TRANSPORT INHIBITION RESISTANT1/AUXIN SIGNALING F-BOX (TIR1/AFB) and AUXIN/INDOLE-3-ACETIC ACID (Aux/IAA) transcriptional repressor families. Then, the SCF^{TIR1/AFB} E3 ubiquitin ligase complex transfers activated ubiquitin to Aux/IAA. The polyubiquitination of Aux/IAA results in its degradation in 26S proteasome, thereby releasing repression of the AUXIN RESPONSE FACTORS (ARFs) and activating transcription of auxin induced genes. The non-canonical auxin signaling pathway mainly includes pathways mediated by TIR1, ETTIN and receptor-like kinases; however, the events downstream from auxin binding remain unknown. Auxin regulates seed dormancy and germination in a dose-dependent manner. During seed germination, auxin positively regulates ABA and negatively regulates GA biosynthesis and signaling pathways. Finally, we propose some scientific issues that need to be investigated in the future. There are multiple pathways for biosynthesis and catabolism of auxin. Do these pathways exist in the same tissue of the same species at the same time, or do species, tissues and developmental stages have specific pathways? How are these pathways activated, operated and coordinated in response to growth and development and environmental changes to control auxin levels in tissues or cells? Auxin signaling includes canonical and non-canonical pathways. Which pathways respond preferentially in integrating physiological conditions or in responding to environmental signals, and what is the relationship between them? In the plant genome, the core components of signaling pathways are composed of multiple homologous members, and each member has its specific biochemical characteristics. Does the combination of different members of these core components produce similar reaction results? Do low concentrations of auxin promote seed germination via the auxin induced acid growth model? This paper provides a basis for further investigation of the molecular mechanism regulating seed dormancy and germination by auxin.

auxin, dormancy, germination, metabolism, seed, signaling

doi: [10.1360/TB-2020-0509](https://doi.org/10.1360/TB-2020-0509)