开创生物医学新纪元的单克隆抗体技术

夏紫金¹, 王颖钊², 陈俊^{1,3,4,5*}

1. 中山大学中山医学院, 广州 510080;

2. 中山大学附属第一医院胃肠外科中心, 广州 510080;

3. 中山大学热带病防治研究教育部重点实验室, 广州 510080;

4. 广东省恶性肿瘤表观遗传与基因调控重点实验室, 中山大学孙逸仙纪念医院, 广州 510120;

5. 中山大学精准医学中心, 广州 510080

* 联系人, E-mail: chenjun23@mail.sysu.edu.cn

1975年 Köhler 和 Milstein^[1]在 *Nature* 发表论文, 首次从杂交瘤细胞系制备了具有已知抗原特异性的抗体(图1)。其原理是先用绵羊红细胞(sheep red blood cell, SRBC)对小鼠进行免疫, 然后将可产生抗 SRBC 抗体的小鼠脾细胞和能无限增殖的骨髓瘤细胞进行融合, 制备具有这两种亲本细胞特性的杂交瘤细胞。最后通过加入 SRBC 后是否发生溶血反应来鉴定杂交瘤细胞产生针对 SRBC 特异性抗体的能力^[1]。这一技术的出现意味着可以在体外大规模生产与靶抗原特异性结合的单克隆抗体(monoclonal antibody, mAb, 以下简称单抗)。在此之前, 针对特定抗原的特异性抗体高度依赖免疫抗原的纯化, 然而, 抗原往往具有多种不同的抗原表位, 可刺激机体多种 B 淋巴细胞增殖分化, 使浆细胞产生多克隆抗体, 所以很难得到针对某一抗原表位的特异性抗体^[2]。Köhler 和 Milstein 的研究开创了生产特异性抗体的全新技术路径, 并由此获得了 1984 年诺贝尔生理学或医学奖。

1980年后, 鼠源性单抗进入临床研究阶段, 但随后很快就被发现会在人体内引起较强的人抗鼠免疫反应。除此之外, 鼠源性单抗由于不能与人的 Fc 受体结合导致其引起的免疫效应减弱^[3], 严重限制了鼠源性单抗在临床治疗中的应用。随着分子生物学技术的兴起, 利用 DNA 重组技术将鼠源性单抗可变区与人 IgG 抗体恒定区嵌合制备人鼠嵌合抗体^[4], 但是嵌合抗体的可变区仍保留了鼠源性。为了进一步提高嵌合抗体的人源性, Jones 等人^[5]利用基因工程技术将鼠源单抗中互补决定区(complementarity determining regions, CDR)替代人源抗体 CDR 构建人源化抗体, 但这种人源化抗体结合抗原的能力会下降。随着噬菌体抗体库技术、酵母展示技术的发展, 全人源转基因小鼠制备高特异性和高亲和力的人源化单抗获得成功^[6-8]。单克隆抗体技术的人源化程度不断提高解决了鼠源性单抗在临床中所面临的问题, 为单克隆抗体应用于人类疾病治疗提供了更加广阔的空间, 并且抗体偶联药物、双特异性抗体、纳米抗体等新型单克隆抗体的出现使得单抗药物进入崭

陈俊 中山大学中山医学院教授, 博士研究生导师。主要聚焦于肿瘤免疫微环境的调节机制, 肿瘤免疫治疗新靶点和新疗法的研究。在国际上率先鉴定了巨噬细胞的吞噬受体 SLAMF7/Mac-1 复合物和“Eat me”信号, 揭示了天然免疫介导的肿瘤免疫疗法的机制, 提出 SLAMF7 作为肿瘤精准免疫治疗的新型生物标志物, 所预测的适应症已被独立的临床试验验证。

新的发展阶段。目前, 单抗药物主要是人源化抗体和全人源抗体。单克隆抗体的应用涉及生物医学、农业、食品、环境等众多领域, 尤其在生物医学基础研究、临床检验诊断以及恶性肿瘤、自身免疫性疾病、病毒感染等免疫相关性疾病的临床诊疗方面成果显著。

1 单克隆抗体在医学研究和临床检验中的应用

1975 年单克隆抗体技术问世以后, 大量制备单克隆抗体成为可能, 为生物医学提供了大量可用于临床检验和科学研究的单克隆抗体。随着信号释放系统和检测设备不断更新, 以单克隆抗体与特定抗原反应为核心的测定技术的特异性和灵敏性大大增强(图2)。应用单克隆抗体的测定技术在生物医学基础研究和临床医学研究中发挥着不可替代的作用。

1.1 酶免疫测定技术

酶免疫测定技术将酶高效催化反应的专一性和抗原抗体反应的特异性相结合。常用的酶免疫测定技术有酶联免疫吸附试验(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA)

图 1 (网络版彩色)Köhler 和 Milstein^[1]的单克隆抗体技术研究示意图

Figure 1 (Color online) Schematic diagram of the monoclonal antibody technology research by Köhler and Milstein^[1]

图 2 (网络版彩色)单克隆抗体作用示意图(针对 HER-2 分子的单抗与肿瘤细胞上的 HER-2 抗原特异性结合)

Figure 2 (Color online) Schematic diagram of mAb (monoclonal antibody against HER-2 specifically binds to HER-2 antigen on tumor cells)

和酶免疫组织化学(immunohistochemistry, IHC)技术. ELISA 是指利用抗原抗体特异性结合的特点,在固相载体表面预先包被目标蛋白的抗原或抗体,将液体样本中游离的杂蛋白与吸附到固相载体的目标蛋白进行分离,并利用酶标抗体的显色反应进行定性或定量分析的一种检测方法.该技术的发明者 Eva Engvall 和 Peter Perlmann 等人于

1976 年获得了德国“生物化学分析”科学奖^[9]. IHC 是病理技术上的重大突破,酶标记的抗体在组织细胞原位通过抗原抗体反应和组织化学的显色反应,对相应抗原进行定性、定位和定量测定.

1.2 荧光免疫测定技术

荧光免疫测定技术将荧光技术的敏感性和抗原抗体反应的特异性相结合,主要有用荧光显微镜观察结果的荧光免疫技术和以检测荧光信号进行结果分析的流式细胞术.前者用荧光素标记抗体与待测组织细胞中的抗原反应,在荧光显微镜下观察带有特异性荧光的抗原抗体复合物及其存在的部位.流式细胞术的基本原理是单克隆抗体可以特异性识别细胞表面的特定蛋白质,利用荧光染料标记的单抗与细胞结合后逐个流过荧光收集设备并转换成电信号进行分析^[10].不同荧光标记的单抗进行分析可同时获得大量细胞的信息,具有相似特性的细胞被归为同一聚类,从而实现特定细胞类群的鉴定和分选^[11].流式细胞术广泛用于免疫学、血液学和肿瘤学的研究.

1.3 免疫印迹技术

免疫印迹技术是蛋白质分析和测定最常用的免疫分析方法之一.针对目标蛋白质的单克隆抗体与固定到硝酸纤维素膜上的待测蛋白特异性结合,最终通过酶促显色反应显示目标蛋白质的印迹.免疫印迹技术可以实现蛋白质定量定性分析以及蛋白质相互作用的鉴定.免疫印迹的检测灵敏度比 ELISA 更高,临床上对艾滋病病毒感染的检测必须使用免疫印迹进行确认^[12].

单克隆抗体的应用显著提高了免疫测定技术的敏感性和特异性,不仅对免疫学、细胞生物学、微生物学、神经生物学、发育生物学和其他生物医学研究具有重大促进作用,而且由于特异性强、便于质量控制和适用样本广泛,单克隆抗体已经成为临床疾病检验诊断测试中必不可少的试剂.

1.4 感染性疾病检验

利用单克隆抗体检测病原微生物的特异性抗原或者人体针对病原微生物入侵产生的特异性抗体可以鉴别病原微生物的种、型和亚型,用于病毒、细菌和真菌等各类感染性疾病的辅助诊断.临床常见的乙肝病毒感染的检测方法是利用乙肝病毒单抗来检测乙肝表面抗原和乙肝表面 e 抗原.感染性疾病还会造成人体系统非特异性的炎症标志物升高,利用单克隆抗体检测机体抗感染反应产生的 IL-6、C-反应蛋白和降钙素原可以了解全身感染的严重程度.

1.5 免疫性疾病检验

单克隆抗体可以特异性检测免疫细胞表面标志性分子及其产生的细胞因子,从而对免疫性疾病进行检验.应用流式细胞术检测淋巴细胞表面分化抗原分析淋巴细胞

亚群的数量变化,这是诊断和评估原发性免疫缺陷病的重要方法^[13]。虽然细胞形态学和细胞染色化学分析对白血病的诊断是必要的,但是应用流式细胞术对细胞的免疫表型分析对谱系划分以及将急性淋巴细胞白血病与某些类型的急性髓系白血病进行区分具有指导作用^[14]。

1.6 恶性肿瘤检验

相比于传统的超声检查和磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)等影像学诊断,基于单克隆抗体的检验方法在肿瘤诊断中应用范围更加广泛^[15]。根据组织病理学特征,单抗通过识别生物标志物的表达反映组织或细胞类型,用于对组织和肿瘤进行分类,确定原发肿瘤的性质和肿瘤转移的器官或组织起源^[16]。得益于代谢组学、基因组学和蛋白质组学技术的发展,科学家们开发了多种肿瘤诊断和预后相关的标志物,最常见的肿瘤标志物有甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特异性抗原、CA-199、CA-153 和 CA-125 等。研究表明,运用免疫组织化学技术检测预测性肿瘤标志物可以有效提高肺癌的诊断率^[17]。利用单抗检测肿瘤预后标志物可以提供有关癌症患者的预后信息,从而在癌症早期及时进行干预,有效降低肿瘤患者的死亡率。

2 单克隆抗体在临床疾病治疗中的应用

2.1 恶性肿瘤治疗

恶性肿瘤是严重威胁人类健康的常见病和多发病,传统放化疗在杀伤癌细胞的同时也杀伤机体正常细胞,造成严重的副作用。基于单克隆抗体靶向性的肿瘤生物药为肿瘤治疗领域带来了重大突破,涌现出肿瘤靶向药物、免疫检查点抑制剂和 CAR-T 细胞疗法等新的治疗手段(图3)。目前,单抗是临床上已批准的最常用肿瘤生物药^[18]。表1是

按照美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批准时间列出的用于治疗肿瘤的主要单抗。

2.1.1 单克隆抗体靶向药物(targeted drug)

随着肿瘤学和分子生物学的飞速发展,我们对肿瘤发病机制的认识进入到细胞和分子水平。单抗靶向药物与已经明确的致癌位点特异性结合并促使癌细胞死亡,从而发挥抗肿瘤治疗的作用。与常规化疗相比,单抗靶向药物治疗特异性高、副反应少,已在结直肠癌、乳腺癌、非小细胞肺癌和淋巴瘤等恶性肿瘤的治疗中广泛应用^[29]。这些靶向药物主要通过结合肿瘤细胞增殖或肿瘤新生血管生成相关信号通路分子以抑制肿瘤的发展,例如抗表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)单抗 cetuximab 和抗血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)单抗 bevacizumab。此外,肿瘤细胞表面表达一些异于健康细胞的抗原,单抗可以与这些肿瘤特异性抗原结合,并通过抗体依赖细胞介导(antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC)或补体依赖细胞介导(complement-dependent cytotoxicity, CDC)的杀伤机制消灭癌细胞,治疗 B 细胞淋巴瘤的抗人 CD20 单抗 rituximab 即属此类^[30]。

2.1.2 双特异性抗体(bispecific antibody)

在自然状态下并不存在,需要通过重组 DNA 技术或细胞融合技术人工制备的双特性抗体有两个特异性结合位点,能够同时与两种抗原或两个表位特异性结合,发挥两种单抗联合的协同作用。双特异性抗体药物相比于单结合位点的单抗疗效更高。双特异性单抗 blinatumomab 于 2014 年获美国 FDA 批准用于治疗急性 B 淋巴细胞白血病。Blinatumomab 的两个结合位点分别是白血病或淋巴瘤细胞上的 CD19 分子和 T 细胞上的 CD3 分子,通过同时结合这两种分子将癌细胞和 T 细胞交联在一起,使免疫系统更容易攻击癌细胞^[31]。目前双特异性抗体主要用于治疗血液

图3 (网络版彩色)单克隆抗体在肿瘤治疗中的应用,包括单克隆抗体靶向药物、双特异性抗体、抗体偶联药物、免疫检查点抑制剂等
Figure 3 (Color online) MAb is widely used in tumor treatment including targeted drug, bispecific antibody, ADC and ICIs, etc

表 1 FDA 批准用于肿瘤治疗的 mAb(截至 2019 年 11 月 28 日)^{a)}

Table 1 FDA approved mAbs for cancer therapy (until November 28, 2019)

通用名	靶点	抗体类型	适应肿瘤	批准年份	参考文献
Rituximab	CD20	嵌合 IgG1	非霍奇金淋巴瘤	1997	[19]
Trastuzumab	HER2	人源化 IgG1	乳腺癌	1998	[19]
Alemtuzumab	CD52	人源化 IgG1	慢性粒细胞白血病	2001	[19]
Ibritumomab tiuxetan	CD20	鼠 IgG1	非霍奇金淋巴瘤	2002	[19]
Tositumomab-I131	CD20	鼠 IgG2a	非霍奇金淋巴瘤	2003	[19]
Bevacizumab	VEGF	人源化 IgG1	结直肠癌	2004	[19]
Cetuximab	EGFR	嵌合 IgG1	结直肠癌	2004	[19]
Panitumumab	EGFR	全人源 IgG2	结直肠癌	2006	[19]
Ofatumumab	CD20	全人源 IgG1	慢性淋巴细胞白血病	2009	[19]
Ipilimumab	CTLA-4	全人源 IgG1	转移性黑色素瘤	2011	[20]
Ramucirumab	VEGFR2	全人源 IgG1	胃癌	2013	[21]
Nivolumab	PD-1	全人源 IgG4	NSCLC, 黑色素瘤	2014	[22]
Necitumumab	EGFR	全人源 IgG1	NSCLC	2014	[22]
Pembrolizumab	PD-1	人源化 IgG4	黑色素瘤	2014	[23]
Daratumumab	CD38	全人源 IgG1	多发性骨髓瘤	2015	[24]
Dinutuximab	GD2	嵌合 IgG1	神经母细胞瘤	2015	[24]
Atezolizumab	PD-L1	人源化 IgG1	膀胱癌	2016	[25]
Avelumab	PD-L1	全人源 IgG1	Merkel 细胞癌	2017	[26]
Durvalumab	PD-L1	全人源 IgG1	膀胱癌	2017	[26]
Inotuzumab ozogamicin	CD22	人源化 IgG4(ADC)	急性淋巴细胞白血病	2017	[26]
Moxetumomab pasododox	CD22	鼠 IgG1 dsFv 免疫毒素	毛细胞白血病	2018	[27]
Cemiplimab	PD-1	全人源 mAb	皮肤鳞状细胞癌	2018	[27]
Polatuzumab vedotin	CD79b	人源化 IgG1(ADC)	弥漫性大 B 细胞淋巴瘤	2019	[28]

a) CD: 细胞分化抗原; HER2: 人表皮生长因子受体-2; VEGF: 血管内皮生长因子; EGFR: 表皮生长因子受体; CTLA-4: 细胞毒性 T 淋巴细胞抗原-4; GD: 癌细胞表面的一种糖脂; PD-1: 程序性死亡受体-1; PD-L1: 程序性死亡配体-1; NSCLC: 非小细胞肺癌

肿瘤和实体肿瘤。此外,炎症性疾病也一直是双特异性抗体临床开发的重点,同时靶向凝血因子 IX 和凝血因子 X 的双特异性抗体 emicizumab 可以模拟凝血因子 VIII 的生物学活性,被用于治疗 VIII 因子缺乏导致的血友病^[32]。

2.1.3 抗体偶联药物(antibody-drug conjugate, ADC)

一个世纪前,“化疗之父”Paul Ehrlich(1908 年诺贝尔生理学或医学奖得主)提出了著名的“魔法子弹”理论,他认为可以研制只靶向疾病组织而不影响正常组织细胞的药物^[33]。直到 1975 年,单克隆抗体技术的出现以及随后人类表皮生长因子受体 2(human epidermal growth factor receptor-2, HER2)等靶向治疗靶点的发现才使这一设想成为可能。通过化学连接子将细胞毒性药物偶联到靶向癌细胞表面特定定位点的单克隆抗体上,这种类型的药物叫作 ADC。ADC 同时具有单抗的靶向性和偶联药物的细胞毒性,通过胞吞作用进入癌细胞后起到杀死癌细胞的治疗效果^[34]。理论上,ADC 这种治疗方式比普通化疗更精准,比靶向治疗

杀伤力更强。目前,ADC 已被证明是非常有前景的肿瘤治疗手段。治疗霍奇金淋巴瘤和间变性大细胞淋巴瘤的 brentuximab vedotin(靶向 CD30 分子)以及治疗转移性乳腺癌的 ado-trastuzumab emtansine(靶向 HER2 分子)已经被批准用于临床,治疗急性淋巴细胞白血病的 inotuzumab ozogamicin(靶向 CD22 分子)正在 III 期临床试验中^[35]。随着 ADC 的使用经验增多,研究显示 ADC 在杀伤癌细胞的同时,能有效激活 T 细胞介导的抗肿瘤免疫应答,从而为 ADC 和免疫治疗的联合应用提供了理论依据^[36]。

2.1.4 免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitor, ICI)

免疫细胞活化受到免疫检查点等抑制通路的严格调控^[37]。免疫检查点精确控制免疫系统的活化状态,避免免疫系统过度激活造成自身免疫病。然而,癌细胞通过表达免疫检查点配体与免疫细胞表面的检查点受体分子结合,抑制免疫细胞正常的抗肿瘤免疫反应,从而发生肿瘤免疫

逃逸。免疫检查点抑制剂介导的肿瘤免疫疗法是用单抗特异性阻断免疫检查点,进而达到恢复或者增强免疫系统的抗肿瘤活性的目的^[38]。2011年,首个免疫检查点抑制剂抗CTLA-4单抗 ipilimumab 获批用于治疗恶性黑色素瘤患者^[20]。2014年,第一个抗PD-1的单抗 pembrolizumab 获批治疗转移性黑色素瘤患者^[23]。阻断免疫检查点的单抗药物在不同恶性肿瘤的临床试验中获得了显著的治疗益处。令人鼓舞的是,2018年诺贝尔生理学或医学奖被授予PD-1分子和CTLA-4分子的发现者,以表彰他们在肿瘤免疫疗法领域的原创工作^[39]。近年来,多种新的免疫检查点被发现且相应的单抗药物正在研发,例如 SIRP α 、CD-47、LAG-3、TIGIT、VISTA、TIM-3、B7-H3和BTLA^[40-46]等。

2.1.5 嵌合抗原受体T细胞疗法(CAR-T cell therapy)

CAR-T细胞疗法利用基因工程技术将自体T细胞插入嵌合抗原受体进行体外修饰,然后重新输回患者体内发挥抗癌作用。嵌合抗原受体胞外段的单克隆抗体能识别并结合癌细胞表面表达的肿瘤相关抗原,与正常的TCR(T cell receptor)相比,嵌合抗原受体不需要抗原提呈细胞表面的MHC(major histocompatibility complex)提呈抗原就能特异性攻击癌细胞^[47]。目前,FDA批准的CAR-T疗法有用于治疗复发或难治性B细胞急性淋巴细胞白血病的tisagenlecleucel^[48]和治疗难治性大B细胞淋巴瘤的axicabtagene ciloleucel^[49]。在临床试验中,针对血液癌的CAR-T疗法最常用的靶点有CD19、CD22和BCMA,针对实体瘤的CAR-T疗法最常用的靶点有GD2、HER2和CEA。CAR-T疗法在治疗血液学肿瘤中效果显著,但是在实体瘤中活性较低。最近,研究者报道了利用CAR编辑巨噬细胞的CRA-M疗法,可以使巨噬细胞直接吞噬肿瘤,并且增强T细胞抗肿瘤活性,为攻克实体瘤提供了一个新策略^[50]。

2.2 自身免疫性疾病与炎症性疾病治疗

自身免疫病是免疫系统攻击自身正常的组织和器官引起的疾病,曾被称为“不死的癌症”。传统治疗方式大部分是非特异性的对症治疗或长期使用免疫抑制剂以控制疾病的进展,然而长期使用免疫抑制剂容易造成严重的不良反应。近年来,运用单抗靶向免疫调节异常分子对自身免疫病治疗取得了成功。治疗自身免疫病的单抗药物主要包括TNF- α 单抗、白介素单抗和CD20单抗。TNF- α 是由活化的巨噬细胞和淋巴细胞分泌的细胞因子,在免疫激活的早期起重要作用。TNF- α 单抗 infliximab、adalimumab 和 golimumab 已经被批准用于治疗类风湿性关节炎和强直性脊柱炎^[51]。白介素是一大类细胞因子,能激活免疫细胞,在免疫细胞分化中有重要作用。在一项II期临床试验中,研究人员发现,阻断IL-23的risankizumab单抗对克罗恩病的临床缓解明显有效^[52]。B细胞可以激活T细胞产生细胞因子^[53],在许多自身免疫病中,B细胞减少与疾病改善有关。Rituxi-

mab单抗靶向CD20阳性B细胞,不仅用于治疗B细胞淋巴瘤,还被批准用于治疗系统性红斑狼疮和多发性硬化症^[54]。

在炎症性疾病的发生发展中,免疫系统的过度反应发挥至关重要的作用。因此,与自身免疫性疾病类似,运用单抗特异性阻断TNF- α 和白介素的反应也能够有效治疗炎症性疾病。如前所述,TNF- α 在炎症反应中起重要作用,针对TNF- α 的infliximab和adalimumab也被批准用于炎症性肠病和溃疡性结肠炎的治疗^[55,56]。IL-17主要由Th17细胞产生,与TNF- α 和IL-1 β 一起募集中性粒细胞,能有效促进炎症反应。IL-17与多种炎症性疾病相关,包括牛皮癣、银屑病关节炎、强直性脊柱炎和炎症性肠病等。靶向IL-17的单抗(secukinumab、ixekizumab和bimekizumab)通过直接抑制IL-17信号来控制炎症性疾病的发展^[57]。此外,整合素分子是跨膜细胞黏附蛋白,促进细胞-细胞和细胞-细胞外基质的黏附以控制细胞运动性,特别是对肠道的白细胞运输起关键作用。针对整合素分子的单抗(natalizumab、vedolizumab和etrolizumab)能抑制细胞黏附从而干扰淋巴细胞的募集,被用于治疗炎症性肠病^[58]。

2.3 病毒感染治疗

抗病毒单抗疗法主要通过单抗识别并结合病毒表面蛋白质,阻止病毒进入宿主细胞内繁殖扩增。由于无法进入细胞,细胞外的病毒无法存活,从而达到抗病毒效果。此外,单抗与病毒结合后能诱导宿主的抗病毒免疫应答,产生内源性抗体以清除病毒感染^[59]。单抗抗病毒疗法给患者带来了明显的益处,单抗也越来越多地被用于重症病毒性疾病的治疗。针对HIV-1的中和性抗体3BNC117单抗介导的治疗可增强宿主对HIV-1的体液免疫^[60]。在一项随机对照试验中,MAB114单抗能降低埃博拉病毒感染患者的死亡率^[61]。令人印象深刻的是,在抗击新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染的公共卫生事件中,单抗也发挥了重要作用。Lancet发表的临床数据显示,SARS-CoV-2感染患者的免疫系统超敏性激活,导致免疫系统平衡失调,大量IL-2、IL-6、IL-7、IL-10、GM-CSF和TNF- α 等细胞因子释放导致细胞因子风暴,这些细胞因子在重症监护患者的血浆中明显高于非重症监护患者^[62]。中国科学技术大学的研究团队在临床研究中报道阻断IL-6受体的托珠单抗能缓解SARS-CoV-2感染患者的症状^[63],托珠单抗被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》,适应证为“双肺广泛病变者及重型患者,且实验室检测IL-6水平升高者”。

3 结论与展望

1975年报道的单克隆抗体技术是革命性的科技突破。单克隆抗体具有与抗原结合特异性强、理化特性高度均一、生物活性专一和便于工程改造等优势。这些优势使单克隆抗体成为生物医学研究和应用的理想工具,为生物医学领

域带来了革命性的影响。单克隆抗体技术推动了生物医学基础研究的发展,进而为单克隆抗体在各种疾病的检验诊断和临床治疗中的应用奠定了基础,对许多难治性疾病的临床治疗提供了新思路和新方法,在恶性肿瘤和自身免疫性疾病的治疗中取得了巨大成功。今后,单克隆抗体的制备技术将逐渐完善,单克隆抗体的研究将集中在药物新靶点和新型多特异性抗体的开发。首先,单克隆抗体制备技术的改进在于不断优化人源化抗体和全人源抗体的构建技术,降低单抗药物的免疫原性和增强其免疫反应性,从而增强单克隆抗体药物的安全性和有效性。其次,不断开发小分子量、稳定性高和具有特定生物功能的新型单克隆抗体药物,

比如纳米抗体是纳米级别大小的物质,纳米抗体结合了单克隆抗体的特异性和小分子药物的理化特性,在诊断和应用领域有很大潜力,但纳米抗体在稳定性和亲和力方面仍然需要进一步改进。未来,除了恶性肿瘤、自身免疫病和感染性疾病外,会有更多疾病治疗的新靶点和新疗法被发现,针对新靶点的单克隆抗体药物的研究也会越来越多。单克隆抗体会成为一种常规有效的临床治疗手段,引领临床治疗进入精准化、个性化的时代。随着基础研究的深入和临床试验的开展,单克隆抗体药物会向更为广泛的疾病领域渗透,并且通过开发新的单克隆抗体药物联合治疗方案,可以显著提高治疗效果,有望解决多种重大的医学难题。

致谢 感谢国家重点研发计划(2019YFA0110300)、中央高校基本科研业务费专项资金(19YKZD36)和广州市基础与应用基础研究(202002030069)资助。

推荐阅读文献

- 1 Köhler G, Milstein C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. *Nature*, 1975, 256: 495–497
- 2 Saeed A F, Wang R, Ling S, et al. Antibody engineering for pursuing a healthier future. *Front Microbiol*, 2017, 8: 495
- 3 Ober R J, Radu C G, Ghetie V, et al. Differences in promiscuity for antibody-FcRn interactions across species: Implications for therapeutic antibodies. *Int Immunol*, 2001, 13: 1551–1559
- 4 Morrison S L, Johnson M J, Herzenberg L A, et al. Chimeric human antibody molecules: Mouse antigen-binding domains with human constant region domains. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1984, 81: 6851–6855
- 5 Jones P T, Dear P H, Foote J, et al. Replacing the complementarity-determining regions in a human antibody with those from a mouse. *Nature*, 1986, 321: 522–525
- 6 McCafferty J, Griffiths A D, Winter G, et al. Phage antibodies: Filamentous phage displaying antibody variable domains. *Nature*, 1990, 348: 552–554
- 7 Lonberg N. Human antibodies from transgenic animals. *Nat Biotechnol*, 2005, 23: 1117–1125
- 8 Mattheakis L C, Bhatt R R, Dower W J. An *in vitro* polysome display system for identifying ligands from very large peptide libraries. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1994, 91: 9022–9026
- 9 Lequin R M. Enzyme immunoassay (EIA)/enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). *Clin Chem*, 2005, 51: 2415–2418
- 10 Adan A, Alizada G, Kiraz Y, et al. Flow cytometry: Basic principles and applications. *Crit Rev Biotechnol*, 2017, 37: 163–176
- 11 Mousset C M, Hobo W, Woestenenk R, et al. Comprehensive phenotyping of T cells using flow cytometry. *Cytometry A*, 2019, 95: 647–654
- 12 Garcia F, Alvarez M, Bernal C, et al. Laboratory diagnosis of HIV infection, viral tropism and resistance to antiretrovirals. *Enferm Infecc Microbiol Clin*, 2011, 29: 297–307
- 13 Kanegane H, Hoshino A, Okano T, et al. Flow cytometry-based diagnosis of primary immunodeficiency diseases. *Allergol Int*, 2018, 67: 43–54
- 14 Huh Y O, Ibrahim S. Immunophenotypes in adult acute lymphocytic leukemia. Role of flow cytometry in diagnosis and monitoring of disease. *Hematol Oncol Clin North Am*, 2000, 14: 1251–1265
- 15 Olafsen T, Wu A M. Antibody vectors for imaging. *Semin Nucl Med*, 2010, 40: 167–181
- 16 Zhang X, Soori G, Dobleman T J, et al. The application of monoclonal antibodies in cancer diagnosis. *Expert Rev Mol Diagn*, 2014, 14: 97–106
- 17 Schildhaus H U. Immunohistochemistry-based predictive biomarkers for lung cancer. *Pathologe*, 2020, 41: 21–31
- 18 Kimiz-Gebologlu I, Gulce-Iz S, Biray-Avci C. Monoclonal antibodies in cancer immunotherapy. *Mol Biol Rep*, 2018, 45: 2935–2940
- 19 Reichert J M. Antibody-based therapeutics to watch in 2011. *mAbs*, 2011, 3: 76–99
- 20 Cameron F, Whiteside G, Perry C. Ipilimumab: First global approval. *Drugs*, 2011, 71: 1093–1104
- 21 Reichert J M. Antibodies to watch in 2014. *mAbs*, 2014, 6: 5–14
- 22 Reichert J M. Antibodies to watch in 2015. *mAbs*, 2015, 7: 1–8
- 23 Kwok G, Yau T C, Chiu J W, et al. Pembrolizumab (Keytruda). *Hum Vaccin Immunother*, 2016, 12: 2777–2789

- 24 Reichert J M. Antibodies to watch in 2016. *mAbs*, 2016, 8: 197–204
- 25 Reichert J M. Antibodies to watch in 2017. *mAbs*, 2017, 9: 167–181
- 26 Kaplon H, Reichert J M. Antibodies to watch in 2018. *mAbs*, 2018, 10: 183–203
- 27 Kaplon H, Reichert J M. Antibodies to watch in 2019. *mAbs*, 2019, 11: 219–238
- 28 Kaplon H, Muralidharan M, Schneider Z, et al. Antibodies to watch in 2020. *mAbs*, 2020, 12: 1703531
- 29 Sathyanarayanan V, Neelapu S S. Cancer immunotherapy: Strategies for personalization and combinatorial approaches. *Mol Oncol*, 2015, 9: 2043–2053
- 30 Adams G P, Weiner L M. Monoclonal antibody therapy of cancer. *Nat Biotechnol*, 2005, 23: 1147–1157
- 31 Teachey D T, Rheingold S R, Maude S L, et al. Cytokine release syndrome after blinatumomab treatment related to abnormal macrophage activation and ameliorated with cytokine-directed therapy. *Blood*, 2013, 121: 5154–5157
- 32 Labrijn A F, Janmaat M L, Reichert J M, et al. Bispecific antibodies: A mechanistic review of the pipeline. *Nat Rev Drug Discov*, 2019, 18: 585–608
- 33 Strebhardt K, Ullrich A. Paul Ehrlich's magic bullet concept: 100 years of progress. *Nat Rev Cancer*, 2008, 8: 473–480
- 34 Gasser M, Waaga-Gasser A M. Therapeutic antibodies in cancer therapy. *Adv Exp Med Biol*, 2016, 917: 95–120
- 35 Thomas A, Teicher B A, Hassan R. Antibody-drug conjugates for cancer therapy. *Lancet Oncol*, 2016, 17: e254–e262
- 36 Muller P, Kreuzaler M, Khan T, et al. Trastuzumab emtansine (T-DM1) renders HER2⁺ breast cancer highly susceptible to CTLA-4/PD-1 blockade. *Sci Transl Med*, 2015, 7: 188r–315r
- 37 Chen L. Co-inhibitory molecules of the B7-CD28 family in the control of T-cell immunity. *Nat Rev Immunol*, 2004, 4: 336–347
- 38 Pardoll D M. The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy. *Nat Rev Cancer*, 2012, 12: 252–264
- 39 Ballas Z K. The 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine: An exemplar of bench to bedside in immunology. *J Allergy Clin Immunol*, 2018, 142: 1752–1753
- 40 Chen J, Zhong M C, Guo H, et al. SLAMF7 is critical for phagocytosis of haematopoietic tumour cells via Mac-1 integrin. *Nature*, 2017, 544: 493–497
- 41 Andrews L P, Marciscano A E, Drake C G, et al. LAG3 (CD223) as a cancer immunotherapy target. *Immunol Rev*, 2017, 276: 80–96
- 42 Yu X, Harden K, Gonzalez L C, et al. The surface protein TIGIT suppresses T cell activation by promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells. *Nat Immunol*, 2009, 10: 48–57
- 43 Wang L, Rubinstein R, Lines J L, et al. VISTA, a novel mouse Ig superfamily ligand that negatively regulates T cell responses. *J Exp Med*, 2011, 208: 577–592
- 44 Monney L, Sabatos C A, Gaglia J L, et al. Th1-specific cell surface protein Tim-3 regulates macrophage activation and severity of an autoimmune disease. *Nature*, 2002, 415: 536–541
- 45 Chapoval A I, Ni J, Lau J S, et al. B7-H3: A costimulatory molecule for T cell activation and IFN-gamma production. *Nat Immunol*, 2001, 2: 269–274
- 46 Yu X, Zheng Y, Mao R, et al. BTLA/HVEM signaling: Milestones in research and role in chronic hepatitis b virus infection. *Front Immunol*, 2019, 10: 617
- 47 Miliotou A N, Papadopoulou L C. CAR T-cell therapy: A new era in cancer immunotherapy. *Curr Pharm Biotechnol*, 2018, 19: 5–18
- 48 Maude S L, Laetsch T W, Buechner J, et al. Tisagenlecleucel in children and young adults with B-Cell lymphoblastic leukemia. *N Engl J Med*, 2018, 378: 439–448
- 49 Neelapu S S, Locke F L, Bartlett N L, et al. Axicabtagene ciloleucel CAR T-Cell therapy in refractory large B-Cell lymphoma. *N Engl J Med*, 2017, 377: 2531–2544
- 50 Klichinsky M, Ruella M, Shestova O, et al. Human chimeric antigen receptor macrophages for cancer immunotherapy. *Nat Biotechnol*, 2020, doi: 10.1038/s41587-020-0462-y
- 51 Hafeez U, Gan H K, Scott A M. Monoclonal antibodies as immunomodulatory therapy against cancer and autoimmune diseases. *Curr Opin Pharmacol*, 2018, 41: 114–121
- 52 Feagan B G, Sandborn W J, D'Haens G, et al. Induction therapy with the selective interleukin-23 inhibitor risankizumab in patients with moderate-to-severe Crohn's disease: A randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 study. *Lancet*, 2017, 389: 1699–1709
- 53 Engel P, Gomez-Puerta J A, Ramos-Casals M, et al. Therapeutic targeting of B cells for rheumatic autoimmune diseases. *Pharmacol Rev*, 2011, 63: 127–156
- 54 Pateinakis P, Pyrpassopoulou A. CD20⁺ B cell depletion in systemic autoimmune diseases: Common mechanism of inhibition or disease-specific effect on humoral immunity? *Biomed Res Int*, 2014, 2014: 973609
- 55 Sands B E, Anderson F H, Bernstein C N, et al. Infliximab maintenance therapy for fistulizing Crohn's disease. *N Engl J Med*, 2004, 350: 876–885

- 56 Sandborn W J, van Assche G, Reinisch W, et al. Adalimumab induces and maintains clinical remission in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis. *Gastroenterology*, 2012, 142: 257–265
- 57 Kim B S, Park Y J, Chung Y. Targeting IL-17 in autoimmunity and inflammation. *Arch Pharm Res*, 2016, 39: 1537–1547
- 58 Lamb C A, O’Byrne S, Keir M E, et al. Gut-selective integrin-targeted therapies for inflammatory bowel disease. *J Crohns Colitis*, 2018, 12(Suppl_2): S653–S668
- 59 Michaud H A, Gomard T, Gros L, et al. A crucial role for infected-cell/antibody immune complexes in the enhancement of endogenous antiviral immunity by short passive immunotherapy. *PLoS Pathog*, 2010, 6: e1000948
- 60 Schoofs T, Klein F, Braunschweig M, et al. HIV-1 therapy with monoclonal antibody 3BNC117 elicits host immune responses against HIV-1. *Science*, 2016, 352: 997–1001
- 61 Mulangu S, Dodd L E, Davey R J, et al. A randomized, controlled trial of ebola virus disease therapeutics. *N Engl J Med*, 2019, 381: 2293–2303
- 62 Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*, 2020, 395: 497–506
- 63 Zhou Y, Fu B, Zheng X, et al. Aberrant pathogenic GM-CSF⁺ T cells and inflammatory CD14⁺CD16⁺ monocytes in severe pulmonary syndrome patients of a new coronavirus. *bioRxiv*, 2020, doi: 10.1101/2020.02.12.945576

Summary for “开创生物医学新纪元的单克隆抗体技术”

Monoclonal antibody technology pioneered a new era of biomedicine

Zijin Xia¹, Yingzhao Wang² & Jun Chen^{1,3,4,5*}

¹ Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China;

² Department of Gastrointestinal Surgery, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China;

³ Key Laboratory of Tropical Disease Control of the Ministry of Education, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China;

⁴ Guangdong Provincial Key Laboratory of Malignant Tumor Epigenetics and Gene Regulation, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510120, China;

⁵ Center for Precision Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China

* Corresponding author, E-mail: chenjun23@mail.sysu.edu.cn

The advent of monoclonal antibody (mAb) technology has revolutionized many fields of biological and medical researches over the last three decades. The first publication by Köhler and Milstein that produced mAbs with predetermined specificity from hybridoma cells was honored as one of the top 10 extraordinary papers marking *Nature's* 150th anniversary in 2019. Prior to their work, researches relied on polyclonal antibodies (pAbs) that are naturally produced by a mixture of B lymphocytes targeting different epitopes on the antigen. The “mixed” nature of pAbs limits its further applications for diagnosis or clinical therapies due to inconsistency and instability of pAb's quality, specificity and purity between experimental batches. It was until 1975 that Köhler and Milstein first discovered an efficient platform to produce specific monoclonal antibodies from hybridoma cells which are prepared by fusion of specific antibody-producing mouse splenocytes and immortal myeloma cells. The emergence of this technology allows for the generation of specific and homogenous antibodies targeting known antigen under controllable *in vitro* conditions and making mAbs in large scale. This pioneering work won Köhler and Milstein the Lasker Award and Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1984.

The discovery of mAb has changed the face of biomedicine and has provided promising future for clinical researches. The technology to produce mAb itself is evolving. Researchers have developed multiple ways to improve antibody efficacy. For example, replacement of mouse mAbs by humanized mAbs solved the problem of immunogenicity and other side effects. Currently, antibody-drug conjugate, bispecific antibodies, nanobodies and other new monoclonal antibodies have made mAbs into a new stage with broader usages. Monoclonal antibodies have unique characteristics including highly homogeneous physical and chemical properties, specificity for binding to antigens, and manageable processing and quality control. Because of these superiorities, monoclonal antibodies are critical tools for scientific research and are extensively used in various fields of biomedicine, especially in biomedical basic research, clinical diagnosis and treatment of immune-related diseases such as malignant tumors, autoimmune diseases, and viral infections.

With rapid advances in genetics, cell biology and bioengineering, the application of monoclonal antibody has remarkably expanded from basic science to clinical diagnosis and human therapeutics. Accumulating studies have demonstrated the great value and promise for clinical practices with monoclonal antibodies. It provided novel ideas and methods for the clinical treatment of many refractory diseases, and directly promoted the successful treatment of malignant tumors and autoimmune diseases. In recent years, the immunotherapy using monoclonal antibodies specifically target tumor cells has become one of the most promising cures for cancers.

In summary, the mAb technology has promoted the development of basic research in biomedicine, which has laid the foundation for its application in the diagnosis and clinical treatment of various diseases, and provided new insights for the clinical treatment of many refractory diseases. In this review, we will briefly summarize the history of monoclonal antibody development and highlight the broad applications of monoclonal antibody for biomedical researches, clinical diagnosis, and pharmacological uses against malignant tumors, autoimmune diseases, and viral infections.

monoclonal antibody technology, monoclonal antibody, biomedical research, diagnostic test, clinical therapy

doi: 10.1360/TB-2020-0511