科学理性解读COVID-19疫苗Ⅲ期临床保护效力数据

金鹏飞¹, 张力², 李靖欣^{1,2*}, 朱凤才^{1,2*}

1 江苏省疾病预防控制中心, 国家卫生与健康委员会肠道病原微生物重点实验室, 南京 210009;

2 南京医科大学公共卫生学院全球健康中心, 南京 211166

* 联系人, E-mail: jingxin42102209@126.com; jszfc@vip.sina.com

疫苗是防控传染病最主要的手段之一。自COVID-19全球大流行以来, COVID-19疫苗的研发一直备受关注。目前, 已有64个COVID-19疫苗进入临床试验阶段, 其中22个疫苗临床试验已进入Ⅲ期阶段^[1]。最近, 对于3个不同技术平台研发的COVID-19疫苗, Ⅲ期临床试验中期分析显示, 疫苗可有效预防SARS-CoV-2感染所致疾病。Moderna和Pfizer/BioNTech的mRNA疫苗预防COVID-19的保护率高达94.1%^[2]和95.0%^[3], AstraZeneca/University of Oxford的黑猩猩腺病毒载体疫苗ChAdOx1和Gamaleya Research Institute的rAd26/rAd5腺病毒载体疫苗的保护率分别为70.4%^[4]和91.4%(<https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/the-first-interim-data-analysis-of-the-sputnik-v-vaccine-against-covid-19-phase-iii-clinical-trials-/>), 我国国药中生集团COVID-19灭活疫苗BBIBP-CorV保护率为79.3%(https://www.cnbj.com.cn/content/details_12_5965.html, 详细的数据尚未公布)。

基于上述临床试验的中期结果, 相应的COVID-19疫苗已在部分国家和地区获得了监管部门的应急使用授权或有条件批准上市。这些有效疫苗的大规模接种预期将对全球COVID-19疫情控制产生重要而积极的影响。然而, 在这看似“柳暗花明”之际, *Br Med J*杂志副主编Peter Doshi对Pfizer/BioNTech的COVID-19疫苗保护效力提出质疑, 指出疫苗的实际保护率可能低至29%(<https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/>)。一石激起千层浪, 该评论在中国引起了巨大的舆论反响, 各种猜测和争论纷纷涌现, 使得公众对COVID-19疫苗的保护效力数据更是“雾里看花”。究其原因, 是在疫苗的Ⅲ期效力临床试验中, 临床终点指标(可疑病例、确诊病例或感染)、病例监测体系以及确诊病例的定义不同, 均可对疫苗保护效力数据产生重要影响。此外, 采用错误的统计分析口径和偏倚的视野解读这些数据, 将会对疫苗保护效力的结果带来巨大的误解。

对此, 我们从临床终点指标的选择、病例监测的运行和病例诊断体系等方面, 阐述其对疫苗保护效力的影响。同时, 分析比较已公布的COVID-19疫苗临床试验方案和临床试验中期结果, 讨论可能存在的问题, 从而科学理性地解读疫苗

李靖欣 博士, 主任医师, 江苏省疾病预防控制中心疫苗临床评价所副所长, 中华预防医学会疫苗临床专业委员会常委, 中华预防医学会流行病学分会青年委员。主要从事新型疫苗临床评价和现场流行病学调查研究。

朱凤才 江苏省疾病预防控制中心副主任, 临床疫苗学专家, WHO新型冠状病毒疫苗优先次序评审专家, 中华预防医学会疫苗临床研究专业委员会主任委员。主要从事新型疫苗临床评价研究。

的保护效力, 以期为后续和正在进行的COVID-19疫苗Ⅲ期临床试验提供一定的指导性建议。

1 病例监测体系和病例确诊的灵敏度及特异度影响疫苗保护效力

疫苗保护效力通常采用保护率指标进行计算, 即 $VE(\%) = (1 - (ARV/ARC)) \times 100$ (VE为疫苗保护效力, ARV和ARC分别为疫苗组和对照组的终点指标发生率)^[5]。终点指标发生率通常采用发病率(罹患率)或发病密度。在研究随访时间较长、研究对象观察时长差异较大的情况下, 采用以人时为分母的发病密度更为合适。当疫苗可以提供有效的保护时, 疫苗组的终点指标发生率低于对照组, 疫苗的保护效力为正值(VE在0~100%之间), VE值越高则表示保护效力越好。但如果疫苗没有保护作用, 反而可促进终点指标的发生(例如, 灭活疫苗的疫苗株未被完全灭活、减毒活疫苗的疫苗株毒力返祖

或突变、疫苗可诱发疫苗增强性疾病等情况), 则疫苗组终点指标发生率高于对照组, 疫苗的保护效力为负值($VE < 0\%$)。因此, 所有可影响ARV/ARC比值的因素均会对疫苗保护效力估算产生影响。

1.1 多层级的临床终点指标可全面反映疫苗保护效力

根据疾病的严重程度, COVID-19疾病谱可分为死亡病例、重症住院病例、普通住院病例、就诊的轻症或不典型病例以及未就诊的轻症或不典型病例(包括无症状感染者)(图1)。疫苗诱导免疫保护作用是一个复杂的过程, 可在抗病原体感染和(或)阻止疾病进展等多个方面发挥作用, 选择合适的临床终点指标是评价疫苗保护效力需要首先考虑的问题。此外, 针对不同临床终点指标的疫苗保护效力具有不同的临床和公共卫生意义。疫苗降低死亡/重症/住院病例的发生率, 可以有效降低病死率、最大程度减轻医疗资源的负荷和疾病负担。对需就诊的轻症病例, 有效的疫苗可以减轻门诊就诊压力和有限医疗资源的占用等。相比于预防疾病发生的临床意义, 疫苗预防感染和减轻疾病症状更具有重要的公共卫生意义, 可有效降低病原体的传播。因此, 在疫苗临床试验中常采用多层级临床终点指标, 以全面反映疫苗的保护效力。

疫苗针对不同严重程度临床终点指标的保护效力, 通常呈现出临床终点越严重, 保护效力越高的一般规律。例如, 在EV71灭活疫苗的一项Ⅲ期临床试验中^[7], 疫苗预防EV71感染所致疾病的保护效力为88.0%, 而预防重症病例和住院病

例的保护效力为100%; 五价轮状病毒疫苗的一项Ⅲ期临床试验结果也显示^[8], 对于临床症状越重的轮状病毒感染所致腹泻, 疫苗的保护效力越高。

1.2 病例监测的灵敏度低可导致疫苗保护效力被高估

在疫苗临床试验中, 尽最大可能监测到可疑病例而不漏掉可能的病例, 是Ⅲ期临床试验病例监测的关键点之一, 也就是病例监测的灵敏度。疫苗接种有可能会减轻疾病的症状或严重程度, 加上轻症或不典型病例和无症状感染者由于其临床表现特异性不强或无临床症状而不容易被发现, 可能造成疫苗组轻型病例的监测灵敏度低于安慰剂组, 导致疫苗保护效力被高估(表1)。

但灵敏度不高的监测体系, 不一定会对疫苗的保护效力评估带来显著影响。一般在随机、双盲临床试验中, 试验组和对照组间因监测灵敏度低而漏掉的可疑病例比例可能无差异, 则疫苗的保护效力不会发生明显的低估或者高估。尽管如此, 灵敏度低的监测体系意味着可能漏掉真正的病例, 需要延长疾病监测期或扩大监测系统的范围(增加受试者人数), 才能达到预期的终点指标病例数。

1.3 病例诊断的特异度对疫苗保护效力的影响更大

灵敏度是指将真正的病例判定为病例的能力, 而特异度指将真正的非病例判定为非病例的能力^[9]。由于诊断试验的灵敏度可能无法达到100%, 则可能有部分终点指标(病例或

WHO新型冠状病毒病例的分级标准

状态	描述	得分
死亡	死亡	10
重症住院	机械通气 $pO_2/FiO_2 < 150$ 且使用血管升压药, 透析或ECMO	9
	机械通气 $pO_2/FiO_2 < 150$ ($SpO_2/FiO_2 < 200$) 或使用血管升压药	8
	插管机械通气, $pO_2/FiO_2 \geq 150$ 或 $SpO_2/FiO_2 \geq 200$	7
	通过NIV或高流量吸氧治疗	6
普通住院	通过面罩或鼻尖吸氧治疗	5
	不需要吸氧治疗	4
轻症	轻度症状, 需就诊	3
	轻度症状, 不就诊	2
	无症状	1
无感染	SARS-CoV-2核酸阴性	0

ECMO, 体外膜肺氧合; FiO_2 , 吸入气中的氧浓度分数; NIV, 无创通气; pO_2 , 氧分压; SpO_2 , 血氧饱和度

WHO clinical progression scale for COVID-19^[6]

图1 疾病谱金字塔与保护率之间的关系

Figure 1 The relationship between pyramid of disease spectrum and protection level

表1 临床终点指标诊断试验灵敏度和特异度对疫苗保护效力的影响

Table 1 Effect of sensitivity and specificity of clinical endpoint diagnostic test on vaccine efficacy

可能的影响因素	对疫苗效力评估可能的影响 ^{a)}		
	ARC	ARV	VE
灵敏度低, 灵敏度在试验组和对照组中相等; 特异度为 100%;	↓	↓	—
灵敏度低, 灵敏度在对照组中高于疫苗组; 特异度为 100%;	↓	↓↓	↑
特异度低(部分非终点指标被错判为终点指标); 特异度在试验组和对照组中相等; 灵敏度为 100%;	↑	↑↑	↓
特异度低(部分非终点指标被错判为终点指标); 特异度在试验组低于对照组; 灵敏度为 100%;	↑	↑↑↑	↓↓
特异度低(部分非终点指标被错判为终点指标); 灵敏度低;	↑	↑↑↑	↓↓

a) ARC, 对照组的终点事件发生率; ARV, 疫苗组的终点事件发生率; VE, 疫苗的效力。“↓”个数表示下降程度; “↑”个数表示上升程度; “—”表示不受影响

感染)会被误判为非终点指标(非病例或非感染), 这种情况称为假阴性。此外, 诊断试验的精确度也可能不是100%, 则可能将非终点指标误判为终点指标, 这种情况被称为假阳性。

如表1所示, 如果临床试验中终点指标判定的灵敏度偏低, 但试验组和对照组间终点指标判定的灵敏度均衡(即试验组和对照组间终点指标被误判的比例一致), 则一般不会使疫苗保护效力的评估出现偏倚, 但可能需要延长随访时间或甚至增加样本量以获得足够的病例数。在选择以发病作为临床终点时, 如果诊断试验的灵敏度与疾病的严重程度相关, 即更容易对中度或重度病例进行确诊而造成轻度病例的漏诊。当疫苗组病例比对照组病例的严重程度更轻, 将会导致疫苗保护效力的高估。

同时, 诊断试验的特异度也是需要被考虑的一个重要因素。如果诊断试验的特异性低, 会导致一些未发生真正临床终点的研究对象被误判为病例。这种误判会增加疫苗组和对对照组临床终点指标发生率, 但疫苗组临床终点指标发生率升高的比例要高于对照组, 特别是在感染率低的情况, 对组间临床终点指标发生率比值的影响较大^[9], 常会造成疫苗效力被低估。

此外, 疫苗保护效力还会受到其他潜在因素的影响。例如, 疫苗保护效力可能随着观察期的延长而降低。疾病的流行强度越大, 可能在短时间的监测期内即可捕获到满足统计学效能的临床终点数量。因此, 通常需要保证一定时间长度的疾病监测期, 以评估疫苗保护效力降低的趋势。在疾病的高流行地区, 特别是当一部分受试者在接种疫苗前曾暴露于目标病原体并获得了一定的基线抗体水平, 则可能会对疫苗保护效力产生影响。疫苗接种率也可能是影响疫苗保护效力的因素, 人群中疫苗接种率高可能会产生间接的保护效应, 降低病原体的传播, 使得安慰剂组人群也间接获得疫苗的保护, 从而使得疫苗保护效力被低估。

2 高质量的临床试验设计是准确评估 COVID-19疫苗保护效力的基石

根据上述影响疫苗效力的潜在因素, 我们对Moderna、

Pfizer/BioNTech、AstraZeneca/University of Oxford和Johnson & Johnson公布的COVID-19疫苗Ⅲ期试验方案进行了分析比较(表S1)。

2.1 主动监测可以提高病例监测的灵敏度

SARS-CoV-2感染除了能够引起呼吸道症状以外, 还可能引起其他系统的疾病^[10]。从可疑病例定义的角度看, 4个Ⅲ期临床试验中可疑病例定义均较为宽泛, 以便能够尽可能地发现可疑病例。

病例监测的方式同样可以影响监测的灵敏度, 病例监测方式一般分为主动监测和被动监测两种。主动监测是指研究人员定期通过电话、走访等形式主动发现可疑病例, 而被动监测是指受试者出现可疑症状后自发向研究人员报告, 一般主动监测的灵敏度要优于被动监测。为了尽最大可能捕获到可疑病例, 常常采用主动和被动监测相结合的方式。从4个Ⅲ期临床试验方案来看, 除Pfizer/BioNTech的病例监测主要依赖受试者自发报告, 而没有明确的主动监测外, 其他3个临床试验均采取了主动和被动监测相结合的方式, 这在一定程度上使得可疑病例能够被及时发现。

2.2 样本采集和诊断试验影响确诊病例的特异度

对可疑病例, 应在获得报告后的第一时间进行随访并采集生物样本。目前, 定量RT-PCR是SARS-CoV-2感染诊断的金标准, 但该方法也存在局限性, 其灵敏度会受病毒载量、样本类型和采样时间的影响^[11]。在COVID-19疫苗临床中, 应当多次采集不同部位的生物样本, 包括鼻拭子、咽拭子、肛拭子和唾液等, 以提高SARS-CoV-2检出率。Johnson & Johnson临床试验方案规定在症状出现后1~2 d内完成首份样本采集, 并在3~5 d内进行第2次样本采集, 这样可以避免因1次样本采集带来假阴性结果。过去许多评估疫苗效力的研究均表明, 诊断试验的特异度比灵敏度更为重要^[12]。因此, 为了提高诊断试验的特异度, 可以采用同一份样本多靶标阳性或两个不同时间点或不同部位标本单靶标阳性作为诊断依据。若采用一次单靶标阳性作为实验室确诊标准则可能会降低诊断的

特异度,产生把非病例误判为病例的错误。

采用广泛的可疑病例监测体系和高特异度的实验室方法来捕获病例,其目的就是要尽可能地发现可疑病例并进行最终无误的确诊。目前,4个已公布的Ⅲ期临床试验方案均采用了可疑临床症状+至少一次实验室检测阳性结果的组合来确诊病例。

2.3 中长期疫苗保护效力数据更重要

疫苗效力临床试验的监测期不建议过短,一般至少持续1年,因为随着监测期的延长,疫苗的保护效力可能会呈下降趋势。监测早期观察到的疫苗保护效力可能不能代表疫苗最终的保护效力。此外,COVID-19病例中重症病例的比例较低,使得在较短监测期内无法收集到足够例数的重症病例来有效评价疫苗预防重症病例的保护效力。目前,已经公布的COVID-19疫苗中期保护效力数据的监测期仅约2~3个月。一般情况下,疫苗针对老年人群和有基础疾病人群的保护效力低于青年人和健康人群,但目前COVID-19疫苗临床试验中期分析结果显示,年龄和基础疾病尚不影响疫苗的保护效力,仍需在后面的监测期中进行观察^[2-4]。

综上所述,在COVID-19疫苗Ⅲ期效力试验中,我们应在监测病例的体系上,采用尽可能宽泛的病例定义,将主动监测与被动监测相结合,防止遗漏潜在的真实病例,并且采用多部位的采样,多时间点采样,提高发现病例的灵敏度。而在检测样本和确定病例的体系上,应采用特异度高的检测方法,例如多靶标的PCR检测,并且采用串联检测的方式来提高确定病例的特异度。从而提升整个效力试验的灵敏度和特异度,使效力结果更为可靠。

3 mRNA和腺病毒载体COVID-19疫苗保护效力数据质量各有千秋

3.1 重症病例所占比例可以反映病例监测的灵敏度

重症病例所占比例越低,说明监测的灵敏度可能越高。从表2中可以看出,Gamaleya Research Institute的COVID-19疫苗临床试验中的重症病例数占所有病例数的比例是最高的(20/78=25.6%),其次是Moderna疫苗(30/196=15.3%),提示该项目的病例监测体系的灵敏度不高。

试验组和对照组中重症/住院病例发病率的比较,一方面反映疫苗对重症/住院病例的保护效力,同时也反映是否存在疫苗相关性增强疾病的情况,这也是疫苗临床安全性的重要评价内容。值得注意的是,在Pfizer/BioNTech的临床试验中疫苗组中出现了1例重症病例(总共5名重症病例,其中有4名在对照组,1名在疫苗组,保护率约80.0%^[3])。而其余3种疫苗Ⅲ期临床试验中的重症均只发生在对照组。Pfizer/BioNTech疫苗针对重症的保护率低于疫苗总的保护率95.0%(95%可信区间90.3~97.6),与金字塔规律并不相符。可能存在以下

几个原因:(i)由于短期内观察到的重症病例数过少,还不足全面反映疫苗预防病例的保护效力;(ii)因为其他病原体合并感染而造成的重症病例,需要进一步鉴别诊断;(iii)该疫苗预防COVID-19的总体保护效力在一定程度上被高估。

因此,对于Pfizer/BioNTech疫苗的保护效力数据的持续收集将会对该疫苗的效力评估提供更多的证据。相比之下,虽然Moderna的mRNA疫苗保护效力数据与Pfizer/BioNTech的mRNA疫苗相当(94.1% vs. 95.0%),但其针对重症病例的100%保护率却更好地符合了保护效力的金字塔规律。

3.2 针对可疑病例的保护效力严重低估疫苗的保护效力

最近,Peter Doshi在对Pfizer/BioNTech疫苗保护效力的评论和观点中提到,3410例受试者出现COVID-19疑似症状但SARS-CoV-2核酸阴性(疫苗组和安慰剂组分别为1594和1816例),是COVID-19确诊病例数的近20倍,从而对Pfizer/BioNTech疫苗95.0%的保护效力提出质疑。实际上,确诊病例占可疑病例的比例恰恰反映了病例监测的灵敏度,比例越低,灵敏度越高。然而,Peter Doshi将所有COVID-19可疑病例均纳入计算得出29%的保护效力是不妥的。在效力试验中,确诊病例需要有高度的特异性,才能准确估计疫苗效力,将可疑病例当作确诊病例会大大降低病例的特异度,从而严重低估疫苗的真实保护效力。在Pfizer/BioNTech的Ⅲ期试验中,没有明确的主动监测措施,也没有多时间点采集生物样本,虽然有可能导致疫苗保护效力的小幅度高估,但是绝不会只有29%的保护率。

4 结语

4.1 优化病例监测和检测体系的流程,评价疫苗中长期保护效力

COVID-19所致的临床症状和体征多样且特异性不强,其他呼吸道病毒感染也可以导致类似的临床症状和体征,如其他冠状病毒和流感病毒等。评价针对该类病原体疫苗的保护效力将会面对很大的挑战。当前进行中的COVID-19疫苗临床大多采用WHO或FDA的病例定义,有些还增加了试验地区当地的COVID-19病例定义,从病例定义角度来看已满足临床试验的需要。但不同临床试验的病例监测体系、病原标本采集方式(研究人员采集、受试者自己采集)和采集的次数以及试验诊断方法均存在一定的差异,这将影响同类疫苗和不同类疫苗间保护效力的可比性。因此,临床试验方案的共享开放和试验数据的公开可有助于更好地、更科学地评价COVID-19疫苗的保护效力。

在已发布结果的Pfizer/BioNTech、Moderna的Ⅲ期临床试验中,关于年龄(分老年和青年)、免前SARS-CoV-2感染状况、免前基础疾病和肥胖对疫苗保护效力均无显著的影响。

表2 4款COVID-19疫苗Ⅲ期临床试验中期结果

Table 2 Interim analysis results of phase III clinical trials of four COVID-19 vaccines

申办方	Pfizer/BioNTech	Moderna	AstraZeneca/University of Oxford	Gamaleya Research Institute
疫苗名称	BNT162b2(mRNA 疫苗)	mRNA-1273(mRNA 疫苗)	AZD1222(非复制型 ChAdOx1 载体疫苗)	非复制型 rAd26/rAd5 载体疫苗
目标剂量及免疫程序	30 μg, 0~21 d	100 μg, 0~28 d	2.55×10 ¹⁰ /5×10 ¹⁰ 病毒颗粒, 0~28 d	1×10 ¹¹ 病毒颗粒, 0~21 d
接种人数 ^{a)} (疫苗组/对照组)	36523 例(18198/18325)	28207 例(14134/14073)	11636 例 (5807/5829)	22714 例
主要临床终点观察开始时间	两针次免后7 d	两针次免后14 d	两针次免后14 d	两针次免后7 d
主要临床终点监测时间	约1.5月	约2.6月	约3.4月	—
COVID-19 病例数 ^{a)}	170 例(疫苗组 8 例)	196 例(疫苗组 11 例)	131 例(疫苗组 30 例)	78 例(疫苗组 16 例)
预防 COVID-19 的保护效力 ^{a)} (%)	95.0(90.3,97.6)	94.1(89.3,96.8)	总体: 70.4(54.8,80.6) 半剂量-标准剂量程序: 90.0 (67.4,97.0) 标准剂量-标准剂量程序: 62.1 (41.0,75.7)	91.4
老年人群比例	>55 岁受试者疫苗组: 7971 例 (42.3%), 对照组: 7950 例(42.2%)	>65 岁受试者疫苗组 3763 例 (24.8%), 对照组 3749 例 (24.7%)	>55 岁受试者疫苗组 718 例 (12.4%), 对照组 700 例(12.0%)	—
基线抗体阳性的比例	疫苗组: 1148 例(6.2%), 对照组: 1197 例(6.4%)	疫苗组 343 例 (2.3%), 对照组 337 例 (2.2%)	疫苗组 185 例 (3.2%), 对照组 188 例 (3.2%)	—
基础性疾病的患病率	总体: 疫苗组 3934 例 (20.9%) 对照组 3809 例 (20.2%). 主要包括 慢性肺疾病: 疫苗组 1478 例 (7.8%), 对照组 1453 例 (7.7%); 糖尿病: 疫苗组 1572 例(8.3%), 对照组 1591 例(8.4%)	严重肥胖: 疫苗组 1025 例 (6.8%), 对照组 1021 例(6.7%); 心血管疾病: 疫苗组 752 例 (5.0%), 对照组 744 例(4.9%); 糖尿病: 疫苗组 1435 例(9.5%), 对照组 1440 例(9.5%)	心血管疾病: 疫苗组 639 例 (11.0%), 对照组 602(10.3%); 呼吸系统疾病: 疫苗组 658 例 (11.3%), 对照组 702 例(12.0%); 糖尿病: 疫苗组 135 例(2.3%), 对照组 135 例(2.3%)	—
COVID-19 重症病例数 ^{a)}	5 例 (疫苗组 1 例)	30 例 (疫苗组 0 例)	1 例 (疫苗组 0 例)	20 例 (疫苗组 0 例)
重症病例占比	5/170=2.9%	30/196=15.3%	1/131=0.8%	20/78=25.6%
I/II 期临床试验中目标剂量和免疫程序的中和抗体滴度 ^{b)}	1:163 (18~55 周岁) ^{c)} 1:206 (65~85 周岁) ^{c)}	1:654 (18~55 周岁) ^{d)} 1:878 (56~70 周岁 s) ^{d)} 1:317 (≥71 周岁) ^{d)}	半剂量-标准剂量/标准-标准剂量 1:161/1:193 (18~55 周岁) ^{e)} 1:143/1:144 (56~69 周岁 s) ^{e)} 1:150/1:161 (≥70 周岁) ^{e)}	1:46~1:49 (18~60 周岁) ^{f)}

a) 为纳入符合方案集分析中的接种人数、COVID-19 确诊病例数和重症病例数; b) Pfizer/BioNTech COVID-19 疫苗 I/II 期临床试验的免疫原性采血点为首针免后第 35 天, 其他 3 个疫苗的 I/II 期临床试验采血点为首针免后第 42 天; c) 采用 50% 荧光病毒灶减少的荧光中和试验; d) 采用 80% 蚀斑减少中和试验; e) 采用 80% 抑制浓度的微量中和试验; f) 采用 50% 组织细胞感染的微量中和试验(100TCID₅₀)

以上因素均未对疫苗的保护效力产生显著影响, 仍需在后续的监测期内继续进行观察, 特别是随着疫苗抗体水平的衰减, 是否伴随着疫苗保护效力的降低。SARS-CoV-2 自然感染后是否会保护机体免疫二次感染, 以及免前 SARS-CoV-2 感染状态是否影响疫苗的保护效力还尚不清楚^[13]。当前 COVID-19 疫苗Ⅲ期临床试验均将入组时已经暴露于 SARS-CoV-2(+) 纳入了排除标准。虽然仍有约 1%~2% 免前 SARS-CoV-2(+) 的研究对象接种疫苗, 但由于样本量过少无法分析免前 SARS-CoV-2 感染状态对疫苗保护效力的影响。在后续临床试验中, 应对该问题进行研究分析。

为应对本次 COVID-19 全球大流行, 世界各国的 COVID-19 疫苗项目都在以“Warp Speed”的速度推进。为尽早可以接种 COVID-19 疫苗, 疫苗前期的保护效力固然重要, 但我们依旧要通过长期观察来评价疫苗的整体效力和中长期保护效力。同时, 还需考虑疫苗的安全性, 特别是疫苗相关的增强呼吸道疾病和特殊关注的不良事件。

4.2 N 蛋白抗体检测有助于佐证疫苗保护效力, 评价疫苗预防感染的效力

对于当前正在进行临床试验的 COVID-19 疫苗, 绝大部

分均为肌肉接种途径,一般只能诱导产生体液免疫和细胞免疫而不会产生黏膜免疫,特异性IgG抗体很难到达和存在于黏膜表面,因此,难以达到预防病毒感染的保护效果。对于疫苗是否能产生预防感染的作用,可通过检测可疑病例血清抗SARS-CoV-2 N蛋白的抗体水平来判断。mRNA、DNA、载体疫苗以及重组蛋白疫苗均依据S蛋白和S蛋白RBD设计,理论上该类疫苗不会产生针对SARS-CoV-2 N蛋白的抗体。所以,如果血清可检测到抗N蛋白的抗体,则表明有SARS-CoV-2感染史,可依据该指标来判断可疑病例是否感染SARS-CoV-2。

此外,大多数COVID-19疫苗Ⅲ期临床试验会设计免疫原性亚组,采集免疫原性亚组受试者的系列血清,以评价疫苗的免疫原性和免疫持久性。免疫原性亚组在评价免疫原性的同时,可用于评价疫苗预防感染的保护效力。针对免疫原性亚组中有免前、免后系列血清样本的所有受试者,可检测血清中抗SARS-CoV-2 N蛋白的抗体水平,以推算试验组和对照组SARS-CoV-2感染的比例(根据抗体由阴转阳或四倍增长来判断),从而估算COVID-19疫苗预防感染的保护效力,进一步对目前疫苗预防疾病的保护效力进行解释和佐证。

致谢 感谢江苏省重点研发计划(BE2020601)资助。

推荐阅读文献

- 1 World Health Organization. Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines, 2020. <http://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>
- 2 Baden L R, El Sahly H M, Essink B, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. *N Engl J Med*, 2020, doi: 10.1056/NEJMo005943
- 3 Polack F P, Thomas S J, Kitchin N, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. *N Engl J Med*, 2020, 383: 2603–2615
- 4 Voysey M, Clemens S A C, Madhi S A, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: An interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. *Lancet*, 2021, 397: 99–111
- 5 Simondon F, Khodja H. Capture-recapture method for estimating misclassification errors: Application to the measurement of vaccine efficacy in randomized controlled trials. *Int J Epidemiol*, 1999, 28: 113–116
- 6 Marshall J C, Murthy S, Diaz J, et al. A minimal common outcome measure set for COVID-19 clinical research. *Lancet Infect Dis*, 2020, 20: e192–e197
- 7 Zhu F, Xu W, Xia J, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an enterovirus 71 vaccine in China. *N Engl J Med*, 2014, 370: 818–828
- 8 Zaman K, Anh D D, Victor J C, et al. Efficacy of pentavalent rotavirus vaccine against severe rotavirus gastroenteritis in infants in developing countries in Asia: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*, 2010, 376: 615–623
- 9 Lachenbruch P A. Sensitivity, specificity, and vaccine efficacy. *Control Clin Trials*, 1998, 19: 569–574
- 10 Dhama K, Khan S, Tiwari R, et al. Coronavirus Disease 2019–COVID-19. *Clin Microbiol Rev*, 2020, doi: 10.1128/CMR.00028-20
- 11 Tahamtan A, Ardebili A. Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: Issues affecting the results. *Expert Rev Mol Diagnost*, 2020, 20: 453–454
- 12 Orenstein W A, Bernier R H, Hinman A R. Assessing vaccine efficacy in the field. *Epidemiol Rev*, 1988, 10: 212–241
- 13 Hodgson S H, Mansatta K, Mallett G, et al. What defines an efficacious COVID-19 vaccine? A review of the challenges assessing the clinical efficacy of vaccines against SARS-CoV-2. *Lancet Infect Dis*, 2020, doi: 10.1016/S1473-3099(20)30773-8

补充材料

表S1 四种疫苗的Ⅲ期临床监测和检测体系方案设计的比较

本文以上补充材料见网络版csb.scichina.com。补充材料为作者提供的原始数据,作者对其学术质量和内容负责。

Summary for “科学理性解读COVID-19疫苗Ⅲ期临床保护效力数据”

A better understanding on efficacy data of phase III trials for COVID-19 vaccines

Pengfei Jin¹, Li Zhang², Jingxin Li^{1,2*} & Fengcai Zhu^{1,2*}

¹ NHC Key Laboratory of Enteric Pathogenic Microbiology, Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanjing 210009, China;

² Center for Global Health, School of Public Health, Nanjing Medical University, Nanjing 211166, China

* Corresponding authors, E-mail: jingxin42102209@126.com; jszfc@vip.sina.com

The clinical trial of vaccine efficacy is designed to compare the difference of incidence rate of disease or infections between vaccine group and placebo group, and to calculate the vaccine protection rate. Up to now, 22 COVID-19 vaccine candidates were under evaluation in phase III clinical trials, with the first two mRNA vaccines Moderna, and Pfizer/BioNTech announced efficacy of 94.1% and 95.0% for symptomatic COVID-19. However, several doubts concerning these results were raised, particularly by Peter Doshi, who speculated that a real efficacy of Pfizer/BioNTech's mRNA vaccine could be as low as 29%. The debates around the efficacy of the COVID-19 vaccines became hot than ever in China, which might lead to increased vaccine skepticism, vaccination hesitation and undermine public confidence. Therefore, we need to have a better understanding on the efficacy data and interpret the results correctly.

The selection of appropriate clinical endpoints with specific definition is critical. Hierarchical endpoints are often used in vaccine clinical trials to comprehensively evaluate the protective efficacy. Definition of hierarchical endpoints on basis of WHO clinical progression scale for COVID-19 could help to evaluate vaccine efficacy against COVID-19 with different severity, and compare the data from different trials. In general, vaccine efficacy is expected to be higher for the clinical endpoints with higher severity.

In addition, both sensitivity and specificity of the disease surveillance system could have impacts on the vaccine efficacy. Specificity is more important than sensitivity, especially in the case of low incidence rate of the endpoint, which has a great impact on the protective efficacy of the vaccine, and often leads to the underestimation of vaccine efficacy.

We compared phase III efficacy trial protocols of COVID-19 vaccine candidates sponsored by Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/University of Oxford and Johnson & Johnson, according to these impact factors mentioned above. Comparing with Moderna, AstraZeneca/University of Oxford and Johnson & Johnson's trials to adopt a sensitive definition of suspected COVID-19 cases, Pfizer/BioNTech's surveillance for diseases was mostly based on a passive surveillance involving self-report and self-sampling for case screening, which could compromise the sensitivity of the surveillance system capturing suspected COVID-19 cases. In addition, diagnostic testing to confirm the causative pathogen is important. However, the sensitivity of quantitative RT-PCR, the current goldstandard assay for diagnosis of SARS-CoV-2, is imperfect and influenced by viral load, sample type, and timing. Thus, collecting more than one specimen from suspected cases at more than one time points during the disease course, could results in a better sensitivity as well as specificity. Importantly, the serologic tests of antibody targeting at the N protein of SARS-CoV-2 could be used to identify whether it is naturally infected by SARS-CoV-2.

At last, sharing and opening of trial protocols and the disclosure of trial data will contribute to better and more scientific evaluation of the efficacy of COVID-19 vaccine candidates. Extending the period of case surveillance and accumulating data on the protective efficacy of COVID-19 vaccines can contribute to understand the true protective efficacy of the vaccine.

COVID-19, vaccine efficacy, clinical endpoints, surveillance system

doi: [10.1360/TB-2021-0077](https://doi.org/10.1360/TB-2021-0077)