加权 Bergman 空间 A_α^p 上复合算子本质范数的定量估计

段永江^{①*}, 李宇飞^②

① 东北师范大学数学与统计学院, 长春 130024;

② 大连理工大学数学科学学院, 大连 116024

E-mail: duanyj086@nenu.edu.cn, liyf495@mail.dlut.edu.cn

收稿日期: 2014-07-16; 接受日期: 2015-02-22; 网络出版日期: 2015-12-02; * 通信作者

国家自然科学基金(批准号: 11271075)、吉林省科技发展计划(批准号: 201215008)和高等学校博士学科点专项科研基金(批准号: 20120043120003)资助项目

摘要 本文主要利用一般形式的 Nevanlinna 计数函数给出了加权 Bergman 空间上的复合算子本质范数的定量估计. 特别地, 得到了 Hardy 空间上复合算子本质范数的最佳下估计:

$$\|C_\varphi\|_{e, H^p}^p \geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|}.$$

另外, 如果 φ 是内函数的话, 则有

$$\|C_\varphi\|_{e, H^p}^p = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|}, \quad 1 < p < \infty.$$

关键词 加权 Bergman 空间 Hardy 空间 复合算子 Nevanlinna 计数函数 本质范数**MSC (2010) 主题分类** 47B33, 47A30, 47B38

1 引言

设 φ 是复平面上单位圆盘 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 的解析函数, 且 X 是由 $\mathbb{D}$ 上的解析函数构成的 Banach 空间, 则 φ 诱导的复合算子按如下方式定义: $C_\varphi(f) = f \circ \varphi$. 当 X 是 Hardy 空间 $H^p(\mathbb{D})$ ($1 \leq p < \infty$) 或是加权 Bergman 空间 $A_\alpha^p(\mathbb{D})$ ($\alpha > -1, 1 \leq p < \infty$) 时, 利用 Littlewood 从属定理, C_φ 是 X 上的有界算子. 下面给出 Hardy 空间和加权 Bergman 空间的具体定义:

$$H^p(\mathbb{D}) = \left\{ f \in \text{Hol}(\mathbb{D}) : \|f\|_p^p = \sup_{0 < r < 1} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p \frac{d\theta}{2\pi} < \infty \right\},$$
$$A_\alpha^p(\mathbb{D}) = \left\{ f \in \text{Hol}(\mathbb{D}) : \|f\|_{p, \alpha}^p = \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p (\alpha + 1)(1 - |z|^2)^\alpha \frac{dA(z)}{\pi} < \infty \right\}.$$

英文引用格式: Duan Y J, Li Y F. Quantitative estimate of essential norm of the composition operator on A_α^p (in Chinese). Sci Sin Math, 2016, 46: 285–300, doi: 10.1360/012015-45

Banach 空间 X 上 C_φ 的本质范数就是 C_φ 到 X 上所有紧算子距离的下确界, 记作 $\|C_\varphi\|_{e,X}$. φ 的计数函数定义如下:

$$N_\varphi(w) = \sum_{z \in \varphi^{-1}(w)} \log \frac{1}{|z|}, \quad w \in \mathbb{D} \setminus \{\varphi(0)\}.$$

Shapiro^[1] 得到了 H^2 上 C_φ 的本质范数的优美等式:

$$\|C_\varphi\|_{e,H^2}^2 = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|}. \quad (1.1)$$

同时, Shapiro 还考虑了加权 Bergman 空间 $A_\alpha^2(\mathbb{D})$ ($\alpha > -1$), 并利用一般形式的 Nevanlinna 计数函数给出了其上复合算子本质范数的一个粗略估计. 令 $\gamma \geq 1$, 一般形式的 Nevanlinna 计数函数定义如下 (参见文献 [1]):

$$N_{\varphi,\gamma}(w) = \sum_{z \in \varphi^{-1}(w)} \left(\log \frac{1}{|z|} \right)^\gamma, \quad w \in \mathbb{D} \setminus \{\varphi(0)\}.$$

特别地, Shapiro 证明了存在常数 $m, M > 0$ 使得

$$m \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi,\alpha+2}(a)}{(-\log |a|)^{\alpha+2}} \leq \|C_\varphi\|_{e,A_\alpha^2}^2 \leq M \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi,\alpha+2}(a)}{(-\log |a|)^{\alpha+2}}. \quad (1.2)$$

人们自然想知道 (1.1) 在更一般的情形下是否成立. 在这方面, 利用零除子理论^[2], Corradini^[3] 证明了当 $\alpha = -1, 0, 1$ 时, 有

$$\|C_\varphi\|_{e,A_\alpha^2}^2 = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi,\alpha+2}(a)}{(-\log |a|)^{\alpha+2}}. \quad (1.3)$$

事实上, 如文献 [4] 指出, 利用 Shimorin^[5-7] 的零除子理论的结果, Corradini 的方法适用于 $-1 < \alpha \leq 1$. 在非 Hilbert 空间, 也有许多关于复合算子本质范数的结果, 参见文献 [8-10]. 我们想利用一般形式的 Nevanlinna 计数函数得到一般情形下的加权 Bergman 空间上复合算子本质范数的精确公式. 本文利用文献 [11] 构造一组算子的方法, 得到了部分结果. 希望我们的方法能对问题的最终解决提供帮助. 特别地, 我们得到如下定量估计.

定理 1.1 φ 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 的解析函数, C_φ 是 $A_\alpha^p(\mathbb{D})$ ($\alpha > -1, 1 \leq p < \infty$) 上的复合算子, 则对任意的 $r, 0 < r < 1$, 有

$$\|C_\varphi\|_{e,A_\alpha^p}^p \leq 2^p(\alpha+2) \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi,\alpha+2}(a)}{(-\log |a|)^{\alpha+2}}$$

和

$$\|C_\varphi\|_{e,A_\alpha^p}^p \geq \frac{(\alpha+2)r^2(1-r)^{2(\alpha+1)}}{2^p} \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi,\alpha+2}(a)}{(-\log |a|)^{\alpha+2}}.$$

Hardy 空间可以看作是加权 Bergman 空间的极限情形, 所以利用一些已有的结果我们可以得到如下结论.

定理 1.2 假设 $1 < p < \infty$, 则

$$\|C_\varphi\|_{e,H^p}^p \geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|}.$$

当 $p = 1$ 时,

$$\|C_\varphi\|_{e,H^1} \geq \frac{1}{2} \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|}.$$

定理 1.3 φ 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 的解析函数, $1 \leq p < \infty$, 则

(1) 对 $1 < p < \infty$, φ 是内函数当且仅当

$$\|C_\varphi\|_{e, H^p}^p = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|} = \frac{1 + |\varphi(0)|}{1 - |\varphi(0)|};$$

(2) 当 $p = 1$, φ 是内函数时, 则有

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1 + |\varphi(0)|}{1 - |\varphi(0)|} \leq \|C_\varphi\|_{e, H^1} \leq \frac{1 + |\varphi(0)|}{1 - |\varphi(0)|}.$$

本文结构如下: 第 2 节主要是本文中用到的工具和结果; 第 3 和 4 节分别给出定理 1.1 的上估计和下估计的证明; 最后一节给出定理 1.3 的证明.

2 预备引理

首先, 按照文献 [11] 的方式定义两类算子. 令 $\alpha > -1$, $1 \leq p < \infty$, 定义

$$S_n = C_{\psi_n},$$

其中对任意的 $z \in \mathbb{D}$, $n \geq 2$, $\psi_n(z) = \frac{n-1}{n}z$. 给定 $f \in A_\alpha^p$, 则 $|f|^p$ 次调和, 因此,

$$\begin{aligned} \|S_n f\|_{A_\alpha^p}^p &= \int_{\mathbb{D}} \left| f\left(\frac{n-1}{n}z\right) \right|^p (1 - |z|^2)^\alpha (\alpha + 1) \frac{dA(z)}{\pi} \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| f\left(\frac{n-1}{n}r e^{i\theta}\right) \right|^p d\theta \right) (\alpha + 1) 2r(1 - r^2)^\alpha dr \\ &\leq \int_0^1 \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r e^{i\theta})|^p d\theta \right) (\alpha + 1) 2r(1 - r^2)^\alpha dr \\ &= \|f\|_{A_\alpha^p}^p. \end{aligned}$$

故 $\|S_n\| \leq 1$. 且因为

$$\lim_{|z| \rightarrow 1} \frac{1 - |z|}{1 - |\psi_n(z)|} = 0,$$

故利用文献 [12, 定理 3.5] 和 [13, 定理 2.44] 可以得到 S_n 是 A_α^p 上的紧算子. 令 $F_n = I - S_n$, 则对任意的 $n \geq 2$, $\|F_n\| \leq \|I\| + \|S_n\| \leq 2$.

下面利用算子 S_n 和 F_n 来计算 A_α^p 上复合算子的本质范数.

一方面, 对任意的 $n \geq 2$,

$$\|C_\varphi\|_e = \|C_\varphi S_n + C_\varphi F_n\|_e \leq \|C_\varphi F_n\|. \tag{2.1}$$

另一方面, 对 A_α^p 上任意一个紧算子和任意 $n \geq 2$, 有

$$\|C_\varphi - K\| \geq \frac{\|F_n\|}{2} \|C_\varphi - K\| \geq \frac{1}{2} \|F_n C_\varphi - F_n K\| \geq \frac{1}{2} \|F_n C_\varphi\| - \frac{1}{2} \|F_n K\|. \tag{2.2}$$

下面要证明如下结论:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|F_n K\| = 0. \tag{2.3}$$

事实上, 因为 $A(\mathbb{D})$ 在 A_α^p 上稠密, 利用 Lebesgue 控制收敛定理, 很容易可以得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|F_n f\|_{A_\alpha^p}^p = 0, \quad \forall f \in A_\alpha^p. \quad (2.4)$$

令

$$B_{A_\alpha^p}^1 = \{f \in A_\alpha^p : \|f\| \leq 1\}$$

为 A_α^p 的闭单位球, 因为 K 是紧的, 故 $KB_{A_\alpha^p}^1$ 是预紧集, 因此对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $KB_{A_\alpha^p}^1$ 的有限 ε -网 $(Kf_1, \dots, Kf_m)$, 其中 $f_i \in B_{A_\alpha^p}^1$. 利用 (2.4), 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意的 $n > N$, $1 \leq i \leq m$, 有 $\|F_n Kf_i\|_{A_\alpha^p} < \varepsilon$, 对任意的 $f \in B_{A_\alpha^p}^1$, 存在 $j \in \{1, \dots, m\}$ 使得 $\|Kf - Kf_j\|_{A_\alpha^p} < \varepsilon$. 因此对任意的 $n > N$, 有

$$\|F_n Kf\|_{A_\alpha^p} \leq \|F_n(Kf - Kf_j)\|_{A_\alpha^p} + \|F_n Kf_j\|_{A_\alpha^p} < 2\varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon.$$

这意味着对任意的 $n \geq N$, $\|F_n K\| \leq \varepsilon$, 这样就完成了 (2.3) 的证明. $\square$

利用 (2.1)–(2.3) 可以得到

$$\frac{1}{2} \limsup_{n \rightarrow \infty} \|F_n C_\varphi\| \leq \|C_\varphi\|_{e, A_\alpha^p} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|C_\varphi F_n\|. \quad (2.5)$$

给定 $a \in \mathbb{D}$, 令

$$f_a(z) = \left[\frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2} \right]^{\frac{\alpha+2}{p}}, \quad (2.6)$$

则 $\|f_a\|_{A_\alpha^p} = 1$. 对任意的 $n \geq 2$,

$$\|F_n C_\varphi\| \geq \|F_n C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p} \geq \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p} - \|S_n C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p}.$$

对任意给定的 $n \geq 2$, $\varphi(\frac{n-1}{n}\mathbb{D})$ 包含在 $\mathbb{D}$ 的一个紧子集中, 因此对任意的 $z \in \mathbb{D}$, 有

$$|S_n C_\varphi f_a(z)| = \left| \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}\varphi(\frac{n-1}{n}z))^2} \right|^{\frac{\alpha+2}{p}} \leq C_n (1 - |a|^2)^{\frac{\alpha+2}{p}},$$

其中每一个 C_n 是与 z 的选择无关的常数. 因此对任意的 $n \geq 2$, 如果 $|a| \rightarrow 1$, 则 $\|S_n C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p} \rightarrow 0$. 因此,

$$\|F_n C_\varphi\| \geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p}, \quad \forall n \geq 2.$$

故利用 (2.5) 和上式, 我们有

$$\frac{1}{2} \limsup_{|a| \rightarrow 1} \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p} \leq \|C_\varphi\|_{e, A_\alpha^p} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|C_\varphi F_n\|. \quad (2.7)$$

幸运的是, 如果 $1 < p < \infty$, (2.7) 可以得到更精确的下界估计. 为了给出证明, 我们需要如下引理.

引理 2.1 假设 $\alpha > -1$, $1 < p < \infty$. f_a 的定义见 (2.6), 则下面的三条等价:

- (1) 当 $|a| \rightarrow 1$, $\{f_a\}$ 在 $\mathbb{D}$ 上逐点收敛到 0;
- (2) 当 $|a| \rightarrow 1$, $\{f_a\}$ 在 $\mathbb{D}$ 的紧子集上一致收敛到 0;
- (3) 当 $|a| \rightarrow 1$, A_α^p 中的网 $\{f_a\}$ 弱收敛到 0.

证明 证明类似于文献 [14, 引理 2.5], 故予以省略. □

(2.7) 可以作如下改进:

$$\|C_\varphi\|_{e, A_\alpha^p} \geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p}. \tag{2.8}$$

事实上, 对 A_α^p 上的任意紧算子 K , 有

$$\|C_\varphi - K\| \geq \|(C_\varphi - K)f_a\|_{A_\alpha^p} \geq \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p} - \|Kf_a\|_{A_\alpha^p}.$$

则由引理 2.1, 就可以得到 (2.8). □

下面的事实说明 (2.8) 对 $p = 1$ 不适用.

引理 2.2 当 $|a| \rightarrow 1$, 则 A^1 中的网 $\{f_a\}$ 并不弱收敛到 0.

要证明引理 2.2, 首先需要一些定义和事实. $\mathbb{D}$ 上定义的 Bloch 空间就是满足 $\sup\{(1 - |z|^2)|f'(z)| : z \in \mathbb{D}\} < \infty$ 的所有 $\mathbb{D}$ 上的解析函数构成的空间. 小 Bloch 空间中就是 Bloch 空间中满足

$$\lim_{|z| \rightarrow 1} (1 - |z|^2)|f'(z)| = 0$$

的元素构成的子空间.

引理 2.3 [15, 定理 15] 定义如下积分对:

$$\langle f, g \rangle_\alpha = \int_{\mathbb{D}} f(z)\overline{g(z)}(1 - |z|^2)^\alpha(\alpha + 1) \frac{dA(z)}{\pi},$$

则在等价范数意义下, 我们有如下对偶关系:

$$(\mathcal{B}_0)^* \cong A_\alpha^1, \quad (A_\alpha^1)^* \cong \mathcal{B}.$$

引理 2.2 的证明 令

$$g(z) = \log \frac{1}{1 - z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}.$$

易证 $g \in \mathcal{B}$. 令 $0 < a < 1$, 则利用

$$\frac{1}{(1 - z)^\beta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(n + \beta)}{\Gamma(n + 1)\Gamma(\beta)} z^n, \quad |z| < 1, \quad \beta > 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 1} \langle f_a, g \rangle_0 &= \lim_{a \rightarrow 1} \int_{\mathbb{D}} f_a(z)\overline{g(z)} \frac{dA(z)}{\pi} \\ &= \lim_{a \rightarrow 1} \lim_{t \rightarrow 1} \int_{t\mathbb{D}} f_a(z)\overline{g(z)} \frac{dA(z)}{\pi} \\ &= \lim_{a \rightarrow 1} \lim_{t \rightarrow 1} (1 - a^2)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(n + 4)}{\Gamma(n + 1)\Gamma(4)} \frac{a^n}{n} \int_{t\mathbb{D}} z^n \overline{z}^n \frac{dA(z)}{\pi} \\ &= \lim_{a \rightarrow 1} \lim_{t \rightarrow 1} (1 - a^2)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n + 2)(n + 3)}{3!n} a^n t^{2(n+1)} \\ &\geq \lim_{a \rightarrow 1} \lim_{t \rightarrow 1} (1 - a^2)^2 \frac{t^2}{6} \sum_{n=1}^{\infty} (n + 1)t^{2n} a^n \end{aligned}$$

$$= \lim_{a \rightarrow 1} \lim_{t \rightarrow 1} (1 - a^2)^2 \frac{t^2}{6} \left(\frac{1}{(1 - at^2)^2} - 1 \right) = \frac{2}{3}.$$

利用引理 2.3, 完成了引理 2.2 的证明. □

下面给出一些本文中接下来要用到的记号. 假设 φ 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 上的解析函数, 令 $\mathbb{D}' = \mathbb{D} \setminus \{z \in \mathbb{D} : \varphi'(z) = 0\}$, 存在一组互不相交的半开半闭集 $\{R_j\}$, 其并集为 $\mathbb{D}'$, 使得 φ 在每个 R_j 上是单射. 令 z_j 为 φ 限制在 R_j 上的逆映射, 使得 z_j 是 $\varphi(R_j)$ 到 R_j 的一一映射. 令 χ_j 为集合 $\varphi(R_j)$ 上的特征函数.

下面是著名的变量替换公式.

引理 2.4 ^[13, 定理 2.32] φ 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 上的解析函数, g 和 h 是 $\mathbb{D}$ 上的非负可测函数, 则

$$\int_{\mathbb{D}} g(\varphi(z)) |\varphi'(z)|^2 h(z) \frac{dA(z)}{\pi} = \int_{\varphi(\mathbb{D})} g(\omega) \sum_j \chi_j(\omega) h(z_j(\omega)) \frac{dA(\omega)}{\pi},$$

其中 $\omega = \varphi(z)$, $\{z_j(\omega)\}$ 记为 $\varphi(z) - \omega$ 的零点集, 重根按重数计.

我们需要如下公式 (参见文献 [16, (2.1)]):

$$\|f \circ \varphi\|_{H^p}^p = |f(\varphi(0))|^p + \frac{p^2}{2} \int_{\mathbb{D}} |f(\omega)|^{p-2} |f'(\omega)|^2 N_{\varphi,1}(\omega) \frac{dA(\omega)}{\pi}. \quad (2.9)$$

将 $\varphi(z) = rz$ 代入 (2.9), 得到如下引理.

引理 2.5 假设 $p > 0$ 且 $f \in H(\mathbb{D})$, 则

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta = \frac{p^2}{2} \int_{r\mathbb{D}} |f(z)|^{p-2} |f'(z)|^2 \log \frac{r}{|z|} \frac{dA(z)}{\pi} + |f(0)|^p.$$

引理 2.6 如果 $0 < p < \infty$ 且 $f \in A_\alpha^p$, 则

$$\|f\|_{A_\alpha^p}^p = p^2 \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^{p-2} |f'(z)|^2 \left(\int_{|z|}^1 r(1-r^2)^\alpha (\alpha+1) \log \frac{r}{|z|} dr \right) \frac{dA(z)}{\pi} + |f(0)|^p.$$

证明 利用引理 2.5 和 Fubini 定理, 按如下方式计算即可完成证明,

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p (1-|z|^2)^\alpha (\alpha+1) \frac{dA(z)}{\pi} \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta \right) (\alpha+1) 2r(1-r^2)^\alpha dr \\ &= \int_0^1 \left(\frac{p^2}{2} \int_{r\mathbb{D}} |f(z)|^{p-2} |f'(z)|^2 \log \frac{r}{|z|} \frac{dA(z)}{\pi} \right) 2r(1-r^2)^\alpha (\alpha+1) dr + |f(0)|^p \\ &= \frac{p^2}{2} \int_0^1 \left(\int_{\mathbb{D}} \chi_{r\mathbb{D}}(z) |f(z)|^{p-2} |f'(z)|^2 \log \frac{r}{|z|} \frac{dA(z)}{\pi} \right) 2r(1-r^2)^\alpha (\alpha+1) dr + |f(0)|^p \\ &= p^2 \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^{p-2} |f'(z)|^2 \left(\int_{|z|}^1 r(1-r^2)^\alpha (\alpha+1) \log \frac{r}{|z|} dr \right) \frac{dA(z)}{\pi} + |f(0)|^p. \end{aligned}$$

证毕. □

引理 2.7 设 $0 < |z| < 1$, 则

$$\frac{(1-|z|^2)^{\alpha+2}}{4(\alpha+2)} \leq \int_{|z|}^1 r(1-r^2)^\alpha (\alpha+1) \log \frac{r}{|z|} dr \leq \frac{(1-|z|^2)^{\alpha+1}}{2} \log \frac{1}{|z|}.$$

证明 易证从略. □

为了方便, 引入如下定义:

$$T(z) = \frac{(1 - |z|^2)^{\alpha+1}}{2} \log \frac{1}{|z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}. \tag{2.10}$$

引理 2.8 ^[17, 命题 4.23] 令 $\alpha > -1$, $f \in A_\alpha^1$, 则对任意的 $\omega \in \mathbb{D}$,

$$f(\omega) = \int_{\mathbb{D}} f(z)(1 - \omega\bar{z})^{-(\alpha+2)}(1 - |z|^2)^\alpha(\alpha + 1) \frac{dA(z)}{\pi}.$$

3 定理 1.1 的上估计

对任意的 $n \geq 2$, $f \in B_{A_\alpha^p}^1$, $\|f\|_{A_\alpha^p} = 1$, 令

$$I_n^1(f) = |(F_n f)(\varphi(0))|^p,$$

则由引理 2.6、2.7、变量替换公式 ($\omega = \varphi(z)$) 和 (2.10), 有

$$\begin{aligned} \|C_\varphi(F_n f)\|_{A_\alpha^p}^p - I_n^1(f) &\leq p^2 \int_{\mathbb{D}} |(F_n f)(\varphi(z))|^{p-2} |(F_n f)'(\varphi(z))|^2 |\varphi'(z)|^2 T(z) \frac{dA(z)}{\pi} \\ &= p^2 \int_{\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) T(z_j(\omega)) \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &= I_{r,n}^2(f) + I_{r,n}^3(f), \end{aligned} \tag{3.1}$$

其中

$$\begin{aligned} I_{r,n}^2(f) &= p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) T(z_j(\omega)) \frac{dA(\omega)}{\pi}, \\ I_{r,n}^3(f) &= p^2 \int_{\mathbb{D} \setminus r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) T(z_j(\omega)) \frac{dA(\omega)}{\pi}. \end{aligned}$$

易见

$$I_{r,n}^2(f) \leq p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \log \frac{1}{|z_j(\omega)|} \frac{dA(\omega)}{\pi}.$$

引理 3.1 G 是 $\mathbb{D}$ 中的任一紧集, 则当 $n \rightarrow \infty$, $\sup_{\|f\|_{A_\alpha^p}=1} |F_n f(z)|$ 在 G 上一致收敛到 0.

证明 因为 G 是紧集, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对任意的 $z \in G$ 和 $\omega \in \mathbb{D}$,

$$\left| \frac{1}{(1 - \bar{\omega}z)^{\alpha+2}} - \frac{1}{(1 - \bar{\omega}\frac{n-1}{n}z)^{\alpha+2}} \right| < \varepsilon.$$

令 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 利用引理 2.8 和 Hölder 不等式, 则对任意的 $f \in B_{A_\alpha^p}^1$ 有

$$\begin{aligned} |(F_n f)(z)| &= \left| f(z) - f\left(\frac{n-1}{n}z\right) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{D}} f(\omega)(1 - |\omega|^2)^\alpha(\alpha + 1) \left(\frac{1}{(1 - \bar{\omega}z)^{\alpha+2}} - \frac{1}{(1 - \bar{\omega}\frac{n-1}{n}z)^{\alpha+2}} \right) \frac{dA(\omega)}{\pi} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &< \varepsilon \int_{\mathbb{D}} |f(\omega)|(1 - |\omega|^2)^\alpha(\alpha + 1) \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &\leq \varepsilon \left(\int_{\mathbb{D}} |f(\omega)|^p (1 - |\omega|^2)^\alpha(\alpha + 1) \frac{dA(\omega)}{\pi} \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_{\mathbb{D}} (1 - |\omega|^2)^\alpha(\alpha + 1) \frac{dA(\omega)}{\pi} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

证毕. □

利用引理 3.1, 我们有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} I_n^1(f) = 0. \tag{3.2}$$

命题 3.1 假设 $\alpha > -1, 0 < r < 1, 1 \leq p < \infty$, 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \log \frac{1}{|z_j(\omega)|} \frac{dA(\omega)}{\pi} = 0.$$

证明 对任意的 $n \geq 2, \|f\|_{A_\alpha^p} = 1$, 令 $s = \sqrt{r} > r$. $\chi_{[0,r]}$ 和 $\chi_{(r,1]}$ 分别记作集合 $[0, r]$ 和 $(r, 1]$ 上的特征函数, 则

$$\begin{aligned} &p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \log \frac{1}{|z_j(\omega)|} \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &= II_{r,n}^1(f) + II_{r,n}^2(f) + II_{r,n}^3(f), \end{aligned} \tag{3.3}$$

其中

$$\begin{aligned} II_{r,n}^1(f) &= p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \chi_{[0,r]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{s}{|z_j(\omega)|} \frac{dA(\omega)}{\pi}, \\ II_{r,n}^2(f) &= p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \chi_{[0,r]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{1}{s} \frac{dA(\omega)}{\pi}, \\ II_{r,n}^3(f) &= p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \chi_{(r,1]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{1}{|z_j(\omega)|} \frac{dA(\omega)}{\pi}. \end{aligned}$$

下面把证明分成三步.

第 1 步 令 $\varphi(z) = \omega$, 利用变量替换公式和引理 2.5, 我们有

$$\begin{aligned} II_{r,n}^1(f) &= p^2 \sum_j \int_{\varphi(R_j) \cap r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \chi_{[0,r]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{s}{|z_j(\omega)|} \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &= p^2 \sum_j \int_{\{z \in R_j: |\varphi(z)| \leq r\} \cap \{z \in R_j: |z| \leq r\}} |(F_n f)(\varphi(z))|^{p-2} |(F_n f) \circ \varphi)'(z)|^2 \log \frac{s}{|z|} \frac{dA(z)}{\pi} \\ &\leq p^2 \int_{s\mathbb{D}} |(F_n f)(\varphi(z))|^{p-2} |(F_n f) \circ \varphi)'(z)|^2 \log \frac{s}{|z|} \frac{dA(z)}{\pi} \\ &= \int_0^{2\pi} |(F_n f)(\varphi(se^{i\theta}))|^p \frac{d\theta}{\pi} - 2|(F_n f)(\varphi(0))|^p. \end{aligned}$$

因此令 $G = \varphi(\overline{s\mathbb{D}})$, 由引理 3.1, 可以得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |(F_n f)(\varphi(se^{i\theta}))|^p d\theta - 2|(F_n f)(\varphi(0))|^p \right) = 0. \tag{3.4}$$

故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_{\alpha}^p} = 1} II_{r,n}^1(f) = 0. \tag{3.5}$$

第 2 步 因为 $s = \sqrt{r}$, 所以, $\log \frac{1}{s} = \log \frac{s}{r}$. 故

$$\begin{aligned} II_{r,n}^2(f) &= p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \chi_{[0,r]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{s}{r} \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &\leq p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) \chi_{[0,r]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{s}{|z_j(\omega)|} \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &= II_{r,n}^1(f). \end{aligned}$$

因此,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_{\alpha}^p} = 1} II_{r,n}^2(f) = 0. \tag{3.6}$$

第 3 步 下面将证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_{\alpha}^p} = 1} II_{r,n}^3(f) = 0. \tag{3.7}$$

首先我们需要一些引理.

引理 3.2 [18, 第 288-290 页] 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中 0 点的一个邻域, $f \in \text{Hol}(\Omega)$, $f(0', z_n)$ 在 $z_n = 0$ 点有 m 重零点 ($z = (z', z_n) \in \mathbb{C}^n$, 其中 $z' \in \mathbb{C}^{n-1}$, $z_n \in \mathbb{C}$), 则存在 n 维开邻域 $\Delta = \Delta' \times \Delta_n \in \Omega$ (Δ' 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中以 $0'$ 为心的 $n-1$ 维圆盘, Δ_n 是 $\mathbb{C}$ 中以 0 为心的 1 维圆盘), 使得对每个 $z' \in \Delta'$, $f(z', \cdot)$ 在 Δ_n 上正好有 m 个零点, 重根按重数计算, 且

$$f(z) = W(z)h(z), \quad z \in \Delta,$$

其中 $h \in \text{Hol}(\Delta)$, h 在 Δ 上无零点, 而且

$$W(z) = z_n^m + b_1(z')z_n^{m-1} + \cdots + b_m(z'),$$

这里 $b_j \in \text{Hol}(\Delta')$, $b_j(0') = 0$.

引理 3.3 [19, 命题 4.1] (Jensen 公式) 函数 f 在 $\mathbb{D}$ 上解析, $f(0) \neq 0$. $0 < t < 1$, 令 $z_1, \dots, z_l$ 是 f 在圆盘 $|z| < t$ 上的零点集, 重根按重数计, 则

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(te^{i\theta})| d\theta = \log |f(0)| + \sum_{k=1}^l \log \frac{t}{|z_k|}.$$

引理 3.4 令 $\omega_0 = \varphi(0)$, 则存在 $\delta_1 \in (0, r)$ 使得 $\sum_j \chi_{[\delta_1, 1]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{1}{|z_j(\omega)|}$ 在 ω_0 是上半连续的.

证明 假设 $\varphi(z) - \omega_0$ 在 $z = 0$ 点有 $m \geq 1$ 重零点. 利用引理 3.2, 存在双圆盘 $\Delta = B(\omega_0, \delta) \times B(0, \delta_1)$ 使得对每个 $\omega \in B(\omega_0, \delta)$, $\varphi(z) - \omega$ 在 $B(0, \delta_1)$ 上正好有 m 个零点 $z_1(\omega), \dots, z_m(\omega)$ (重根按重数计). 按如下方式在 $B(\omega_0, \delta) \times \mathbb{D}$ 上定义函数 $g(\omega, z)$:

$$g(\omega, z) = \frac{\varphi(z) - \omega}{(z - z_1(\omega)) \cdots (z - z_m(\omega))}, \quad \omega \in B(\omega_0, \delta), \quad z \in \mathbb{D}, \tag{3.8}$$

其中

$$(z - z_1(\omega)) \cdots (z - z_m(\omega)) = z^m + b_1(\omega)z^{m-1} + \cdots + b_m(\omega).$$

由引理 3.2 可知, $g(\omega, z) \in \text{Hol}(\Delta)$ 且在 Δ 上没有零点, 另外, 对任意的 $j \in \{1, \dots, m\}$, $b_j(\omega) \in \text{Hol}(B(\omega_0, \delta))$, $b_j(\omega_0) = 0$. 对函数 $g(\omega, z)$ 运用引理 3.3, 当 $w \in B(\omega_0, \delta)$ 时,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |g(\omega, te^{i\theta})| d\theta = \log |g(\omega, 0)| + \sum_{k=m+1}^l \log \frac{t}{|z_j(\omega)|}, \quad (3.9)$$

其中 $0 < t < 1$, $z_{m+1}(\omega), \dots, z_l(\omega)$ 为 $\varphi - \omega$ 在 $\delta_1 \leq |z| < t$ 上的零点.

由 $g(\omega, z) \in \text{Hol}(\Delta)$ 且在 Δ 上无零点, 我们有 $\log |g(\omega, 0)|$ 在 $B(\omega_0, \delta)$ 上连续. 下面先考虑 (3.9) 的左半部分:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |g(\omega, te^{i\theta})| d\theta = P_1(\omega) + P_2(\omega),$$

其中

$$P_1(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |\varphi(te^{i\theta}) - \omega| d\theta,$$

$$P_2(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log \left| \frac{1}{(te^{i\theta} - z_1(\omega)) \cdots (te^{i\theta} - z_m(\omega))} \right| d\theta.$$

因为对任意的 $\theta \in [0, 2\pi]$, $\omega \in B(\omega_0, \delta)$, $\log |\varphi(te^{i\theta}) - \omega| \leq \log 2$. 由 Fatou 引理, 我们有

$$\limsup_{\omega \rightarrow \omega_0} P_1(\omega) \leq P_1(\omega_0).$$

另外, 因为 $b_j(\omega) \in \text{Hol}(B(\omega_0, \delta))$, $t > \delta_1$, 所以, $P_2(\omega)$ 在 ω_0 点连续. 因此, 由 (3.9) 知, $\sum_{k=m+1}^l \log \frac{t}{|z_j(\omega)|}$ 在 ω_0 点上半连续. 当 $t \rightarrow 1$, 则函数 $\sum_{k=m+1}^l \log \frac{t}{|z_j(\omega)|}$ 逐点递增到 $\sum_{k=m+1}^\infty \log \frac{1}{|z_j(\omega)|}$. 故

$$\sum_{k=m+1}^\infty \log \frac{1}{|z_j(\omega)|}$$

在 ω_0 点上半连续. □

引理 3.5 ^[20, 推论 2.4.7] 假设 $f \in H^2$ 且 $f \neq 0$, $\{z_k\}_{k=1}^\infty$ 是 f 不为零的零点集, 则 $\prod_{k=1}^\infty |z_k|$ 收敛.

引理 3.6 ^[20, 定理 2.4.8] 如果对任意的 k , $0 < r_k < 1$, 则 $\prod_{k=1}^\infty r_k$ 收敛当且仅当 $\sum_{k=0}^\infty (1 - r_k)$ 收敛.

(3.7) 的证明 利用引理 3.5 和 3.6, 则存在 $M_{\omega_0} > 0$ 使得

$$\sum_j \chi_{(\delta_1, 1]}(|z_j(\omega_0)|) \log \frac{1}{|z_j(\omega_0)|} < M_{\omega_0}.$$

再由引理 3.4, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$\sum_j \chi_{(\delta_1, 1]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{1}{|z_j(\omega)|} < M_{\omega_0} + \varepsilon, \quad \omega \in B(\omega_0, \delta_0).$$

由 $N_\varphi(\omega)$ 在 $\mathbb{D} \setminus \{\omega_0\}$ 上连续 (参见文献 [1, 注 4.6]), 则存在 $M_1 > 0$ 使得在 $\mathbb{D} \setminus B(\omega_0, \delta_0)$ 上 $N_\varphi(\omega) < M_1$. 因此令 $M_r = \max\{M_1, M_{\omega_0} + \varepsilon\} > 0$ 使得

$$\sup_{\omega \in r\mathbb{D}} \sum_j \chi_j(\omega) \chi_{(r, 1]}(|z_j(\omega)|) \log \frac{1}{|z_j(\omega)|} < M_r.$$

由前文知 $s = \sqrt{r}$, 令 $M'_r > 0$ 使得

$$M'_r \log \frac{s}{r} = M'_r \log \frac{1}{\sqrt{r}} \geq 1,$$

则利用引理 2.5, 我们有

$$\begin{aligned} II_{r,n}^3(f) &\leq M_r p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &\leq M'_r M_r p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \log \frac{s}{r} \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &\leq M'_r M_r p^2 \int_{r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \log \frac{s}{|\omega|} \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &\leq M'_r M_r \left(\int_0^{2\pi} |(F_n f)(se^{i\theta})|^p \frac{d\theta}{\pi} - 2|(F_n f)(0)|^p \right) \\ &= M'_r M_r \int_0^{2\pi} |(F_n f)(se^{i\theta})|^p \frac{d\theta}{\pi}. \end{aligned}$$

由引理 3.1, 我们有 (3.7), 这样就证明了第 3 步.

联合 (3.3) 和 (3.5)–(3.7), 就可以证明命题 3.1. □

定理 1.1 上估计的证明 注意到对任意的 $0 < |z| < 1$, $(1 - |z|^2) \leq 2 \log \frac{1}{|z|}$. 另外, 由 (3.1)、(3.2) 和引理 3.1, 我们有

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} \|C_\varphi(F_n f)\|_{A_\alpha^p}^p &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} I_{r,n}^3(f) \\ &\leq 2^\alpha \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} p^2 \int_{\mathbb{D} \setminus r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 N_{\varphi, \alpha+2}(\omega) \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ &\leq 2^\alpha \sup_{r \leq |\omega| < 1} \tau(\omega) \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} p^2 \int_{\mathbb{D} \setminus r\mathbb{D}} |(F_n f)(\omega)|^{p-2} |(F_n f)'(\omega)|^2 \\ &\quad \times \frac{(1 - |\omega|^2)^{\alpha+2}}{4(\alpha+2)} \frac{dA(\omega)}{\pi}, \end{aligned} \tag{3.10}$$

其中

$$\tau(\omega) = \frac{N_{\varphi, \alpha+2}(\omega)}{\frac{(1 - |\omega|^2)^{\alpha+2}}{4(\alpha+2)}}.$$

由引理 2.6 和 2.7, 我们有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} \|C_\varphi(F_n f)\|_{A_\alpha^p}^p \leq 2^\alpha \sup_{r \leq |\omega| < 1} \tau(\omega) \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\|f\|_{A_\alpha^p} = 1} \|F_n f\|_{A_\alpha^p}^p.$$

由 (2.7) 和 $\lim_{|\omega| \rightarrow 1} \frac{\log(1/|\omega|)}{\frac{(1 - |\omega|^2)}{2}} = 1$, 当 $r \rightarrow 1$ 时, 则有

$$\|C_\varphi\|_{e, A_\alpha^p}^p \leq 2^p (\alpha + 2) \limsup_{|\omega| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi, \alpha+2}(\omega)}{(-\log |\omega|)^{\alpha+2}},$$

这样我们就完成了定理 1.1 上估计的证明. □

4 定理 1.1 下估计的证明

为了计算下估计, 我们需要下面引理.

引理 4.1 φ 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 上的解析函数, 对任意给定的 $a \in \mathbb{D}$, 令 $Z_a = \{z \in \mathbb{D} : \varphi(z) = a\}$ (至多可数), 则对任意的 $t_0 \in (0, 1)$, 存在 $r_0 \in (0, 1)$ 使得当 $|a| \geq r_0$ 时, 对任意的 $z \in Z_a$, $|z| \geq t_0$.

证明 令 $r_0 = \max\{|\varphi(\omega)| : |\omega| \leq t_0\}$, 假设存在 $a \in \mathbb{D}$ 使得 $|a| \geq r_0$ 且存在 $z_0 \in Z_a$ 使得 $|z_0| < t_0$. 则由最大模原理知, $r_0 > |\varphi(z_0)| = |a|$, 这与 r_0 的定义相矛盾. $\square$

引理 4.2 令 $0 < |z| < 1$, 我们有 $2|z|^2 \log \frac{1}{|z|} \leq 1 - |z|^2$.

证明 因为 $0 < |z| < 1$, 故

$$\begin{aligned} 2 \log \frac{1}{|z|} &= \log \frac{1}{1 - (1 - |z|^2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - |z|^2)^n}{n} = (1 - |z|^2) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1 - |z|^2)^k}{k+1} \\ &\leq (1 - |z|^2) \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1 - |z|^2)^k}{k} \right) = (1 - |z|^2) \left(1 + 2 \log \frac{1}{|z|} \right). \end{aligned}$$

因此, $2|z|^2 \log \frac{1}{|z|} \leq 1 - |z|^2$. 引理得证. $\square$

假设 $a \in \mathbb{D}$, 令 $\psi_a(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$, $z \in \mathbb{D}$, 则有下面的引理.

引理 4.3 [1, 推论 6.7] 假设 $\alpha > -1$. 如果 $0 < r < |\psi_a(\varphi(0))|$, 则

$$N_{\varphi, \alpha+2}(\psi_a(0)) \leq \frac{1}{r^2} \int_{r\mathbb{D}} N_{\varphi, \alpha+2}(\psi_a(\omega)) \frac{dA(\omega)}{\pi}.$$

引理 4.4 [21, 命题 8] 假设 $0 < p < \infty$ 且 $f \in H^p$, 则对任意的 $\alpha \in (-1, \infty)$, $f \in A_\alpha^p$ 且

$$\lim_{\alpha \rightarrow -1^+} \|f\|_{A_\alpha^p} = \|f\|_{H^p}.$$

定理 1.1 下估计的证明 联合引理 2.6、2.7、(2.6) 和变量替换公式 ($\omega = \varphi(z)$), 我们有

$$\begin{aligned} \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p}^p &\geq p^2 \int_{\mathbb{D}} |f_a(\varphi(z))|^{p-2} |f'_a(\varphi(z))|^2 |\varphi'(z)|^2 \frac{(1 - |z|^2)^{\alpha+2}}{4(\alpha+2)} \frac{dA(z)}{\pi} + |f_a(\varphi(0))|^p \\ &= \frac{p^2}{4(\alpha+2)} \int_{\mathbb{D}} |f_a(\omega)|^{p-2} |f'_a(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) (1 - |z_j(\omega)|^2)^{\alpha+2} \frac{dA(\omega)}{\pi} + |f_a(\varphi(0))|^p \\ &= (\alpha+2)|a|^2 \int_{\mathbb{D}} \frac{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}}{|1 - \bar{a}\omega|^{2(\alpha+3)}} \sum_j \chi_j(\omega) (1 - |z_j(\omega)|^2)^{\alpha+2} \frac{dA(\omega)}{\pi} + |f_a(\varphi(0))|^p. \end{aligned} \quad (4.1)$$

如果 $|a| \rightarrow 1$, 则 $|f_a(\varphi(0))|^p$ 趋近于 0. 显然,

$$|\psi'_a(\omega)| = \frac{1 - |a|^2}{|1 - \bar{a}\omega|^2}.$$

下面开始计算 (4.1) 右边第一项. 令 $\eta = \psi_a(\omega)$, 由变量替换公式可以得到

$$\begin{aligned} (\alpha+2)|a|^2 \int_{\mathbb{D}} \frac{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}}{|1 - \bar{a}\omega|^{2(\alpha+3)}} \sum_j \chi_j(\omega) (1 - |z_j(\omega)|^2)^{\alpha+2} \frac{dA(\omega)}{\pi} \\ = (\alpha+2)|a|^2 \int_{\mathbb{D}} \frac{(1 - |a|^2)^\alpha}{|1 - \bar{a}\omega|^{2(\alpha+1)}} |\psi'_a(\omega)|^2 \sum_j \chi_j(\omega) (1 - |z_j(\omega)|^2)^{\alpha+2} \frac{dA(\omega)}{\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\alpha + 2)|a|^2}{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}} \int_{\mathbb{D}} \frac{(1 - |a|^2)^{2(\alpha+1)}}{|1 - \bar{a}\psi_a(\eta)|^{2(\alpha+1)}} \sum_j \chi_j(\psi_a(\eta))(1 - |z_j(\psi_a(\eta))|^2)^{\alpha+2} \frac{dA(\eta)}{\pi} \\
 &= \frac{(\alpha + 2)|a|^2}{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}} \int_{\mathbb{D}} |1 - \bar{a}\eta|^{2(\alpha+1)} \sum_j \chi_j(\psi_a(\eta))(1 - |z_j(\psi_a(\eta))|^2)^{\alpha+2} \frac{dA(\eta)}{\pi}. \tag{4.2}
 \end{aligned}$$

固定 $0 < r < 1$, 将上式的积分区域固定在圆盘 $r\mathbb{D}$ 上. 利用 (4.1)、(4.2) 和引理 4.2, 我们有

$$\begin{aligned}
 \limsup_{|a| \rightarrow 1} \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p}^p &\geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{(\alpha + 2)|a|^2(1 - r)^{2(\alpha+1)}}{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}} \int_{r\mathbb{D}} \sum_j \chi_j(\psi_a(\eta))(1 - |z_j(\psi_a(\eta))|^2)^{\alpha+2} \frac{dA(\eta)}{\pi} \\
 &\geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{(\alpha + 2)|a|^2(1 - r)^{2(\alpha+1)}}{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}} \int_{r\mathbb{D}} \sum_j \chi_j(\psi_a(\eta))(2|z_j(\psi_a(\eta))|^2) \\
 &\quad \times \log \frac{1}{|z_j(\psi_a(\eta))|} \Big)^{\alpha+2} \frac{dA(\eta)}{\pi} \\
 &\geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{(\alpha + 2)|a|^2(1 - r)^{2(\alpha+1)}}{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}} \inf_{\eta \in r\mathbb{D}, j \in \mathbb{N}} 2^{\alpha+2} |z_j(\psi_a(\eta))|^{2(\alpha+2)} \\
 &\quad \times \int_{r\mathbb{D}} \sum_j \chi_j(\psi_a(\eta)) \log \frac{1}{|z_j(\psi_a(\eta))|} \Big)^{\alpha+2} \frac{dA(\eta)}{\pi}.
 \end{aligned}$$

因为当 $|a| \rightarrow 1$ 时, $\psi_a(\varphi(0))$ 趋近于 $\partial\mathbb{D}$. 则由上式和引理 4.3 可以得到

$$\begin{aligned}
 \limsup_{|a| \rightarrow 1} \|C_\varphi f_a\|_{A_\alpha^p}^p &\geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{(\alpha + 2)|a|^2(1 - r)^{2(\alpha+1)}}{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}} \inf_{\eta \in r\mathbb{D}, j \in \mathbb{N}} 2^{\alpha+2} |z_j(\psi_a(\eta))|^{2(\alpha+2)} \\
 &\quad \times \int_{r\mathbb{D}} N_{\varphi, \alpha+2}(\psi_a(\eta)) \frac{dA(\eta)}{\pi} \\
 &\geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{(\alpha + 2)|a|^2 r^2 (1 - r)^{2(\alpha+1)}}{(1 - |a|^2)^{\alpha+2}} \inf_{\eta \in r\mathbb{D}, j \in \mathbb{N}} 2^{\alpha+2} |z_j(\psi_a(\eta))|^{2(\alpha+2)} N_{\varphi, \alpha+2}(a).
 \end{aligned}$$

由引理 4.1, 对任意的 $t_0 \in (0, 1)$, 存在 $r_0 \in (0, 1)$, 当 $\inf_{\eta \in r\mathbb{D}} |\psi_a(\eta)| \geq r_0$ 时, 有

$$\inf_{\eta \in r\mathbb{D}} |z_j(\psi_a(\eta))| \geq t_0.$$

注意到当 $|a| \rightarrow 1$ 时, $|\psi_a|$ 在 $r\mathbb{D}$ 上一致趋近于 1, 因此对于 r_0 , 存在 $s_0 \in (0, 1)$, 当 $|a| \geq s_0$ 时,

$$\inf_{\eta \in r\mathbb{D}} |\psi_a(\eta)| \geq r_0.$$

故对任意的 $t_0 \in (0, 1)$, 存在 $s_0 \in (0, 1)$, 当 $|a| \geq s_0$ 时, $\inf_{\eta \in r\mathbb{D}, j \in \mathbb{N}} |z_j(\psi_a(\eta))| \geq t_0$. 因此, 我们有

$$\limsup_{|a| \rightarrow 1} \inf_{\eta \in r\mathbb{D}, j \in \mathbb{N}} |z_j(\psi_a(\eta))| = 1.$$

由 (2.7) 和 $\lim_{|a| \rightarrow 1} \frac{\log \frac{1}{|a|}}{1 - |a|^2} = 1$, 我们得到

$$\|C_\varphi\|_{e, A_\alpha^p}^p \geq \frac{(\alpha + 2)r^2(1 - r)^{2(\alpha+1)}}{2^p} \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi, \alpha+2}(a)}{(-\log |a|)^{\alpha+2}}.$$

证毕. □

注 4.1 显然,

$$\sup_{0 < r < 1} r^2(1-r)^{2(\alpha+1)} = \frac{(\alpha+1)^{2(\alpha+1)}}{(\alpha+2)^{2(\alpha+2)}}.$$

令 $m_{\alpha,p} = \frac{(\alpha+1)^{2(\alpha+1)}}{2^p(\alpha+2)^{2\alpha+3}}$, 则

$$\|C_\varphi\|_{e,A_\alpha^p}^p \geq m_{\alpha,p} \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_{\varphi,\alpha+2}(a)}{(-\log|a|)^{\alpha+2}}.$$

当 $1 < p < \infty$, 我们可以利用改进的下估计公式 (2.8) 替换 (2.7) 的下估计, 因此,

$$m_{\alpha,p} = \frac{(\alpha+1)^{2(\alpha+1)}}{(\alpha+2)^{2\alpha+3}}.$$

特别地, $\alpha \rightarrow -1$, $m_{\alpha,p} \rightarrow 1$. 由引理 4.4 知, 在 Hardy 空间 H^p , $1 < p < \infty$ 上, $m_{\alpha,p} = 1$, 也即

$$\|C_\varphi\|_{e,H^p}^p \geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log|a|}. \quad (4.3)$$

当 $p = 1$ 时,

$$\|C_\varphi\|_{e,H^1} \geq \frac{1}{2} \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log|a|}. \quad (4.4)$$

5 特殊情形

定理 5.1 令 φ 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 上的解析函数, $1 \leq p < \infty$, 则

(1) 当 $1 < p < \infty$ 时, φ 是内函数当且仅当

$$\|C_\varphi\|_{e,H^p}^p = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log|a|} = \frac{1+|\varphi(0)|}{1-|\varphi(0)|}; \quad (5.1)$$

(2) 当 $p = 1$, 且 φ 是内函数时,

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1+|\varphi(0)|}{1-|\varphi(0)|} \leq \|C_\varphi\|_{e,H^1} \leq \frac{1+|\varphi(0)|}{1-|\varphi(0)|}. \quad (5.2)$$

引理 5.1 [22, 第 59 页] φ 是内函数当且仅当

$$\|C_\varphi : H^2 \rightarrow H^2\|^2 = \|C_\varphi\|_{e,H^2}^2 = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log|a|} = \frac{1+|\varphi(0)|}{1-|\varphi(0)|}. \quad (5.3)$$

引理 5.2 [14, 命题 2.15] 假设 $1 \leq p < \infty$, φ 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 上的解析函数, 则有

$$\|C_\varphi : H^p \rightarrow H^p\|^p = \|C_\varphi : H^2 \rightarrow H^2\|^2. \quad (5.4)$$

定理 5.1 的证明 如果 $1 \leq p < \infty$ 且 φ 是内函数, 则联合 (5.3) 和 (5.4), 有

$$\begin{aligned} \|C_\varphi\|_{e,H^p}^p &\leq \|C_\varphi : H^p \rightarrow H^p\|^p = \|C_\varphi : H^2 \rightarrow H^2\|^2 \\ &= \|C_\varphi\|_{e,H^2}^2 = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log|a|} = \frac{1+|\varphi(0)|}{1-|\varphi(0)|}. \end{aligned} \quad (5.5)$$

联合 (5.5)、(4.3) 和 (4.4), 定理得证. □

推论 5.1 假设 $1 < p < \infty$. 当 φ 是内函数时, 则 $\|C_\varphi : H^p \rightarrow H^p\| = \|C_\varphi\|_{e, H^p}$.

证明 联合 (5.1)、(5.3) 和 (5.4) 易得. □

但是推论 5.1 的逆命题不正确. 由下可知.

推论 5.2 假设 $1 < p < \infty$, $\varphi(z) = sz + t$, $|s| + |t| \leq 1$, $|t| < 1$, 则 $\|C_\varphi : H^p \rightarrow H^p\| = \|C_\varphi\|_{e, H^p}$ 当且仅当 $|s| + |t| = 1$.

引理 5.3 [23, 定理 3] 令 $\varphi(z) = sz + t$, 其中 $|s| + |t| \leq 1$, 则

$$\|C_\varphi : H^2 \rightarrow H^2\|^2 = \frac{2}{1 + |s|^2 - |t|^2 + \sqrt{(1 - |s|^2 + |t|^2)^2 - 4|t|^2}}. \quad (5.6)$$

推论 5.2 的证明 因为 φ 是单射, 由文献 [24, 公式 (3)] 知,

$$\|C_\varphi\|_{e, H^p}^p = \left[\min_{\xi \in \partial\mathbb{D}} |\varphi'(\xi)| \right]^{-1} = \frac{1}{|s|}. \quad (5.7)$$

则由 (5.6) 和 (5.7), 我们就可以得到证明. □

致谢 作者对审稿人为本文提供的宝贵意见表示感谢.

参考文献

- 1 Shapiro J. The essential norm of a composition operator. *Ann of Math*, 1987, 125: 375–404
- 2 Hedenmalm H. A factorization theorem for square area-integrable analytic functions. *J Reine Angew Math*, 1991, 422: 45–68
- 3 Corradini P. The essential norm of composition operators revisited. *Contemp Math*, 1998, 213: 167–173
- 4 Carswell B, Hammond C. Composition operators with maximal norm on weighted Bergman spaces. *Proc Amer Math Soc*, 2006, 134: 2599–2605
- 5 Shimorin S. Factorization of analytic functions in weighted Bergman spaces. *St Petersburg Math J*, 1994, 5: 1005–1022
- 6 Shimorin S. On a family of conformally invariant operators. *St Petersburg Math J*, 1996, 7: 287–306
- 7 Shimorin S. The green function for the weighted biharmonic operator $\Delta(1 - |z|^2)^{-\alpha}\Delta$, and factorization of analytic functions. *J Math Sci*, 1997, 87: 3912–3924
- 8 Gonzalez F, Rattya J, Vukotic D. On composition operators acting between Hardy and weighted Bergman spaces. *Expo Math*, 2007, 25: 309–323
- 9 Galindo P, Laitila J, Lindstrom M. Essential norm estimates for composition operators on BMOA. *J Funct Anal*, 2013, 265: 629–643
- 10 Rattya J. The essential norm of a composition operator into the Q_s -space. *J Math Anal Appl*, 2007, 333: 787–797
- 11 Charpentier S. Essential norm of composition operators on the Hardy space H^1 and the weighted Bergman spaces A_α^p on the ball. *Arch Math*, 2012, 98: 327–340
- 12 MacCluer B, Shapiro J. Angular derivatives and compact composition operators on the Hardy and Bergman spaces. *Canad J Math*, 1986, 4: 878–906
- 13 Cowen C, MacCluer B. *Composition Operators on Spaces of Analytic Functions*. Boca Raton: CRC Press, 1995
- 14 Hammond C. On the norm of a composition operator. PhD Thesis. Charlottesville: University of Virginia, 2003
- 15 Zhu K. Duality of Bloch space and norm convergence of Taylor series. *Michigan Math J*, 1991, 38: 89–101
- 16 Smith W. Composition operators between Bergman and Hardy spaces. *Trans Amer Math Soc*, 1996, 348: 2331–2348
- 17 Zhu K. *Operator Theory in Function Spaces*. 2nd ed. Providence: Amer Math Soc, 2007
- 18 Rudin W. *Function theory in the unit ball of $\mathbb{C}^n$* . New York: Springer, 1980
- 19 Hedenmalm H, Korenblum B, Zhu K. *Theory of Bergman Spaces*. New York: Springer, 2000
- 20 Martinez-Avendano R, Rosenthal P. *An Introduction to Operators on the Hardy-Hilbert Space*. New York: Springer, 2007
- 21 Zhu K. Translating inequalities between Hardy and Bergman spaces. *Amer Math Monthly*, 2004, 111: 520–525
- 22 Shapiro J. What do composition operators know about inner functions? *Monatsh Math*, 2000, 130: 57–70
- 23 Cowen C. Linear fractional composition operators on H^2 . *Integral Equations Operator Theory*, 1988, 11: 151–160

Quantitative estimate of essential norm of the composition operator on A_α^p

DUAN YongJiang & LI YuFei

Abstract In this paper, we get quantitative estimate of the essential norm of the composition operator C_φ on the weighted Bergman space $A_\alpha^p(\mathbb{D})$ ($\alpha > -1$, $1 \leq p < \infty$) in terms of the generalized Nevanlinna counting function. In particular, when $\alpha \rightarrow -1$, we find that on the Hardy space H^p ($1 < p < \infty$), it holds that

$$\|C_\varphi\|_{e, H^p}^p \geq \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|}.$$

Moreover, if φ is an inner function, we have

$$\|C_\varphi\|_{e, H^p}^p = \limsup_{|a| \rightarrow 1} \frac{N_\varphi(a)}{-\log |a|}, \quad 1 < p < \infty.$$

Keywords weighted Bergman space, Hardy space, composition operator, Nevanlinna counting function, essential norm

MSC(2010) 47B33, 47A30, 47B38

doi: 10.1360/012015-45