



DOI:10.14188/j.ajsh.2023.05.012

雪山高士——血雉

舒 实^{1,2}

(1. 湖北冬源生态科技有限公司, 湖北 武汉 430074;
2. 武汉市观鸟协会, 湖北 武汉 430056)

血雉(*Ithaginis cruentus*),雄鸟大覆羽、尾下覆羽、尾上覆羽、脚、头侧、腊膜为红色,故名血雉,别名血鸡,又名松花鸡。为鸡形目(Galliformes)雉科(Phasianidae)的鸟类^[1],为中国特有种^[2]。血雉为国家二级重点保护野生动物;在《中国生物多样性红色名录——脊椎动物卷》(2020)中被列为近危(NT)物种,在《濒危野生动植物种国际贸易公约》中被列为附录Ⅱ的物种。血雉主要分布于我国西藏、甘肃、青海、四川、陕西、云南的1700~3200米左右的冷杉林、混交林及灌木间。

血雉为雌雄异色鸟类^[3],雄鸟头部灰色,眼周橘红色,头后具灰色丝状冠羽;上体灰色,带细长的羽干纹,羽干纹为白色,带有纤细的黑边;尾羽基部灰色,端部渐白,杂有绯红色羽丝;下体颜色类似上体而略淡,胸胁部羽干纹渐变为明黄色或杂有少量血红纵纹,尾下覆羽带艳丽的绯红色丝状外缘;虹膜深褐色,眼周和脚为橘红至朱红色。雌鸟通体暗褐色,略带不明显的虫囊斑,冠羽较小呈灰色,头部泛棕黄,喙和蜡膜黑色,脚橘红色,不带距^[4]。

血雉夏季分布可至海拔3300至4500米靠近雪线的地方,冬迁到较低的山地,其垂直迁徙与雪线有关,血雉常栖息于清静凉爽且人迹罕至处,性情桀骜不驯,难以人工驯养,犹如与世无争自由恬淡的山中高士。

中国是世界上雉科鸟类最丰富的国家,计有11属55种,占世界雉科鸟类总数的35%,居世界首位,其中20种为中国特有种^[5]。由于栖息地破坏、非法捕猎与人类活动干扰,部分地区适宜血雉生存的栖息地已被分隔为若干个斑块,部分斑块中的血雉种群已极度退缩甚至绝迹^[6],急需采取措施加以保护。

参考文献

- [1] 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录(第四版)[M]. 北京: 科学出版社, 2023
- [2] 张雁云,郑光美 中国生物多样性红色名录:脊椎动物 第二卷 鸟类[M]. 北京: 科学出版社, 2021
- [3] 郑作新,冼耀华,关贯勋. 中国动物志•鸟纲•第六卷[M]. 北京: 科学出版社, 1991
- [4] 赵正阶. 中国鸟类志(上卷非雀形目)[M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 2001
- [5] 张正旺,丁长青,丁平等. 中国鸡形目鸟类的现状与保护对策[J]. 生物多样性, 2003, (5): 414-421.
- [6] 郑光美. 中国濒危雉类生态学研究进展[J]. 生物学通报, 2004, 39(1):1-3.

□

(编辑: 杨晓翠)