6-氰基吡啶-3-甲醛的合成

葛裕华* 吴亚明 薛忠俊

(东南大学化学化工系 南京 210096)

关键词 氰基吡啶, 氰基吡啶甲醛, 合成

中图分类号: O625

文献标识码: A

文章编号: 1000-0518(2005)04-0454-03

6-氰基吡啶-3-甲醛是一种重要的医药和有机化工中间体,能合成一些具有生理活性和药理活性的化合物。关于6-氰基吡啶-3-甲醛的合成,已有的方法如下(1)以4-甲基-3-硝基苯腈为原料,先合成6-氰基吡啶-2-甲酸,然后在高温脱羧得6-氰基吡啶^[1]。6-氰基吡啶经Vilsmeier反应制得6-氰基吡啶-3-甲醛^[2]。(2)以6-氰基吡啶啉为原料,在钯-碳催化剂存在下脱氢得6-氰基吡啶^[3]或以4-甲基-3-硝基苯腈为原料先合成6-氰基吡啶^[4]。6-氰基吡啶同样经Vilsmeier反应制得6-氰基吡啶-3-甲醛^[2]。上述2种方法都存在一些缺点和不足,方法(1)在脱羧这一步需要200℃以上的高温,操作上非常困难;方法(2)虽然克服了方法(1)需要高温的缺点,但是它们在合成6-氰基吡啶时使用昂贵的钯-碳催化剂,增加了合成的成本。本文根据6-氰基吡啶-3-甲醛的化学结构特点,参考有关文献^[5-8]方法,设计了以对甲苯腈为起始原料,经混酸硝化、*N,N*-二甲基甲酰胺二甲基缩醛(DMFDMA)缩合、RaneyNi-水合肼还原环化先合成6-氰基吡啶,再与三氯氧磷和*N,N*-二甲基甲酰胺经Vilsmeier反应,合成了6-氰基吡啶-3-甲醛的工艺路线。该路线对合成条件无特殊要求,操作简便,成本低,产品总收率达57%。合成工艺路线如下:

X4型显微熔点测定仪(北京第三光学仪器厂,温度计未校正);TOEFL-90Q型核磁共振仪(日本电气公司),内标TMS;IR-435型红外光谱仪(日本岛津公司)。

对甲苯腈、浓硝酸、浓硫酸、*N,N*-二甲基甲酰胺、80%水合肼、甲醇、氢氧化钠均为工业品;DMFDMA参照文献[9]方法制备,其它试剂均为市售化学纯。

在50 mL三口烧瓶中,加入20 mL 95%浓硫酸,冷却下加入4.7 g(0.04 mol)对甲苯腈,加毕,搅拌20 min,1 h内滴加4.0 g发烟硝酸,继续搅拌30 min,将混合物缓慢倒入80 mL冰水中,有固体析出,过滤,滤饼水洗至中性,经乙醇水溶液重结晶,得4-甲基-3-硝基苯腈(I)白色结晶6.2 g,收率为95.7%,mp 101~102℃(文献值^[10] mp 102~103℃)。

在N₂气保护下,在三口烧瓶中加入4.9 g(0.03 mol)4-甲基-3-硝基苯腈、5.46 g(0.045 mol)DMFDMA和30 mL DMF,在135℃反应4 h(TLC跟踪),减压蒸出DMF及过量的DMFDMA,得β-(*N,N*-二甲基基)-4-氰基-2-硝基苯乙炔(II)(II)6.2 g,无需精制,可直接用于下一步反应,收率为95.4%。

在三口烧瓶中,加入6.1 g(0.028 mol)上述缩合物(II),50 mL甲醇和15 g水合肼以及0.5 g Raney-Ni,在45℃反应4 h后过滤,滤饼用10 mL甲醇洗涤2次,合并滤液,倒入250 mL冰水中,用50 mL甲苯

萃取3次,将甲苯层水洗至中性,无水硫酸钠干燥后,减压蒸除部分甲苯,冷却,得2.9 g 6-氰基吲哚(III)白色结晶,收率为72.5%, mp 128~129 °C(文献值^[4] mp 128~129 °C)。

在50 mL三口烧瓶中,加入7.2 mL *N,N*-二甲基甲酰胺,冷却至0~5 °C,滴加1.1 mL 三氯氧磷,滴加完毕后,继续在此温度下搅拌20 min,滴加2.9 g(0.02 mol) 6-氰基吲哚和3.0 mL *N,N*-二甲基甲酰胺的溶液,控制温度不超过10 °C,滴加完毕后,室温搅拌1 h,将混合物倒入60 mL冰水中,用氢氧化钠调节pH为7~8,然后加热回流20 min,冷却得6-氰基吲哚-3-甲醛(IV)浅黄色针状结晶物3.0 g,收率为87.0%, mp 242~244 °C。¹H NMR(DMSO-*d*₆) δ: 12.29(br s, 1H, NH), 9.98(s, 1H, CHO), 7.41~8.24(m, 4H, indole-H)。IR(KBr)测定结果表明,在3 464 cm⁻¹处属吲哚环上N—H的伸缩振动峰, 2 224 cm⁻¹处属吲哚环上氰基(C≡N)伸缩振动峰, 1 749 cm⁻¹处属吲哚环上醛基(C=O)的伸缩振动峰, 815、759和703 cm⁻¹处是由吲哚环上的六元和五元环所产生的取代模式的振动峰。元素分析结果(计算值)/%: C 70.57(70.59), H 3.54(3.53), N 16.45(16.47)。

结果与讨论

本文在6-氰基吲哚-3-甲醛的合成过程中,关键是6-氰基吲哚和6-氰基吲哚-3-甲醛的合成,因此我们在讨论时,只涉及这部分的讨论。

在吲哚环的环合过程中,文献报道主要有3种方法(1)铁粉-冰醋酸还原环合^[11](2)钨-碳催化加氢还原环合^[4](3)RaneyNi-水合肼还原环合^[5]。本文对3种还原剂进行对比研究,发现用RaneyNi-水合肼作为还原剂时,效果最好。该还原剂在合成6-氰基吲哚时未见文献报道。采用Fe-HOAc、Pd/C-H₂、RaneyNi-hydrazine为还原剂,合成6-氰基吲哚的收率分别为67%、65%和72.5%。

由于合成6-氰基吲哚是放热反应,因此,反应温度对反应结果有着很大的影响。本文考察了反应温度对反应结果的影响,发现温度在45~50 °C时比较适宜。其结果见表1。

表1 温度对反应结果的影响

Table 1 Effect of the temperature on the reaction yield

Temperature/°C	30	35	40	45	50	55
Yield/%	62	67	69	73	73	71

在合成6-氰基吲哚时,反应时间对反应结果也有着一定的影响。本文对反应时间进行了研究考察,反应时间控制在4~5 h时最佳。其结果见表2。

表2 反应时间对反应结果的影响

Table 2 Effect of the reaction time on the yield

Reaction time/min	1	2	3	4	5	6
Yield/%	58	62	71	73	72	73

在Vilsmeier反应中,DMF既作为反应物,又作为溶剂,所以它的用量对整个反应有着一定的影响。本文通过实验发现,按文献[8]的DMF用量在反应过程中会发生固化,使得反应不完全,而当DMF和6-氰基吲哚的摩尔比为8:1~10:1时,反应混合物不会发生固化现象,反应也比较充分,收率可达87%,当DMF的用量再增加时,对反应结果基本没有影响。其结果见表3。

表3 DMF用量对反应结果的影响

Table 3 Effect of the DMF amount on the reaction

<i>n</i> (DMF): <i>n</i> (6-cyanoindole)	Yield/%	Appearance*	<i>n</i> (DMF): <i>n</i> (6-cyanoindole)	Yield/%	Appearance*
6:1	78	Solid	12:1	87	Clear solution
8:1	85	Paste	14:1	86	Clear solution
10:1	87	Clear solution			

* Appearance of the reaction mixture.

对反应结果有影响的另一个因素就是氢氧化钠的用量问题。通过对6-氰基吲哚-3-甲醛的化学结构特点的分析,由于在吲哚环连接1个氰基,而氰基对碱是敏感基团,这就使得在反应中对氢氧化钠的用

量有所要求。本文对氢氧化钠的用量进行了考察,发现当氢氧化钠和6-氰基吲哚的摩尔比为1.2:1时,反应比较充分,收率也比较高。反应结果见表4。

表4 氢氧化钠用量对反应结果的影响

Table 4 Effect of the NaOH amount on the reaction yield

$n(\text{NaOH}) : n(6\text{-cyanoindole})$	0.9:1	1.0:1	1.1:1	1.2:1	1.3:1	1.4:1
Yield/%	79	81	85	87	83	75

在该反应中,由于水解反应的反应速度比较快,所以回流反应时间的长短对反应的结果也是有一定的影响。本文对回流反应时间进行了考察,发现当回流时间在20 min时收率最高。其结果见表5。

表5 回流反应时间对反应结果的影响

Table 5 Effect of the reflux time on the reaction yield

Refluxing time/min	5	10	15	20	25	30
Yield/%	76	81	84	87	87	84

参 考 文 献

- 1 Acheson R M, Vernon J M. *J Chem Soc [J]*, 1962 : 1 148
- 2 Sall D J, Arfsten A E, Bastian J A, et al. *J Med Chem [J]*, 1997 **40** : 2 843
- 3 Ikan R, Rapaport E. *Tetrahedron [J]*, 1967 **23** : 3 823
- 4 Batcho A D, Leimgruber W. US 3 976 639 [P] , 1976
- 5 Batcho A D, Leimgruber W. *Org Syn [J]*, 1985 **63** : 214
- 6 Gribble G W, Saulnier M G, Obaza-Nutaitis J A, et al. *J Org Chem [J]*, 1992 **57** : 5 891
- 7 WANG Guo-X(王国喜), PENG Cong-Hu(彭聪虎). *Chin J Appl Chem(应用化学) [J]* 2002 **19** : 1 014
- 8 James P N, Snyder H R. *Org Syn [J]*, 1961 **39** : 30
- 9 ZHANG Hai-Feng(张海峰), LI Yuan(李媛), WANG Zhao-Yu(王昭煜). *Chem Reagent(化学试剂) [J]*, 1990 , **12** (2) : 125
- 10 Adachi K, Aoki Y, Hanano T. US 6 455 528 [P] 2002
- 11 Kawase M, Sinhababu A K, Borchardt R T. *J Het Chem [J]*, 1987 **24** : 1 499

Synthesis of 6-Cyanoindole-3-carboxaldehyde

GE Yu-Hua*, WU Ya-Ming, XUE Zhong-Jun

(Department of Chemistry & Chemical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096)

Abstract Intermediate 6-cyanoindole was obtained from 4-methylbenzotrile as a raw material *via* nitration with the mixed acid, condensation with *N,N*-dimethylformamide dimethyl acetal and cyclic reaction with Raney nickel-hydrazine. 6-Cyanoindole-3-carboxaldehyde was synthesized *via* the Vilsmeier reaction of 6-cyanoindole with *N,N*-diethylformamide and phosphorus oxychloride. The structure of the target compound was confirmed by ¹H NMR, IR and elemental analysis. The total yield was 57% and the purity of the final product reached 99.4%.

Keywords cyanoindole, cyanoindolecarboxaldehyde, synthesis