

# (研究简报)

## 我国黄虻亚属(*Subgenus Ochrops* Szil.)的种类和分布(*Tabanus*, *Tabanidae*, *Diptera*)

On the subgenus *Ochrops* (Gen. *Tabanus*, *Tabanidae*, *Diptera*) from China

刘 维 德

Liü Wi-ten

(中国科学院昆虫研究所上海工作站)

Entomology Institute of Academia Sinica

### 一、序 言

黄虻亚属 (*Subgenus Ochrops* Szil.) 隶属双翅目的虻科虻属 (*Tabanus*, *Tabanidae*), 主要分布于旧北区, 已知约30余种, 本亚属虻类具有以下几个特征; 1. 体色黄绿、灰黑或近金黄色; 2. 复眼中部有一条显著而细窄的黑带; 3. 额板(Callus)一般不大, 中额板(middle callus) 与之远离, 额板和中额板的轮廓常不固定; 4. 触角各节都呈黄色; 5. 盾片无纹饰; 6.  $r_4$  脉皆有附枝。本亚属的虻类中有几种在我国极为常见, 数量很多, 常成羣攻击家畜, 因此极具经济上的重要性。但由于这个亚属的种类形态区别不大, 特征又常有变异, 所以在分类的文献上一向混乱很大。前人如 Ricardo (1911), Szilady (1915), Kôno 及 Takahasi (1939) 以及 Ouchi (1943), Takagi (1941) 等皆曾就我国黄虻亚属的分类和鉴定问题作了许多报告和讨论。总结他们的文献我国黄虻亚属共有9种, 即: *Tabanus (O.) fulvus* Mg., *Tabanus (O.) ditaeniatus* Macq., *Tabanus (O.) bivittatus* Mats., *Tabanus (O.) plebejus* Fall, *Tabanus (O.) aethereus sibiricus* Ols., *Tabanus (O.) miser* Szil., *Tabanus (O.) pallitarsis* Ols., *Tabanus (O.) rusticus* L., *Tabanus (O.) karybenthinus* Szil., 其中前2种据记录分布华东及华中, 很多年来大家都认为是我国的常见种类, 后6种分布于东北北部, *T. (O.) bivittatus* 则台湾和东北都有分布。但文献上对这些种类的形态描述往往同一种类互相矛盾, 或不同的种类又互

相雷同。作者为了澄清这一问题, 近年来研究了中国科学院昆虫研究所收藏的大批这类标本, 其中一些并送请苏联 H. Олсуфьев 教授鉴定。H. Олсуфьев 教授又赠送了作者一批苏联这一亚属的标本, 因此作者乃得对我国这一亚属的分类作较全面的研究。结果发现前人所记我国的黄虻种类颇多错误, 因此特就我国黄虻的种类和分布问题写成此文供作参考。

### 二、我国黄虻亚属名录

根据作者的材料我国黄虻亚属确实可信的种类有以下9种:

*Tabanus (O.) aethereus sibiricus* Ols, 1936

Олсуфьев: 1936. пар. сбo. зоол. Ин. Ак. Наук СССР. 6: 236.

分布 黑龙江: 孙吴

*Tabanus (O.) agrestis* Wied 1828

Wied.: 1828. Ausser. Zweifl. Ins., 1: 557.

分布 新疆: 艾叶湖, 乌鲁木齐; 内蒙古: 兴安岭, 满洲里, 博克图, 綏芬河, 额济纳旗。

*Tabanus (O.) bivittatus* Mats 1916

Mats. 1916: 新日本千虫图解 2: 83。

分布 南京; 上海; 陕西: 南五台山; 浙江: 舟山、温州; 江苏: 新海连市。

*Tabanus (O.) miser* Szil. 1915

Szil. 1915. Ent. Mitt., 4: 103

分布 黑龙江: 齐齐哈尔, 綏芬河, 高岭子; 新疆: 精河、和丰; 青海: 西宁、噶尔穆、海馬、大柴旦;

內蒙古：扎兰吞、博克图；山西：崞县；北京；陝西：西安；山东：青島、济南；天津；江苏：鎮江、苏州；上海；安徽：安庆；浙江：杭州、天目山、金华、乍浦、舟山；江西：南昌、九江；湖南：衡阳、岳阳。

*Tabanus (O.) pallitarsis* Ols. 1936

Олсуфьев 1936. пар. сбo. зоол. Ин. Ак. Наук. СССР. 6: 236

分布 北京；

*Tabanus (O.) plebejus* Fall. 1817

Fall. 1817: Dipt. Succ., Taban. p. 8

分布 黑龙江：孙吳。

*Tabanus (O.) pulchellus pulchellus* Lw. 1858

Loew. 1858: Verh. Zool.-bot. Ges. Wien., 3: 597

分布 陝西：榆林。

*Tabanus (O.) pulchellus karybenthinus* Szil. 1915

Szil. 1915. Ent. Mitt., 4: 103

分布 新疆：庫尔勒、庫車、庫米什、石河子、沙湾；陝西：榆林；黑龙江：孙吳、阿城。

*Tabanus (O.) rusticus* L. 1767

Linne: 1767. Syst. Nat., 2: 1000.

分布 北京；甘肃：天祝；內蒙古：博克图；黑龙江：孙吳。

### 三、常見种記

*Tabanus (O.) agrestis* Wied. (图 2)

♀ 13—16 毫米本种的主要鑑定特征为較淺淡的体色，黄色的腿节和腹部背板 4 条連續的显著黑带。但就我国的标本和苏联哈薩克斯坦共和国产的标本比較看来，后者体色更近灰白，腹部黑带也更显著。我国的标本則多少与 *T. (O.) miser* 近似，尤其分布于我国南方的 *T. (O.) miser* 有些腿节也全是黄色，因此更难区别。在我国腹部有 4 条縱黑带的黄虻中，除本种外还有 *T. (O.) pulchellus karybenthinus*，但 *T. (O.) pulchellus karybenthinus* 的鬚鬚較短，复白毛，*T. (O.) agrestis* 的較长，复黑白毛夹杂，*T. (O.) pulchellus karybenthinus* 的触角第 3 节第 1 环节較长，背緣无显著突角，而 *T. (O.) agrestis* 的較短，有显著突角，另 *T. (O.) pulchellus karybenthinus* 后脑具长毛，自头部前面看来显著可見，*T. (O.) agrestis* 則仅具短毛，从头部前面看来不甚可見。

Ricardo 氏 (1911) 曾认为我国威海卫分布有 *T. (O.) ditaeniatus* Macq. 后来 Ouchi 氏 (1943)

也把上海、江西、湖南产的黄虻統定名为 *T. (O.) ditaeniatus*。早在 1925 年和 1939 年 Kröber 氏曾一再指出 *ditaeniatus* 即 *T. (O.) agrestis* 的异名。就 Н. Олсуфьев 教授贈送作者苏联的 *agrestis* 标本和我所有黄虻标本对照看来，則只有新疆、內蒙等地有少数不多的分布。

*Tabanus (O.) bivittatus* Mats. (图 1)

♀ 13—16 毫米黄綠色种。本种以其腹部背板沒有黑条紋和兩側 1—3 或 1—4 节具大的橙色斑而易于識別。但与 *T. (O.) horvathi* Szil 和 *T. (O.) fulvus* Mag. 仍很近似，*T. (O.) fulvus* 以其体色更呈黄色，触角第 3 节第 1 环节极为寬短以至長寬約略相等和額板 (callus) 分离为兩小点仍易与本种区别。至于 *T. (O.) horvathi*，Takahasi 氏的意见认为它的盾片毛金黄色可与本种的灰白色区别，作者曾把一批日本产的 *T. (O.) horvathi* (Takahasi 氏鑑定) 标本和苏联的 *T. (O.) bivittatus* (海参威产) 以及我国标本对照研究，发现日本的 *horvathi* 的胸側片 (Notopleura) 上主要着生乳白色长毛，而苏联和我国各地的标本都主要着生黑毛，鑑定还是較容易的。本种和 *T. (O.) miser* 的一些个体也有些近似，作者发现 *T. (O.) bivittatus* 腋瓣上的一撮毛呈金黄色，而 *T. (O.) miser* 的無論它体色如何变化都呈乳白色，依据这一特征仍可把 2 种分开。

*Tabanus (O.) miser* Szil. (图 6)

♀ 12—15 毫米黄綠色种，本种的主要特征为腿节黄色基部 1/4—1/3 灰黑色，但有些标本也全部黄色，多数标本触角第 3 节第 1 环节背緣鈍突在近基部 1/3 处，长度約为寬度 1 1/2 倍强，側片毛乳白色，腋瓣上的一撮毛無論体色如何变化皆呈乳白色。腹部背板或有 2 条不显著的縱黑紋，兩側橙色斑痕显著或不显著。

就作者所見的标本看来，我国各地的最常見黄虻都屬此种。前人所称我国常見黄虻如 *T. fulvus* 或 *T. ditaeniatus* 都可能是此种的誤訂。Н. Олсуфьев 教授在鑑定了作者寄送給他的我国各地黄虻标本后，也认为大都是属于 *T. (O.) miser*。当然象 *T. (O.) miser* 这样分布极广的种类形态上常有地区的变异是极可能的。我們在鑑定时必须給以应有的注意。

*Tabanus (O.) pallitarsis* Ols. (图 8)

♀ 11—13 毫米灰黑色小型种。前額基部較頂端稍寬或大致平行，高度为基部寬度 3—3 1/2 倍。

腹部背板中央有寬約占腹部 1/3 的縱黑帶，一些标本黑帶中央有一些灰毛形成不显著的条紋，但很多标本也不具此特征。兩側 1—4 或 1—5 节橙色。

*Tabanus (O.) pulchellus pulchellus* Lw. (图 4)

*Tabanus (O.) pulchellus karybenthinus* Szil.

(图 3,7)

H. Олсуфьев 氏指出这 2 种的主要特征为后脑具长毛，自头部前面观之显著可見。但因收藏的标本常有损坏，同时即使后脑只具短毛的种来自头部前面观之仍可看見一些毛露出，所以作者认为不如其顎鬚的粗短(长度約为直径 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>倍)和仅复白毛以及触角第 3 节第 1 环节长度約为寬度 1 倍和沒有背緣鈍突的特征来作为識别的依据较为准确可靠。

这 2 个亚种的区别仅在于 *T. (O.) pulchellus pulchellus* 的腹部每节黑斑远未达到后緣，*T. (O.) pulchellus karybenthinus* 則都达到，就国外分布来说前者分布于非洲、中亚洲、塔什干，哈薩克斯坦南部，后者分布于哈薩克斯坦中部，北部和蒙古等地，我国主要分布的都是后者，前者只有 2 个在榆林采集时发现的。

*Tabanus (O.) rusticus* L. (图 5)

12—15 毫米中型种，体色黃綠富黑色。H. Олсуфьев 氏曾指出本种触角第 3 节第 1 环节背緣鈍突近中部，以此来和 *T. (O.) miser* 分別，但就我国的标本观察，鈍突在中部的固占多数，但或近基部 1/3 处的为数不少。本种最主要的特征为腿节全部或最少 2/3 黑色。腹部背板或有 2 条或 4 条等不显著的黑色纵帶。

#### 四、中国黄虻亚属已知


##### 种类检索表(♀♀)

- 1(4) 眼显著被毛，前額高度为基部寬度 3 倍以下
- 2(3) 腹部背板灰黑色无紋飾 ..... *T. (O.) plebejus* Fall.
- 3(2) 腹部背板第 1 或 1—3 节有黃斑.....  
.....*T. (O.) aethereus sibiricus* Ols.
- 4(1) 眼无毛。

- 5(10) 腹部有 4 条显著連續或不連續的縱黑帶，胸部盾片色近灰白或微黃綠近灰白。
- 6(9) 顎鬚粗短，长度为最粗处直径 2.5 倍，复白色毛，触角第 3 节第 1 环节长度为寬度 1 倍，背緣无显著的突角，后脑毛甚长，自头部前面观之显著可見。
- 7(8) 腹部背板每节黑点皆达到或近于远端.....  
.....*T. (O.) pulchellus karybenthinus* Szil.
- 8(7) 腹部背板每节黑点皆不达到远端 .....  
.....*T. (O.) pulchellus pulchellus* Lw.
- 9(6) 顎鬚較細长，长度約为最粗处直径 3 倍强，复黑白毛夹杂参半，触角第 3 节第 1 环节长度为寬度 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>倍，背緣有显著的鈍突，后脑毛甚短，自头部前面观之不甚可見.....  
.....*T. (O.) agrestis* Wied.
- 10(5) 腹部无 4 条显著縱黑帶，偶或有 2 条很不显著的黑帶，胸部盾片黃綠色、黃色、或近灰黑色，但絕不近灰白色。
- 11(12) 小型 10—12 毫米种，体色灰黑，多数标本前額基部較頂端稍寬，但也有些是兩側平行，腹部背板具中央 1/3 寬黑帶，黑帶中部或具一些灰毛，形成不显著的灰縱紋.....  
.....*T. (O.) pallitarsis* Ols.
- 12(11) 中型种一般体长 14—16 毫米体色黃綠或灰黃或略近灰黑色，前額兩側皆大致平行，腹部背板或沒有任何条紋，或具 2 条极不显著的条紋，但絕无任何縱寬黑帶。
- 13(14) 黃綠富黃色种，腹部背板无任何黑縱紋，兩側有大块橙色斑，翅脉和胸部側片的毛都較富黃色，腋瓣上的一撮毛肯定呈金黃色.....  
.....*T. (O.) bivittatus* Mats.
- 14(13) 黃綠色种，腹部背板大皆具 2 条不甚显著的黑縱紋，兩側的橙色斑較小或不显著，翅脉和胸部側片的毛較呈淡黃色，腋瓣上的一撮毛肯定呈乳白色。
- 15(16) 足腿节基部至少 3/4 以上黑色 .....  
..... *T. (O.) rusticus* L.
- 16(15) 足腿节基部仅 1/3—1/4 黑色或全部黃色 .....  
..... *T. (O.) miser* Szil.

## 参 考 文 献

- [ 1 ] Олсуфьев Н.: 1937. Степная фауна СССР. 7 (2), м-л.
- [ 2 ] Kröber O.: 1925. Lindner 19, Tabanidae.
- [ 3 ] Kröber O.: 1938. Katalog der palaearctischen Tabaniden nebst Bestimmungstabellen und Zusätzen zu einzelnen Arten sowie neubeschreibungen. *Act. Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis*, 2: 57—245.
- [ 4 ] Ouchi Y.: 1943. Diptera sinica Tabanidae IV. Notes on some Tabanid flies belonging to the subfamilies Tabaninae and Bellardiinae from East China. 上海自然科学研究所彙报, 13: 505—552.
- [ 5 ] Ricardo G.: 1911. A revision of the species of *Tabanus* from the Oriental region, including notes of species from surrounding countries. *Rec. Ind. Mus.*, 4: 111—255.
- [ 6 ] Shiraki T.: 1918. Blood-sucking insects of Taiwan, I Tabanidae, pp. 1—442.
- [ 7 ] Szilady Z.: 1915. Subgenus *Ochrops*, eine neue Untergattung der Gattung *Tabanus* L. 1761 (Dipt.). *Ent. Mitt.*, 4: 93—106.
- [ 8 ] Takagi Saburo: 1941. Tabanidae of North Manchuria. *Rep. Inst. Horse-Dis. Inst. Sci. Res. Manchuria*. 2: 1—94.



图版 I 說明

- 1. *T. (O.) bivittatus* 的腹部背板;
- 2. *T. (O.) agrestis* 的腹部背板;
- 3. *T. (O.) pulchellus karybenthinus* 的腹部背板;
- 4. *T. (O.) pulchellus pulchellus* 的腹部背板;
- 5. *T. (O.) rusticus* 的前額(左), 顎鬚(右), 触角

(下);

- 6. *T. (O.) miser* 的前額, 触角和顎鬚;
- 7. *T. (O.) pulchellus karybenthinus* 的前額, 触角, 顎鬚;
- 8. *T. (O.) pallitarsis* 的前額, 触角, 顎鬚。