

HOCM常发生猝死，特别易发生于20岁或20岁以下年轻的病人。猝死常发生于剧烈活动后。心律失常可能是猝死原因之一。

HOCM的治疗主要包括心得安和外科手术。外科手术是改善临床和血液动力学最有效的方法。心得安虽有疗效但不能阻止疾病的进展，症状常有反复。钙的抑制剂——异搏停（Verapamil）是目前治疗该病的有希望的药物，治疗剂量为第一周80mg一日三次，第二周160mg一日三次，数月以后增加到120mg一日六次，无明显不良反应。

〔中华心血管杂志9（3）：222，1981〕

原发性心肌病心电图分析

（一）充血型心肌病82例

附属第二医院内科 陈端 胡雅明 钱仪贞 张美芳
指导 赵易

本文对82例原发性充血型心肌病心电图作一分析报道。男56例，女26例，年龄14～60岁，平均39.1岁。心电图表现特点：（1）各种类型心律失常72例（87.8%），心律失常不但多见，而且具有多样性与易变性，同一病例可以有多种心律失常同时存在，短期内有较大变动；（2）心房肥大15例（18.2%）、心室肥大40例（48.8%），均以左侧病变为重；（3）低电压12例（14.6%）、异常Q波7例（8.5%）、ST—T改变58例（70.7%）、Q—Tc间期延长14例（17.1%）。本文结合心电图对本病诊断价值以及额面心电图对本病观察意义进行了分析讨论。认为心电图改变并非充血型心肌病所特有，诊断必须首先排除由其他心脏病及继发性心肌病所引起，且必须结合X线和超声心动图检查发现心脏增大，尤其是普遍性增大才可以确诊。

原发性心肌病心电图分析

（二）肥厚型心肌病32例

附属第二医院内科 陈端 胡雅明 刘富光 钱仪贞 张美芳
指导 赵易

本文对32例原发性肥厚型心肌病心电图作了分析报道。男23例，女9例，年龄11～55岁，平均34.6岁。心电图表现以心室肥大（59.4%）、ST—T改变（62.5%）最为多见，尤以左室肥大及/或劳损为主要变化。心律失常（50%）中较多表现传导障碍，特别是束支、分支传导阻滞及预激综合征，而节律改变较少。最有特征性的是出现异常深的