

东亚飞蝗生殖的研究：去势和交尾 在生理上的效应*

郭 郊

(中国科学院昆虫研究所)

一、前 言

在高等脊椎动物中，已有充分实验根据，证明生殖腺是重要的内分泌器官之一，能分泌性激素而影响有机体的某些器官机能与发育。但在昆虫中，有无性激素的存在，至今尚缺少肯定的结论。许多实验结果表明，昆虫内生殖器官的摘除（人工去势），对昆虫的性行为及第二性征的发育毫无影响。例如在舞毒蛾 *Lymantria* (Oudemans, 1899; Meisenheimer, 1904)、家蚕 *Bombyx mori* (Kellogg, 1904; Hamasaki, 1932)、蟋蟀 *Gryllus* (Regan, 1910)、沙蝗 *Schistocerca* (Husain & Bawaja, 1936)、*Polistes* (Deleurance, 1948)、*Gastropacha*、*Oxya*、*Euproctis* (Meisenheimer, 1904) 等昆虫去势后皆系如此。除去上述由胚后发育期施行手术所得结果外，Geigy (1931) 用紫外线照射果蝇 *Drosophila* 卵胚胎发育期中的极细胞，以致未来生殖细胞完全不能发育情况下，成虫的性征也不受影响。

最近十余年内昆虫内分泌研究进展很快，但 Hanström (1939)、Scharrer (1948, 1953)、Pflugfelder (1952)、Buddenbrock (1950)、Wigglesworth (1954)、Bodenstein (1954) 等综述了前人的研究工作，结论仍然是未能肯定昆虫生殖腺有无内分泌作用。作者在近三年内 (1955—1957) 进行了东亚飞蝗生殖腺（有时包括性附腺）的摘除实验，观察飞蝗成虫期在生殖腺摘除后有何特异表现，以便进一步了解生殖腺有无内分泌作用；并将去势后雄蝗与正常雌蝗交尾，观察卵巢发育以及产卵等。同时研究交尾刺激的传递途径等问题。

二、材料和方法

东亚飞蝗系在北京室外饲养，所用虫笼由铁纱制成，大小约 $50 \times 50 \times 50$ 厘米。每笼放入一定数目的跳蝻，以玉米作主要饲料。

在 5 龄跳蝻期或羽化 1—2 日成虫进行生殖腺摘除手术。先将蝗虫放在乙醚麻醉器内，历时 5—15 分钟，使其麻醉。在虫体腹侧 5—6 节之间用 $1/1000 HgCl_2$ 消毒，用剪刀剪开一口，再用细镊子仔细取出生殖腺，伤口用石蜡封好。经手术后的蝗虫宜善加照顾，所用剪刀等器械均事先消毒。去侧体手术见作者另一报导。

* 本试验承欽俊德先生指导并审阅全文，刘崇乐先生修改文稿，特此一併致谢。

三、去势对于性行为、体内储存物、以及性附腺发育的影响

东亚飞蝗雌虫的生殖系统包括一对输卵管、卵巢（顶端为附腺）、受精囊及其通至阴道的受精囊管，以及许多排列在输卵管内侧的卵小管。雄蝗有一对互相并拢的睾丸、输卵管、一个储精囊，以及互相缠绕的两种性附腺。卵巢及睾丸均位于腹部消化道的背面，而雌雄性附腺均在消化道腹面。故进行去势时，不能伤害消化道。

在正常饲养情况下，雌蝗在羽化后7—10天即进行交尾，雄蝗在羽化后5天内即表现交尾活动。交尾后7—10天雌蝗可产下第一块卵块，以后每隔4—8天产卵一次。

为了观察正常与去势蝗虫有无差异，故进行性行为（主要以交尾活动来判断）、体内脂肪及体液以及性附腺外形发育的比较。

1. 交尾 飞蝗的交尾甚易判断，到了性成熟期，雄蝗跃登雌蝗背上，拥抱雌蝗，雄蝗将腹部弯在雌蝗腹侧下方，将雄外生殖器插入雌蝗腹端外生殖孔中。

在观察生殖腺摘除后对交尾影响的试验中，有的将生殖腺及性附腺一并摘除，有的只移去其中的一种。下表系用羽化1—2日成虫作材料，进行去势，待创伤恢复后，即放入同数、同年齡的异性蝗虫。结果如下：

表1 成虫去势后交尾的状况

类 别	性 别	累 計 个 数	交尾状况：(+)交尾，(-)不交尾
摘去卵巢	♀	120	+
摘去睾丸	♂	150	+
摘去性附腺	♀	50	+
摘去性附腺	♂	50	+
摘去卵巢及性附腺	♀	20	+
摘去睾丸及性附腺	♂	20	+
正常对照	♀ × ♂	150	+
创伤对照	♀ × ♂	40	+
摘去部分卵巢	♀	50	+
摘去部分睾丸	♂	50	+

从数年多次试验证明，在羽化后1—2日成虫摘去生殖腺或性附腺，对雌、雄交尾的性行为并无影响。摘去部分的卵巢或睾丸的蝗虫，同样地有交尾的动作。经过手术处理后飞蝗的交尾前期，较正常的略迟，这大概是由于创伤的影响。去势后蝗虫的交尾次数也无特异现象。

除了进行成虫去势的试验外，同时也将5龄蝗蝻的生殖腺摘去，待羽化后观察其交尾情况。结果如下：

表2 5龄蝗蝻去势后交尾的状况

类 别	龄 期	性 别	累 計 翱 蜡 数	蜕皮后虫态	交 尾 状 况
摘去卵巢	5	♀	80	成虫	+
摘去睾丸	5	♂	80	成虫	+

从这些結果表明，5 齡蝗虫摘去生殖腺后，再蛻一次皮仍变为成虫，隔一定時間后同样地有交尾活动。摘去生殖腺的飞蝗，羽化期較正常对照稍为向后延迟数日。由此可知，飞蝗生殖腺摘去后，并不改变随后的发育及交尾活动。

2. 摘去生殖腺后飞蝗体重增长的变化 依据数年的觀察及試驗，正常生长的飞蝗及摘去咽側体的雌蝗，自羽化后体重皆有逐步增长的趋势。所不同的是前者卵巢能生长发育，到了产卵期，体重因产卵而稍有減輕，随后又向上增加；而后者卵巢不能生长发育，但脂肪体有过分长大的情况，体重只增加到某一程度后，始終保持不增不減状态，直到死亡。飞蝗生殖腺摘去后，体重是否增长？增长情况与上述两者有无差异？作者用 5 齡及成虫摘去生殖腺，比較体重增长与正常生长的体重有无异同。在三年重复數次試驗中，均发现摘去生殖腺的雄蝗，不論交尾与否，体重增长方面与正常雄蝗并无差异。但在摘去卵巢的雌蝗方面，体重增长表現頗為特殊。正常雌蝗在羽化后 15 天（交尾 7 天后）体重可达 2 克以上，产去卵块后体重又下降到 2 克以下，但 3、4 天后体重又恢复到 2 克，如此循环上下，始終保持一定水平。摘去卵巢的雌蝗，遇到雄蝗仍有交尾活动，但其体重逐渐随年龄而增长，統計去势后交尾的雌蝗，在羽化 2 月后，体重可达 3 克，个别的可达 3.2 克，这一数据超过数年内正常雌蝗体重的記錄。另外，在試驗进行中均以孤雌生殖的雌蝗体重增长作比較，而这一类雌蝗体重增长非常緩慢，30—50 天以后方达到 2 克，开始产卵。去势雌蝗到了生活后期，身体臃肿肥厚，腹部特別膨大，解剖后体内充滿了黃色体液。去势雌蝗如不与雄蝗交尾，在体重增长方面就不及去势又交尾的那样多。从这些試驗證明卵巢本身对体重增长的影响較少，在缺乏卵巢而获得交尾机会时，体重增加較同年龄正常而交尾的特多。更可惊异的，摘去生殖腺后，在体重增长方面仍表現雌雄性別的特异性。并且，仅交尾的刺激，对体重增加有显著的影响。

去势后雌蝗在生活期間取食及其他活动习性与正常的并无差异。寿命方面也不現出特异的情况。只是雌蝗身体肥大，雄蝗体表顏色現黃。

去势雌蝗新鮮体重的变化与正常的及孤雌生殖的比較如图 1。




图 1 去势雌蝗和正常雌蝗及人工强迫孤雌生殖的体重比較

除去比較新鮮体重方面的变化外，还比較了身体干重的变化有无不同。一方面觀察身体干重的增长，另一方面还比較身体的含水量，以便了解去势雌蝗的水分代謝与正常的是否表現出差异。将去势的、正常的、孤雌生殖的雌蝗依年龄不同，取出一定头数，称取新鮮体重后，放入干燥箱中烘干，求得其干重。結果比較如图 2。

所得結果表明去势后交尾的雌蝗身体的干重亦有增长情况。例如生长到 64 天的去势交尾雌蝗，平均干重可达 1 克以上。去势雌蝗体内含水量不論年龄，始終保持在 65% 左右，

并无特別变化。但同年龄的正常雌蝗，平均干体重只有 0.7 克，孤雌生殖的体重变化同正常的近似。后两者体内含水量皆 60—65% 之間，三者距离非常接近。这样就初步証明去势交

尾的雌蝗身体干重皆較同年龄正常交尾的及孤雌生殖的为高，而水分代謝并无差异。

3. 去势对脂肪体及体液的影响 大多数昆虫的脂肪組織成网状分散于身体各处，本身形状既不十分規則，又复厚薄不一，往往不易計量，东亚飞蝗的脂肪組織也是如此。作者在另一試驗中証明：摘除东亚飞蝗咽側体后，能引起雌蝗脂肪組織在外表上有过分长大的現象，并且在組織切片上脂肪組織也表現出一定的过分长大的构造。但去咽側体后的体液較少，顏色近透明。

东亚飞蝗經人工去勢后脂肪組織及体液方面的变化与正常的及去咽側体的大为不同。Pfeiffer (1945)、Bodenstein (1953) 比較蝗虫 *Melanoplus* 与大蝶蠅 *Periplaneta* 的脂肪組織时，人为地分为几个等級。这种主觀地計量估計是有一定的差异性，但仍不失为較好方法之一。在这一試驗中也应用这种方法。在羽化数日内雌蝗的脂肪組織逐漸蓄积物质，級数是++或++十級。到了交尾期脂肪組織增大到++十或++十十級。此时卵巢内卵母細胞已沉积了一部卵黃。到了产卵期，卵母細胞已发育成行将产出的卵粒，此时脂肪組織又轉为“瘦薄”，恢复到++或+級之間。飞蝗产下卵块后1、2日内脂肪体組織迅即上升到++十十級。但随卵巢发育而下降到++級或+級，如此往复循环。值得注意的，去勢雌蝗无产卵可能，脂肪組織是身體內儲藏物质重要器官之一，但解剖不同年龄的去勢雌蝗，我們均发现脂肪組織均在++或+級，脂肪組織非常“瘦薄”。年齡愈大、愈到生活后期脂肪組織只剩下“薄片”，悬浮在濃黃的体液中。

在体液方面变化，去勢雌蝗的体液的顏色及含量也表現出特异性。去勢雌蝗的体液，尤其到了年齡老大时，充滿了体腔，稠厚，濃黃色。而正常的体液透明，黃色。去勢雌蝗年齡較老时，此种特征更为明显。有时将腹部“膨大”，現出特异外表，以致雌蝗身體臃肿肥厚，腹部延长。体液内有数量較多的白色脂肪小球。

作者在摘除咽側体与卵巢发育的觀察中，发现脂肪組織在去咽側体的成虫的生活后期仍显出非常肥厚，鑑定其級別当在++十十級左右，似过多地儲藏了物质。作者还觀察到去勢又去咽側体的脂肪組織，更是异常肥厚，級別属于++十十以上。而二者体液均是稀薄、透明，同正常的一样。

从这些試驗結果来看，去勢后雌蝗的脂肪組織非常“瘦薄”，体液浓黃、稠厚，而正常的脂肪組織表現出一定变化，体液透明。去咽側体的脂肪組織非常“肥厚”，体液并无特异表现。这些現象均与体内营养物质的貯藏与轉化有关。

4. 去勢对性附腺发育的影响 作者在另一試驗中已証明雌雄蝗虫性附腺的发育皆受咽側体分泌激素的影响。但是否因生殖腺发育遭受阻碍后以致性附腺不能发育？还是咽側体激素直接影响性附腺而不經過生殖腺？故将雌雄蝗虫生殖腺在5齡或羽化1、2日内摘除，而不触及性附腺，以便在一定時間内觀察去生殖腺后体内性附腺的发育状况。正常雌雄蝗虫性附腺在羽化后皆繼續长大，到羽化6、7日内方停止生长发育。去咽側体雌、雄




图2 东亚飞蝗去勢后体干重与正常的及強迫孤雌生殖的雌蝗体干重的比較

表 3 飛蝗體內脂肪組織的變化

類 別	年 齡	個 數	脂 肪 級 別	體 液
正常雌蝗	羽化後 1 天	10	+	顏色透明
正常交尾雌蝗	羽化後 7 天	10	+++	"
正常交尾雌蝗	羽化後 7 天	8	++++	顏色透明，淡黃色
正常交尾產卵雌蝗	羽化後 15 天	10	++	"
正常交尾產卵雌蝗	羽化後 30 天	5	++	"
正常交尾產卵雌蝗	羽化後 50 天	7	++	"
去勢雌蝗	羽化後 3 天	5	+	顏色透明
去勢交尾雌蝗	羽化後 7 天	15	++	顏色帶黃
去勢交尾雌蝗	羽化後 10 天	15	+	"
去勢交尾雌蝗	羽化後 15 天	20	+	顏色淡黃
去勢交尾雌蝗	羽化後 30 天	15	+	顏色濃黃，稠厚
去勢交尾雌蝗	羽化後 50 天	20	+	" , "
去咽側體雌蝗	羽化後 15 天	3	+++	顏色透明
去咽側體雌蝗	羽化後 30 天	2	++++	"
去咽側體雌蝗	羽化後 50 天	2	+++++	"
去咽側體又去勢雌蝗	羽化後 50 天	1	+++++	"

蝗虫的性附腺皆保留在羽化 1、2 日内状态，并不发育。在去生殖腺的试验中，雌、雄蝗虫的性附腺皆继续生长。雌蝗的性附腺本身很多弯曲，不能量出较正确的数值，而雄蝗性附腺

形状近方形，故可估计其大小。在外表上，去生殖腺雌雄蝗虫的性附腺皆比同年龄的性附腺为大。例如去生殖腺的雄蝗，生活 30 天后，性附腺的最长径为 14 毫米，最宽径为 8.3 毫米。而同年龄正常的性附腺的最长径是 11 毫米，最宽径是 7 毫米。刚羽化的雄蝗性附腺最长径与最宽径分别为 8 毫米及 6 厘米，如图 3。这可能是生殖腺摘除后，性附腺有更多的发展空间，同时又有大量营养物质供给生长之故。由此看来，性附腺的发育是与生殖腺无关，而是受激素直接影响的。



图 3 去生殖腺后雄性附腺与正常对照及

刚羽化雄性附腺的比较

1. 去生殖腺后 25 天雄蝗的性附腺；
2. 刚羽化雄蝗的性附腺；
3. 同龄(25天)对照。

四、交尾的作用（正常雌蝗与去势雄蝗的交尾）

昆虫的交尾是授精及受精的必经步骤。观察证明在许多昆虫种类中须经过交尾后，卵巢方能发育。作者已证明东亚飞蝗的交尾可促进卵巢发育成熟。正常雌蝗在性成熟期获得交尾后，于羽化后 15 天即可产下卵块。而未交尾的

孤雌生殖的雌蝗，羽化 15 天后卵巢尚停留在未发育阶段。平均须 30 日后方能产第一块卵。换句話說，卵的成熟速度較正常的延迟二倍。这些結果令人发生疑問，是否雄蝗生殖腺內有某种物质經交尾而传递与雌蝗，在雌蝗体内发生特殊作用而促进卵巢成熟？还是雌蝗本身具有某种机能經交尾刺激而引起活化，以致促使卵巢发育？在飼養时觀察到东亚飞蝗的交尾，雄蝗传递給雌蝗一个包被精子的精珠。故在正常交尾情况下，实际上同时完成两种作用：在雄蝗方面來講，交尾包括一个交尾动作（抱持、交尾等）及一个授精作用（包括传递精珠及精子）；在雌蝗方面，交尾包括一个交尾动作及儲精作用以及卵成熟时完成受精作用。在以前的研究中，东亚飞蝗在卵巢发育初期即能交尾，但未成熟卵的受精可能性較少。虽然雌蝗在卵未成熟前的交尾，不是与卵受精作用同时发生，但在正常交尾情况下，不能将交尾动作与授精作用（或儲精以及将来的受精作用）截然分开。故将雄蝗的睾丸有时連性附腺一并摘除。对創傷恢复或羽化后，放入同齡正常雌蝗。以便觀察仅有交尾动作的机械刺激作用，对卵巢的发育成熟有何影响。在試驗中特別比較了产卵前期、产卵块数、粒数、孵化率、幼蝻性别等。

在这一試驗中觀察到仅摘除睾丸的雄蝗，在交尾时仍发现有“假精珠”的传递，但連性附腺一并摘除的雄蝗，交尾时并未觀察到精珠的出現。由此看来，雄性附腺是生成精珠的器官（除精子而外）。

1. 产卵前期 正常交尾雌蝗的产卵前期，自羽化之日起計算，是 15—20 日；如以交尾之日計算，就在交尾后 7—10 日产下卵块。而孤雌生殖不交尾雌蝗的产卵前期則比較延迟，平均 30 日以上。去勢雄蝗与正常雌蝗交尾后，雌蝗仅受到去勢雄蝗的抱持与机械刺激，并无传递精珠或精子作用，但产卵前期同正常的非常接近，而与孤雌生殖的相差显著。今将二年内累計結果列于表 4。除正常雌雄交尾及孤雌生殖全数合併飼養外，去勢交尾試驗皆分別成对飼養。

表 4 正常雌蝗与去勢雄蝗交尾后的產卵前期

年代	类 别	累計雌雄数	羽化后天数					
			15 天 以前	16—20	21—25	26—30	31—35	36—40
1955 年	去睾丸♂	4 ♀ × 4 ♂	3	1	0	0	0	0
	去睾丸及性附腺♂	8 ♀ × 8 ♂	6	2	0	0	0	0
	去性附腺♂	16 ♀ × 16 ♂	16	0	0	0	0	0
	正常♂	10 ♀ × 16 ♂	10	0	0	0	0	0
	孤雌生殖	10 ♀	0	0	0	1	5	4
	乙酰麻酼♂	14 ♀ × 14 ♂	9	4	0	0	0	0
1956 年	去睾丸♂	30 ♀ × 30 ♂	0	18	8	—	—	—
	正常♂	20 ♀ × 20 ♂	2	15	3	0	0	0
	孤雌生殖	14 ♀	0	0	0	3	4	7

从上列結果可以很清楚地看到，正常雌蝗与去勢雄蝗交尾后，雌蝗的产卵前期与正常的交尾并无不同，但与不交尾而产卵的孤雌生殖的产卵前期有区别。这就証明仅仅交尾活动的机械刺激是促进卵巢发育的重要因子，这种外界刺激因素一定引起蝗虫体内的内在的因子活化，使卵巢发育过程照常进行。

除产卵前期的观察外，还注意了一部分雌蝗的产卵间距，即产出卵块的相隔时间，这样可以推算卵块的成熟速度。作者用 10 对交尾蝗虫，分别饲养结果看来，正常雌蝗与去势雄蝗交尾后，产卵间隔皆在 4—5 日之间。这种间隔与正常的并无差异。

2. 产出卵块数、卵粒数及卵的孵化率 試驗时，将正常雌蝗与去势雄蝗成对地分开饲养，并供给新鲜饲料。如集体饲养，则笼内去势雄蝗皆在年龄老大或死亡时，一一解剖检查，以保证手术完善。产下的卵块放在湿润的土壤中，放在 30℃ 恒温下发育，分别记录出卵粒数、孵出幼蝻数、未孵化卵粒数以及幼蝻性别。

在整个試驗过程中，此类雌蝗所产卵块孵化后，幼蝻均为雌性，并无雄蝗发现。而雌蝗产出卵块数与正常的没有显著差别。經两年試驗結果均是如此。現将产卵块数列于表 5。

表 5 正常雌蝗与去势雄蝗交尾后的产卵块数

年 代	类 别	♀、♂ 数	平均产出卵块数
1955	去势♂×正♀	1♀×1♂	6 块
1955	去势♂×正♀	1♀×1♂	5 块
1955	去势♂×正♀	1♀×1♂	3 块
1955	去势♂×正♀	1♀×1♂	3 块
1955	去势♂×正♀	1♀×1♂	4 块
1955	去势♂×正♀	1♀×1♂	4 块
1956	去势♂×正♀	1♀×1♂	4 块
1956	去势♂×正♀	1♀×1♂	4 块
1956	去势♂×正♀	1♀×1♂	2 块
1956	去势♂×正♀	1♀×1♂	4 块
1956	去势♂×正♀	1♀×1♂	3 块
1956	去势♂×正♀	1♀×1♂	4 块
1956	去势♂×正♀	1♀×1♂	2 块
1956	去势♂×正♀	7♀×7♂	2.5 块
1956	去势♂×正♀	6♀×6♂	4 块
1956	去势♂×正♀	10♀×10♂	3.3 块
1956	孤雌生殖	20♀	3 块
1956	正常♀、♂交尾	10♀×10♂	5 块

从记录中可以看到正常雌蝗与去势雄蝗交尾后，所产卵块平均达 4 块，最多可产 6 块，与正常的对照产出卵块数相差不大。因此可以认为授精作用的有无，对雌蝗产出卵块数并无影响。

統計了 33 块正常雌蝗与去势雄蝗交尾后所产出卵块的孵化率，最高达 52%，平均达 20%。这与孤雌生殖的平均孵化率只 0.3%，差异极大。但也与正常的平均孵化率 97% 不同。关于孵出幼蝻雌雄性别方面，交尾受精后产出幼蝻性别是雌雄接近。但未受精卵所孵出幼蝻皆为雌性，这是孤雌生殖产卵与去势雄交尾产卵两者相同的地方。

表 6 雌蝗与去势雄蝗交尾后产卵粒数、孵化率及性别

卵块数	总卵粒数	孵出幼蝗数	孵出雌数	孵化率(%)
1	80	38	38	47
1	59	31	31	52
2	85	8	8	9
1	65	3	3	4
1	45	6	6	13
1	52	8	8	15
6	261	85	85	32
2	123	32	32	24
1	58	6	6	10
1	47	3	3	6
5	230	47	47	24
2	120	20	20	16
4	183	18	18	9
2	93	16	16	17
3	107	15	15	14
合 计	1608	336	336	20

五、腹部中央神經索在卵巢发育中的作用

1. 切断神經索的試驗 交尾动作如何激动蝗虫体内卵巢的发育，以何种方式传递？腹部中央神經索是否在卵巢发育中起传导刺激的作用？故将羽化后雌蝗成虫腹神經节第2节与第3节之間神經索截断。待創伤恢复后，与正常雄蝗交尾。隔一定时间觀察卵巢发育状况。此种神經索切断的蝗虫，生长情况良好，照常交尾。解剖检查神經部分皆生长在体液内，或附着于体壁創口处，或自由地存在。惟后段神經索前端有球状突起，表現神經被切断的状况。同时检查手术后雌蝗的咽側体的大小，并記錄交尾与产卵块数。試驗进行一次，用去10个雌蝗，成活5头。下表记录了切断腹中央神經索后卵巢发育状况。

表 7 飛蝗被切断腹中央神經索后卵巢發育狀況

羽化日	手术日	雌蝗数	处理	检 查 結 果
7月21日	7月26日	10	在腹部2—3节間，切断神經索	1. 8月4日，5♀活动如常 2. 8月4日，放入4♂ 3. 8月5日，交尾 4. 8月7日，♀腹部漸膨大 5. 8月9日，1♀重2.15克，卵巢发育正常，近产。神經索两端分开，咽側体并无过分长大形状，纵径384微米 6. 8月9日，1♀重2.45克，卵巢发育正常 7. 8月20日，掘出卵4块 8. 8月25日，尚有2♂、3♀

从上面試驗来看，交尾动作刺激卵巢发育成熟，腹部中央神經索不是主要的传递途径。切断腹中央神經索后，雌蝗照常交尾、产卵，卵巢照常发育，咽側体并不过分长大。作

者曾試驗飛蝗去咽側體後卵巢即不能發育，同這一觀察比較參照起來，交尾動作的刺激仍然象是刺激全身感受器，將刺激傳入體內，激動咽側體等內分泌中心，釋放出一些激素，經由體液轉遞，再影響卵巢等器官，促使卵巢發育成熟。

2. 摘除最後腹神經節的試驗 飛蝗的最後腹神經節系腹部中央神經索上最大神經節。將羽化後1—2日雌蝗蟲的最後腹神經節摘出，隔若干時日觀察交尾、卵巢發育、性附腺發育狀況，並檢查產卵（觀察尾部膠沫是否出現，籠內卵塊等）以及體重等。共試驗雌蝗43頭，成活9頭，手術對照13頭。雌蝗被摘去最後腹神經節後，一般行為與生活現象並無特異之處，惟所排糞粒較正常的約長二倍左右，但往往留在肛門口不易排出。手術對照的（即在腹部同一處用剪剪開，不取出神經節）與正常的無差異。結果列于表8。

表8 摘除最後腹神經節後卵巢的發育狀況

手術後 天數	檢查 個數	交尾	卵 巢 發 育 狀 況	產卵	體重(克)
18	1	+	卵巢發育，卵黃已沉積；紅體出現	—	1.5
22	2	+	卵巢發育良好，卵已長大近6毫米，將近產出；附腺發育正常，阴道中有精珠。神經索切斷的一端縮起，輸卵管蠕動	—	1.65, 1.85
25	1	+	卵巢發育同上	—	2.45
39	3	+	卵巢發育同上	—	5.5(3個)
60	1	+	卵巢內發育卵聚集在輸卵管內，一側輸卵管內卵黃色，卵長5毫米；另一側卵黃黑色，卵壳扁平，紅體出現，第2小卵已發育成	—	1.5

從這一試驗結果來看，摘去最後腹神經節後，照常有交尾動作，卵巢照常發育，但已發育的卵不能產出，有被再吸收現象發生。由此可知，卵的發育與最後腹神經節無顯著的依賴關係。

六、計論

(一)

1. 昆蟲生殖腺是否能分泌性激素，尚系生物學上懸而未決的重要問題之一。Hans-tröm(1939)、Buddenbrock(1950)、Pflugfelder(1952)、Scharrer(1948, 1953)等人總結前人的工作，均未能肯定昆蟲在人工去勢後對第二性征及性行為有任何決定性影響。作者用東亞飛蝗5齡或羽化成蟲進行摘除雌雄內生殖腺、或內生殖腺以及性附腺一并摘除的試驗，經多次重複，皆觀察到手術後雌雄飛蝗有交尾的性行為。在身體顏色、壽命、生活狀況等方面與正常的並無特殊的不同。在體重增長情況上仍表現出雌雄性的特異性，即去勢雌蝗增長較多，去勢雄蝗體重並不增長。還有少數去勢蝗蟲壽命較長，顏色多近綠色。Husain與Baweja(1936)觀察到沙蝗 *Schistocerca* 生殖腺摘除後，生活狀況、壽命、身體顏色、交尾行為等與正常的無異。這兩種蝗蟲去勢結果非常相近。從試驗結果來看，內生殖腺的摘除，對東亞飛蝗性的活動與性的特異性無明顯的影響。因此，關於昆蟲生殖腺是否分泌性激素尚未能肯定。或許如Spett(1930)、Buddenbrock(1928)等所說，昆蟲的性激素可能並非由生殖腺所分泌。另一方面，在寄生性去勢與膜翅目后蜂有某種物質能抑制職蜂卵巢發育(Altamann, 1950)等現象，這些可能是解決上述問題的線索之一。

2. Pfeiffer (1945) 测定去势蝗虫 *Melanoplus* 成虫的水分含量、体干重以及脂肪酸的变化，她所得数据与正常的蝗虫并无过大差异。作者也比较了去势飞蝗成虫的新鲜体重、干重、含水量以及脂肪含量与正常对照的异同。发现去势雌蝗到生活后期身体新鲜重量可达3克以上，干重近1克，而正常雌蝗年老时最高身体重量保持在2.4克，干重0.7克。去势雄蝗与正常雄蝗体重并无不同，体重皆在1克，干重皆在0.5克左右。去势雌蝗体重增长比较显著，这由于正常雌蝗可继续产卵，身体内物质转化为卵的物质而产出，但去势雌蝗无卵巢，体内物质不能利用，而这些物质在体内不断产生，故逐渐增长体重。

最值得引人注意的，是体内物质的积累与储藏问题。脂肪组织是飞蝗体内重要储藏的器官之一。但去势雌蝗的脂肪组织似不储存大量物质，解剖去势雌蝗时，观察到脂肪组织随年龄增大而逐渐转成“瘦薄”。但脂肪组织在去咽侧体雌蝗体中随年龄增大而逐渐“肥厚”。交尾初期脂肪组织可以看作临时的储藏仓库。卵巢发育时，脂肪组织内物质大部分被动员，转变而成卵巢生长发育所需的原料。而脂肪组织中物质的“动员”与转化，主要是头部内分泌系统而来的激素起控制作用。飞蝗去势后，雌蝗体内虽然没有卵巢作为接纳者，但头部内分泌系统完整无损，不断地分泌大量激素，不断“动员”脂肪体内预先储存的物质，或后生成的物质已不适于脂肪组织储藏，而这些物质皆储存于体液内。在生活后期的去势雌蝗外表看来，身体“肥厚臃肿”，腹部伸长。体内储有大量黄色稠浓体液，体液是去势飞蝗储藏物质的基质之一。去咽侧体后，卵巢失去发育能力，脂肪组织仍然是储藏物质的中心。去势又去咽侧体的也是这样，脂肪组织“肥厚”增大，似储藏更多的物质，更可说明上述现象。今将正常的、去势的、去咽侧体雌蝗的体内物质的储藏中心及物质的转化途径图示如下：




图4 飞蝗雌性体内营养物质的储藏与转化图解。

1. 正常的； 2. 去势的； 3. 去咽侧体的； 4. 去势又去咽侧体的。

A. 内分泌中心； B. 脂肪组织； C. 体液； O. 卵巢。

加重黑圈系物质积聚中心。箭头系转化途径；虚线箭头系阻塞的途径。


3、4半环圈表示移去咽侧体的内分泌中心； 2、4的虚线圈表示移去的卵巢。

3. 许多昆虫性附腺的发育，是直接受激素的影响，并非由生殖腺起媒介作用（参看 Scharrer, 1948）。在这一试验中观察到去势的飞蝗，无论雌雄，性附腺仍照常发育长大，并且在雄蝗中性附腺有过分长大现象。这些均可说明性附腺是独立地接受激素的作用而发

育成熟，并不通过生殖腺。关于雄性附腺的功能問題：东亚飞蝗正常交尾时，是传递精珠的，在去睾丸雄蝗交尾时，仍有假精珠的释放；但去睾丸及去性附腺雄蝗交尾，就看不到精珠。由此看来，性附腺是生成精珠的主要部分（除精子而外）。

（二）

1. 东亚飞蝗羽化后，雌雄成虫生长7—10天左右即可交尾，交尾后7—10天（即羽化后15—20天）产下第一卵块，以后每隔4—6天又产第二卵块，如此繼續产卵，直到老死。东亚飞蝗能被強迫进行孤雌生殖，但在这种不与雄蝗交尾情况下，卵巢发育非常迟缓，延长到30—50天方产下第一块卵。迟延交尾的雌蝗，卵巢发育也同样延迟，作者認為交尾刺激可促进卵巢的发育成熟。但不能不考虑到交尾究竟对卵巢发育成熟起何种作用？交尾的作用通过何种机制作用而完成？东亚飞蝗交尾完成下列主要作用：①输送包含有精子的精珠入雌蝗体内（授精作用）；②交尾的动作，对雌蝗产生一些机械的刺激，这包括抱持动作的感觉触觉等刺激以及外生殖器的相互接触；③产卵时的受精作用。在摘除睾丸及性附腺后与雌蝗交尾的試驗中，去势雄蝗只完成交尾动作的刺激，并无授精等作用，这些雌蝗卵巢发育成熟与产卵同正常对照无差异，与孤雌生殖的大不相同。作者認為交尾动作刺激本身是促进卵巢发育成熟的重要因子。作者在另一試驗中証实，东亚飞蝗卵巢发育需要头部內分泌系統（如咽側体）存在情况下方能进行。雌蝗被摘除咽側体后，虽与正常雄蝗交尾，卵巢始終不能发育成熟。由此看来，交尾动作的刺激是首先激动神經內分泌系統，分泌大量激素，才能使卵巢发育，切断腹神經索及摘去最后腹神經节均不影响卵巢发育。这也說明交尾动作的刺激不仅是尾部传向前端才影响卵巢，主要是来自头部的作用而影响卵巢发育。关于交尾动作如何传向体内問題，初步假定先由感受器官导入神經系統，再激动內分泌中心，由体液传递激素的刺激，而对卵巢起作用。刺激的机制作用列下：



2. 切断腹神經索、摘去最后腹神經节均不影响飞蝗交尾、卵巢发育。但最后腹神經节对卵的产出（产卵动作）起控制作用。这些均說明卵巢的发育成熟，不是由于神經性的控制。交尾动作的刺激不仅是神經性由尾向头地传导問題。Norris(1954) 将雄蝗外生殖器用胶带胶住，抱持雌蝗，则雌蝗卵巢迅即发育，这一現象也足以說明上述論証。罗祖玉与作者(1958年)将飞蝗雄性外生殖器官芽摘除，羽化后成虫交尾，雌蝗卵巢照常发育等現象也可解释这一問題。

七、結論

1. 摘除东亚飞蝗5龄或成虫生殖腺、性附腺、割斷腹部中央神經索、摘去最后腹神經节等，对成虫交尾性行为无明显影响。
2. 雄蝗去势后体重增加与正常雄蝗无异，但雌蝗去势后体重有过分增长倾向，高于正

常的体重，故生殖腺本身对飞蝗体重增长的性的特异性影响较小。

3. 摘除睾丸后，雄蝗性附腺有增大情况。雄性附腺是制造精珠的器官。雌雄性附腺的发育是直接受到激素的控制，并非由生殖腺作为媒介者。

4. 去势雌蝗脂肪组织并不过分增厚，到了生活后期，反而转“薄”。体内充满大量浓黄色体液，以致身体肥厚臃肿，腹部延长。脂肪组织在去势雌蝗体内似失去贮藏物质的功能，体液作为体内物质的保持者。而这些物质的转运与动员主要由于激素的作用。脂肪组织在去咽侧体的雌蝗、去势又去咽侧体的雌蝗体内作为一物质主要储藏者。

5. 正常雌蝗与去势雄蝗交尾后，其产卵前期较孤雌生殖的大为缩短，卵孵化率也提高，但孵出幼虫皆为雌性。故交尾动作是先激动头部内分泌中心，引起激素的分泌，促进卵巢的发育。卵巢发育与精子存在不存在没有关系。

6. 摘去最后腹神经节或割断腹中央神经索对交尾、卵巢发育无影响。但最后腹神经节似支配雌蝗产卵动作。交尾动作是刺激全身感受器，再传入体内而激动内分泌中心。

参 考 文 献

- [1] 郭郴：1956. 东亚飞蝗 (*Locusta migratoria manilensis*, Meyen) 的生殖。昆虫学报, 6: 145—168.
- [2] ——：1957. 咽侧体对东亚飞蝗生殖的作用。科学通报 (1): 18.
- [3] 罗祖玉等：飞蝗交尾的拖持动作在生理上的效应(未发表)。
- [4] Altamann, G.: 1950. Ein Sexualwirkstoff bei Honigbienen. Z. Bienenforsch. 1: 24—32. (未见原著)
- [5] Bodenstein, D.: 1946. Developmental relations between genital ducts and gonads in *Drosophila*. Biol. Bull. 91: 288—294.
- [6] ——：1953. Studies on the humoral mechanisms in growth and metamorphosis of [the cockroach, *Periplaneta americana*. III. Hormonal effects on metabolism. Biol. Bull. 124: 104—115.
- [7] ——：1953. The role of hormones in moulting and metamorphosis. Insect physiology (K. D. Roeder): 879—931.
- [8] ——：1954. Endocrine mechanism in the life of insects. Recent progress in hormone research. 10: 157—182.
- [9] Buddenbrock, W. v.: 1950. Vergleichende Physiologie. Bd. IV. Hormone: 420—463.
- [10] Chauvin, R.: 1949. Physiologie de L'Insecte. (中译本)
- [11] Hamasaki, S.: 1932. On the effect of castration in the silkworm, *Bombyx mori*. Proc. Imp. Acad. Tokyo. 8: 267—270.
- [12] Hanström, B.: 1939. Hormones in invertebrates.
- [13] Imms, A. D.: 1957. A general textbook of entomology.
- [14] Norris, M. J.: 1954. Sexual maturation in the desert locust (*Schistocerca gregaria* Forsk.) with special reference to the effect of grouping. Anti-locust Bull. 18.
- [15] Pfeiffer, I. W.: 1945. Effect on the corpora allata on the metabolism of adult female grasshopper. J. exp. Zool. 99: 183—233.
- [16] Pflugfelder, O.: 1952. Entwicklungsphysiologie der Insekten.
- [17] Rempel, J. K.: 1940. Intersexuality in chironomidae induced by nematode parasitism. J. exp. Zool. 84: 261—289.
- [18] Scharrer, B.: 1948. Hormones in insects. The hormones (Pincus, G. & K. Thiamann), 125—158.
- [19] ——：1953. Comparative physiology of invertebrate endocrines Ann. Rev. Physiol. 15: 457—472.
- [20] Wigglesworth, V. B.: 1950. The principles of insect physiology.
- [21] ——：1954. The physiology of insect metamorphosis.

STUDIES ON THE REPRODUCTION OF THE ORIENTAL MIGRATORY LOCUST: THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF CASTRATION AND COPULATION

Quo Fu

(Institute of Entomology, Academia Sinica)

The extirpation of gonads of the oriental migratory locust (*Locusta migratoria manilensis* Meyen) in the 5th instar nymphs or newly emerged adults would cause no effect on the sexual behavior of either the male or female insects. The castrated males were observed to gain in body weights in a manner quite similar to that of the controls; but the castrated females differed from the controls by becoming heavier. This indicates that the physiological sexual significance actually existed in both the castrated sexes.

The sexual accessory glands of the adult locust after gonadectomy were observed to grow normally; their development seemed to be under the direct control of the endocrine system. When the virgin female adults copulated with the castrated males, the periods of pre-oviposition were greatly shortened as compared with the parthenogenetic females. The hatchability of the eggs they laid was greatly increased, though the hoppers hatching from these eggs were all females (a case of thelytoky). The result of the experimental work indicated that the mere action of mating provided a stimulus to the female insect, which would activate the endocrine system to mobilize the reserve stored in the fat bodies and to promote the development of the ovaries. The stimulus seemed to arise from the embracing and copulatory actions and was received by the female insects through the sense organs distributed diffusely on the body surface.

Extirpation of the terminal abdominal nerve ganglion and severance of the ventral nerve cord would not effect the development of the ovaries after copulation. This provided the evidence that the stimulus of copulation was not transmitted via the nerve cord. When the terminal abdominal nerve ganglion was extirpated, however, the female insect would not lay eggs, and the ripened eggs remained in the ovaries and were finally reabsorbed.